



الجمهورية الفلسطينية
وزارة التربية والتعليم
قطاع المناهج والتوجيه
الإدارة العامة للمناهج



9 ب

الرياضيات

للفف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي

الجزء الثاني

فريق التأليف

د. شكيب محمد باجرش

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| د. أمة الآله علي حمد الحوري | د. محمد عبد الرب محمد بشر |
| د. ردمان محمد سعيد | د. علي شاهر نعمان القرشي |
| د. منصور علي صالح عطاء | د. محمد رشاد الكوري |
| أ. مريم عبد الجبار سلمان | د. عبدالله سلطان عبد الغني الصلاحي |
| د. محمد علي مرشد | أ. سالمين محمد باسليم |
| أ. يحيى بكار مصفر | أ. ذا النون سعيد طه |
| أ. عبد الباري طه حيدر | أ. مصطفى عبد الواحد العبيسي |
| أ. عبده أحمد سيف | أ. جميلة إبراهيم أحمد |
| د. علي عبد الواحد | أ. أحمد سالم باحويرث |

الإخراج الفني

الصف الطباعي والتصميم / جلال سلطان علي إبراهيم .
إدخال تعديلات / علي عبدالله السلفي .

أشرف على التصميم / حامد عبد العالم الشيباني



النشيد الوطني

رددي أيتها الدنيا نشيدي ردديه وأعيدي وأعيدي
واذكري في فرحتي كل شهيد وامنيه خللاً من ضوء عيدي

رددي أيتها الدنيا نشيدي
رددي أيتها الدنيا نشيدي

وحدتي .. وحدتي .. يا نشيداً رائعاً يملأ نفسي أنت عهد عالق في كل ذمّة
رايتي .. رايتي .. يا نسيجاً جكته من كل شمس أخلدي خافقة في كل قمّة
أمّتي .. أمّتي .. إنجيني البأس يا مصدر بأسى واخبريني لك يا أكرم أمّة

عشت إيماني وحبّي أمميّاً
ومسيّري فوق دربي عربيّاً
وسبقى نبض قلبي يمنيّاً
لن ترى الدنيا على أرضي وصيّا

المصدر: قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦م بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية

أعضاء اللجنة العليا للمناهج

أ. د. عبدالرزاق يحيى الأشول.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| د. عبدالله عبده الحامدي. | أ / علي حسين الحيمي. |
| د/ صالح ناصر الصوفي. | د/ أحمد علي المعمري. |
| أ.د/ محمد عبدالله الصوفي. | أ.د/ صالح عوض عرم. |
| أ/ عبدالكريم محمد الجنداري. | د/ إبراهيم محمد الحوثي. |
| د/ عبدالله علي أبو حورية. | د/ شبيب محمد باجرش. |
| د/ عبدالله لمّلس. | أ.د/ داوود عبدالملك الحدابي. |
| أ/ منصور علي مقبل. | أ/ محمد هادي طواف. |
| أ/ أحمد عبدالله أحمد. | أ.د/ أنيس أحمد عبدالله طائع. |
| أ.د/ محمد سرحان سعيد المخلافي. | أ/ محمد عبدالله زبارة. |
| أ.د/ محمد حاتم المخلافي. | أ/ عبدالله علي إسماعيل. |
| د/ عبدالله سلطان الصلاحي. | |

في إطار تنفيذ التوجهات الرامية للاهتمام بنوعية التعليم وتحسين مخرجاته تلبية للاحتياجات ووفقاً للمتطلبات الوطنية .

فقد حرصت وزارة التربية والتعليم في إطار توجهاتها الإستراتيجية لتطوير التعليم الأساسي والثانوي على إعطاء أولوية استثنائية لتطوير المناهج الدراسية، كونها جوهر العملية التعليمية وعملية ديناميكية تتسم بالتجديد والتغيير المستمرين لاستيعاب التطورات المتسارعة التي تسود عالم اليوم في جميع المجالات .

ومن هذا المنطلق يأتي إصدار هذا الكتاب في طبعته المعدلة ضمن سلسلة الكتب الدراسية التي تم تعديلها وتنقيحها في عدد من صفوف المرحلتين الأساسية والثانوية لتحسين وتجويد الكتاب المدرسي شكلاً ومضموناً، لتحقيق الأهداف المرجوة منه، اعتماداً على العديد من المصادر أهمها : الملاحظات الميدانية، والمراجعات المكتبية لتلافي أوجه القصور، وتحديث المعلومات وبما يتناسب مع قدرات المتعلم ومستواه العمري، وتحقيق الترابط بين المواد الدراسية المقررة، فضلاً عن إعادة تصميم الكتاب فياً وجعله عنصراً مشوقاً وجذاباً للمتعلم وخصوصاً تلاميذ الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي .

ويعد هذا الإنجاز خطوة أولى ضمن مشروعي التطويري المستمر للمناهج الدراسية ستتبعها خطوات أكثر شمولية في الأعوام القادمة، وقد تم تنفيذ ذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في وزارة التربية والتعليم والجامعات من الذين أنضجتهم التجربة وصقلهم الميدان برعاية كاملة من قيادة الوزارة والجهات المختصة فيها .

ونؤكد أن وزارة التربية والتعليم لن تتوانى عن السير بخطى حثيثة ومدروسة لتحقيق أهدافها الرامية إلى توفير الجيل وتسليحه بالعلم وبناء شخصيته المتزنة والمتكاملة القادرة على الإسهام الفاعل في بناء الوطن اليمني الحديث والتعامل الإيجابي مع كافة التطورات العصرية المتسارعة والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية .

أ. د. عبدالرزاق يحيى الأشول

وزير التربية والتعليم

رئيس اللجنة العليا للمناهج

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، وآله وصحبه أجمعين .
لقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج التعليمية لمرحلة التعليم
الأساسي وفق أسس علمية وتربوية . وبعد كتاب الصف الثامن يأتي كتاب الصف
التاسع لمواكبة هذا التطوير .

وفي هذا الكتاب يجد أبنائنا الطلبة مادة الرياضيات معروضة لهم بأساليب
وقوال جديدة تساعدهم على سرعة الفهم والاستيعاب ، وتسهل لهم التعامل مع
المادة وتحفزهم على حبها ، كما تنمي فيهم القدرات التفكيرية وتوسع ثقافتهم
العلمية .

إن الكتاب غني بالشرح والأمثلة إلى جانب الأنشطة والتدريبات لكل درس ،
والتمارين العامة لكل وحدة دراسية ، ولذا على أبنائنا الطلبة بذل أقصى جهودهم
والاستفادة من توجيهات المدرسين ، والدراسة المتعمقة للمادة المقدمة وتتبعها بدقة
وحل أكبر قدر من التمارين والمسائل ، وهذا من شأنه ترسيخ المعرفة الرياضية في
أذهانهم وإكسابهم المهارات الكافية للاستمرار في التعلم .

وفي هذا الكتاب نقدم لأبنائنا الطلبة مادة الرياضيات بأسلوب واضح سهل
يتناسب ومستويات الطلبة وقدراتهم وبدقة علمية مع مراعاة جوانبها التربوية ،
ولذا تضمنت وحدات الكتاب تعاريف رياضية دقيقة ولكنها مبسطة ، واحتوت
على برهنة رياضية ولكنها متدرجة . وترابطت المواضيع في بناء منطقي متسلسل
يساعد أبنائنا على التقدم الراسخ في تعلم المادة كما تم تقديم المادة بلغة مبسطة
شيقة ومدعومة بالأشكال والتوضيحات الكافية ترغيباً لهم في المادة ، وعلى طريق
تحقيق الطموح العلمي المنشود .

والله وراء القصد وهو ولي التوفيق ،،،

الوحدة الخامسة : الهندسة

٧	الدائرة	١-٥
١٠	العمود النازل من مركز الدائرة على الوتر	٢-٥
١٦	أوتار الدائرة	٣-٥
٢٢	الزاوية المركزية والأقواس	٤-٥
٢٧	القطاع الدائري	٥-٥
٣٠	الزاوية المحيطية	٦-٥
٣٦	الشكل الرباعي الدائري	٧-٥
٤٣	المماس	٨-٥
٥٢	الأوضاع النسبية لدائرتين	٩-٥
٦١	تمارين ومسائل عامة	١٠-٥
٦٣	اختبار الوحدة	١١-٥

الوحدة السادسة : الهندسة الإحداثية والتحويلات

٦٥	البعد بين نقطتين	١-٦
٦٩	تنصيف قطعة مستقيمة	٢-٦
٧٣	الانعكاس	٣-٦
٨٤	الانسحاب	٤-٦
٩٠	الدوران	٥-٦


٩٧	التكبير	٦-٦
١٠٦	تمارين عامة ومسائل	٧-٦
١٠٩	اختبار الوحدة	٨-٦

الوحدة السابعة : الإحصاء

١١١	المتوسط الحسابي	١-٧
١٢٠	المنوال	٢-٧
١٢٣	التكرار المتجمع	٣-٧
١٢٩	الوسيط	٤-٧
١٣٨	تمارين ومسائل عامة	٥-٧
١٤٠	اختبار الوحدة	٦-٧

الدائرة

٥ : ١



شكل (٥ - ١)

تأمل الشكل (٥ - ١) :

تعرفت سابقاً على الدائرة وعلى

مسميات بعض عناصرها .

نسمي النقطة « م » مركز الدائرة ،

أب قطر الدائرة ، وه وتر الدائرة ،

م، م ب ، م جـ أنصاف أقطار الدائرة ،

تلاحظ أن $|م أ| = |م ب| = |م جـ|$.

تعريف :

الدائرة : هي مجموعة نقاط في مستوى واحد تبعد عن نقطة ثابتة

مسافات متساوية ، وتسمى النقطة الثابتة مركز الدائرة ، وتسمى


الدائرة باسم مركزها .

نصف قطر الدائرة : هو القطعة المستقيمة الواصلة من مركز الدائرة

إلى أي نقطة تقع على الدائرة ، ونرمز لطول نصف القطر بالرمز « نق »

وتر الدائرة : هو القطعة المستقيمة الواصلة بين أي نقطتين من الدائرة .

القوس : هو جزء من الدائرة محصور بين نقطتين عليها .



شكل (٥ - ٤)

في الشكل (٥ - ٤) لدينا قوسان

هما القوس الأكبر ونرمز له بالرمز $\widehat{ASB}$.

القوس الأصغر ونرمز له بالرمز $\widehat{AVS}$.

كما نلاحظ أن الوتر AB يقسم الدائرة

إلى قطعتين : القطعة الكبرى ($\widehat{ASB}$)

والقطعة الصغرى ($\widehat{AVS}$) .

تمارين ومسائل

[١] أوجد قطر الدائرة إذا كان نصف قطرها :

- (أ) ٥ سم (ب) ٢٠ سم (ج) $\frac{1}{2}$ سم

[٢] أوجد نصف قطر الدائرة إذا كان قطرها :

- (أ) ١٣ سم (ب) ١٠,٥ سم (ج) ٢,٦ سم

[٣] أوجد نصف قطر الدائرة إذا كان طول أكبر وتر فيها ١٦ سم .


[٤] في الشكل (٥ - ٥) :

دائرة مركزها M ، سم ما يلي :

(أ) قطراً للدائرة ، (ب) وترين للدائرة ،


(ج) ثلاثة أنصاف أقطار للدائرة ،

(د) أربعة أقواس ، (هـ) قطعتان .



شكل (٥ - ٥)

نصف قطر الأخرى ٤,٥ سم ، ثم ارسم القطر $\overline{ب ج}$ في الدائرة الكبرى ،
عين س ، ص نقطتي تقاطع $\overline{ب ج}$ مع الدائرة الصغرى ،
أوجد $|ب ج|$ ، $|ب ص|$ ، $|ب س|$.



شكل (٥ - ٦)


[٦] في الشكل (٥ - ٦) : دائرتان

مركزهما (م ، د)، لاحظ أن
أ ج خارج د ، سم ما يلي:
١ (مماساً للدائرة م ،
ب) نقطة التماس ،
جـ) وترين للدائرتين ،
٥ (أربعة أقواس للدائرتين .

٥ : ٢ العمود النازل من مركز الدائرة على الوتر

مبرهنة (٥ - ١) :

المستقيم الواصل من مركز الدائرة إلى منتصف أي وتر فيها يكون
عمودياً على الوتر .



شكل (٥ - ٧)

المعطيات: دائرة مركزها م ، $\overline{أ ب}$ وتر
في الدائرة ، $|أ ج| = |ب ج|$ ،
[انظر شكل (٥ - ٧)] .

العمل : نرسم م أ ، م ب .

البرهان :

$\Delta \Delta$ م أ ج ، م ب ج ، فيهما :

$$\left. \begin{array}{l} \overline{م ج} \text{ (ضلع مشترك)} \\ |م أ| = |م ب| = |نق| \\ |أ ج| = |ب ج| \text{ (معطى)} \end{array} \right\}$$

$\therefore \Delta م أ ج \cong \Delta م ب ج$

ومن التطابق ينتج أن :

$$\widehat{م ج أ} = \widehat{م ج ب} \text{ (ضلع ج ب)}$$


$$\text{لكن } \widehat{م ج أ} + \widehat{م ج ب} = 180^\circ$$

$$\therefore \widehat{م ج أ} = \widehat{م ج ب} = 90^\circ$$

$$\therefore \overline{م ج} \perp \overline{أ ب} \text{ وهو المطلوب}$$

عكس المبرهنة (٥ - ١) :

العمود النازل من مركز الدائرة على أي وتر فيها ينصفه



شكل (٥ - ٨)

المعطيات : $\overline{أ ب}$ وتر في الدائرة م ،

$$\overline{م س} \perp \overline{أ ب}$$

[انظر شكل (٥ - ٨)]

المطلوب : إثبات أن :

$$|س أ| = |س ب| .$$

العمل : ترسم م ١ ، م ب

البرهان :

$\Delta \Delta$ م س ١ ، م س ب ، فيهما :


$$\left. \begin{array}{l} |م ١| = |م ب| = |نق| \\ \overline{م س} \text{ (ضلع مشترك)} \end{array} \right\}$$

$$\angle م س ١ = \angle م س ب = ٩٠^\circ \text{ (معطى)}$$

$$\therefore \Delta م س ١ \cong \Delta م س ب$$

$$\therefore |م س ١| = |م س ب| \text{ وهو المطلوب .}$$

تدريبات



شكل (٥ - ٩)

[١] في الشكل (٥ - ٩) :

١ م وتر في الدائرة م ،

ج م منتصف ١ م ،

$$\angle م ج ب = ٥٠^\circ$$


أوجد $\angle م ب ج$.

[٢] في الشكل (٥ - ١٠) :

١ م وتر في الدائرة م ،


١ م $\perp$ ١ م ج ، $|١ م| = ٣$ سم

أوجد $|١ م ج|$.



شكل (٥ - ١٠)

في الشكل (٥ - ١١) : $\overline{أب}$ ، $\overline{جـ و}$ وتران متوازيان في الدائرة م ، هـ منتصف $\overline{أب}$ ، هـ م $\overline{جـ و}$ يقطع $\overline{جـ و}$ في و ، اثبت أن و منتصف $\overline{جـ و}$.



المعطيات : $\overline{أب}$ ، $\overline{جـ و}$ وتران متوازيان في الدائرة م .

$$|أه| = |هـ ب|$$

المطلوب : إثبات أن : $|جـ و| = |و س|$.
البرهان :

$$|أه| = |هـ ب| \text{ (معطى)}$$

$$\therefore \overline{م هـ} \perp \overline{أب} \text{ (مبرهنة)}$$

$$\therefore \overline{أب} \parallel \overline{جـ و} \text{ (معطى)}$$

شكل (٥ - ١١)

$$\therefore \angle وهـ أ + \angle وهـ جـ = \angle وهـ و = ١٨٠^\circ \text{ (حقيقة)}$$

$$\therefore \angle وهـ و = \angle وهـ جـ = ٩٠^\circ$$

$$\therefore \overline{م و} \perp \overline{جـ و}$$

$$\therefore |جـ و| = |و س|$$

وهو المطلوب .

مثال (٢)

$\overline{س ص}$ ، $\overline{س ع}$ وتران في الدائرة م ، $\angle وهـ و = ١٠٠^\circ$ ، $\angle وهـ و = ١٠٠^\circ$ ، هـ

منتصف $\overline{س ص}$ ، $\overline{س ع}$ على الترتيب . أوجد $\angle وهـ و$ (هـ) .

[انظر الشكل (١٢ - ٥)] :

∴ و منتصف $\overline{صس}$ (معطى)،

∴ و $(\angle م ه س) = 90^\circ$ (مبرهنة)

وبالمثل و $(\angle م ه س) = 90^\circ$ (مبرهنة) شكل (١٢ - ٥)


و $(\angle م ه س) + (\angle م ه س) + (\angle م ه س) + (\angle م ه س) = 360^\circ$

(مجموع زوايا الشكل الرباعي ه م و س)

∴ و $(\angle م ه س) = 360^\circ - (90^\circ + 90^\circ + 90^\circ)$

$$80^\circ = 360^\circ - 280^\circ =$$

∴ و $(\angle م ه س) = 80^\circ$.



شكل (١٣ - ٥)

مثال (٣) في الشكل (١٣ - ٥) : وتر $\overline{أب}$

في الدائرة الكبرى (م) ، يقطع الدائرة

الصغرى (م) ، في النقطتين ج ، و ،

أثبت أن $|أج| = |أو|$.

المعطيات : $\overline{أب}$ يقطع الدائرة الصغرى في النقطتين ج ، و ،

المطلوب : إثبات أن : $|أج| = |أو|$.

العمل : نرسم $\overline{م و} \perp \overline{أب}$

البرهان :

في الدائرة الكبرى (م) :

∴ $|و| = |و ب| = |و ج|$ (١) (عكس المبرهنة)

في الدائرة الصغرى (م) :

∴ $م و \perp ج د$

∴ $|و ج| = |و د|$ (٢) (عكس المبرهنة)

بطرح (٢) من (١) ينتج أن :


$|م ج| = |م د|$ وهو المطلوب .

تمارين ومسائل

[١] $أ ب$ وتر في دائرة مركزها م ، $م ج د \perp أ ب$ ، $|م ج| = ٦$ سم ،
نق = ١٠ سم ، احسب $|أ ب|$.

[٢] $أ ب$ وتر في دائرة مركزها م ، س منتصف $أ ب$ ، فإذا عُلِمَ أن
 $|أ س| = ٣$ سم ، $|أ م| = ٤$ سم ، احسب طول نصف القطر .

[٣] $أ ب$ ، $أ ج$ وتران في الدائرة م ، $و ه (\times ب أ ج) = ٧٥^\circ$ ، $و ه$ ،
منتصف $أ ب$ ، $أ ج$ على الترتيب ، أوجد $و ه (\times و م ه)$.



شكل (٥ - ١٤)

[٤] في الشكل (٥ - ١٤) :

$أ ب$ ، $أ ج$ وتران في الدائرة م ،
س منتصف $أ ب$ ، ص منتصف $أ ج$ ،

فإذا كان $و ه (\times ب أ ج) = ٦٠^\circ$

احسب $و ه (\times س م أ)$ ،

$و ه (\times س م ص)$ المنعكسة .

فقط $\overline{جـ و}$ في $و$ ، أثبت أن : $|و جـ| = |و س|$.

[٦] م ، $د$ دائرتان متقاطعتان في $ل$ ، ب ، نصف خط المركزين م $د$ في جـ

ثم وصل $\overline{جـ ل}$ ، رسم المستقيم $ل و$ عموداً على $\overline{ل جـ}$ ، يقطع محيط

الدائرة م في $و$ ، ومحيط الدائرة $د$ في هـ . أثبت أن $|ل و| = |ل هـ|$.

[٧] $ل ب$ وتر في دائرة مركزها م فيه $و$ ($م ل ب$) ، $\angle ٤٨^\circ$ ، نصفت زاوية

م $ل ب$ بالمستقيم $ل و$ فلاقى محيط الدائرة في نقطة $و$ ثم نصف الوتر

$ل ب$ في جـ ، وصل م $\overline{جـ}$.

أولاً : أوجد قياس الزاوية م $ل و$ بالدرجات

ثانياً : أثبت أن $م ل و \parallel ل ب$

ثالثاً : اثبت أن $و$ ($م ل و$) $\angle ٩٠^\circ$.

٥ : ٣ أوتار الدائرة

تأمل الشكل (٥-١٥) : ماذا تلاحظ؟

تلاحظ أن :


$ل ب$ ، $\overline{جـ و}$ ، $\overline{هـ و}$ ثلاثة أوتار متطابقة في

الدائرة م ، $ل ب$ يبعد عن مركز الدائرة

مسافة قدرها $|م س|$ ، $\overline{جـ و}$ يبعد عن

مركز الدائرة مسافة قدرها $|م ص|$ ، $\overline{هـ و}$

يبعد عن مركز الدائرة مسافة قدرها $|م ع|$ ،




شكل (٥-١٥)

أوجد أطوال الأوتار الثلاثة وأبعادها عن مركز الدائرة ، ثم قارن ؟ ماذا تستنتج ؟ تلاحظ أن :

هناك علاقة بين طول الوتر وبعده عن مركز الدائرة ، وعليه يمكن استنتاج المبرهنة التالية :

مبرهنة (٥ - ٢) :

الأوتار المتطابقة في الدائرة على أبعاد متساوية عن مركزها .



شكل (٥ - ١٦)

المعطيات : $\overline{AB}$ ، $\overline{CD}$ وتران في الدائرة م ،

$$|\overline{AB}| = |\overline{CD}| ، \overline{MS} \perp \overline{CD} ،$$

$$\overline{MS} \perp \overline{AB} \text{ [انظر شكل (٥ - ١٦)] .}$$

المطلوب : إثبات أن : $|\overline{MS}| = |\overline{MV}|$.

العمل : نرسم $\overline{MA}$ ، $\overline{MC}$.

البرهان :

$$\therefore \overline{MS} \perp \overline{AB} \quad \therefore |\overline{AS}| = \frac{1}{2} |\overline{AB}| \text{ (مبرهنة)}$$

$$\therefore \overline{MV} \perp \overline{CD} \quad \therefore |\overline{CV}| = \frac{1}{2} |\overline{CD}| \text{ (مبرهنة)}$$

$$\therefore |\overline{AB}| = |\overline{CD}| \quad \therefore |\overline{AS}| = |\overline{CV}| .$$

$$\therefore \Delta \text{ ASM} \cong \Delta \text{ CMV} \text{ ، جـ صـ م فيهما :}$$

$$\left. \begin{aligned} |\overline{AM}| &= |\overline{CM}| = \text{نق} \\ |\overline{AS}| &= |\overline{CV}| \text{ (برهاناً)} \end{aligned} \right\}$$

$$\therefore \Delta \text{ ASM} \cong \Delta \text{ CMV} \text{ (معطى)}$$

$$\therefore \Delta \text{ ASM} \cong \Delta \text{ CMV} ،$$

منه ينتج أن : $|\overline{MS}| = |\overline{MV}|$ وهو المطلوب .



شكل (٥ - ١٧)

في الشكل (٥ - ١٧) :
الدائرتان م ، د متطابقتان
(أي أن $|م| = |د|$) ،
 $|م| = |جـ|$ ، $|م س| = |جـ ص|$ ،
 $\therefore |م س| = |د ص|$.

عكس المبرهنة (٥ - ٢) :

الأوتار التي على أبعاد متساوية عن مركز الدائرة تكون متطابقة


مثال (١)

دائرتان متحدتان في المركز م ، رسم $\overline{م ب}$ وتر في الدائرة الكبرى فقطع الدائرة الصغرى في جـ ، د ، ورسم $\overline{م ص}$ وتر في الدائرة الكبرى فقطع الدائرة الصغرى في ع ، ل إذا كان $|م ب| = |م ص|$ ، فأثبت أن : $|جـ د| = |ع ل|$.
المعطيات : $\overline{م ب}$ يقطع الدائرة الصغرى في جـ ، د ،
 $\overline{م ص}$ يقطع الدائرة الصغرى في ع ، ل ، $|م ب| = |م ص|$.
المطلوب : إثبات أن : $|جـ د| = |ع ل|$.

العمل : نرسم $\overline{م و} \perp \overline{م ب}$ ،
 $\overline{م هـ} \perp \overline{م ص}$

[انظر الشكل (٥ - ١٨)] ،

البرهان : في الدائرة الكبرى :



شكل (٥ - ١٨)

$$\therefore \overline{م} \perp \overline{أب} ، \overline{م} \perp \overline{سص} \text{ (عملاً)}$$

$$\therefore |م|و| = |م|هـ| \text{ (مبرهنة)}$$

في الدائرة الصغرى

$$\therefore |م|و| = |م|هـ| \text{ (برهاناً)}$$

$$\therefore \overline{م} \perp \overline{جـو} ، \overline{م} \perp \overline{عـل} \text{ (عملاً)}$$

$$\therefore |جـو| = |عـل| \text{ (عكس المبرهنة) وهو المطلوب.}$$

مثال (٢)

في الشكل (٥ - ١٩) : $\overline{أب}$ ، $\overline{جـو}$ وتران متساويان في الطول في الدائرة م ، والنقطتان س ، ص منتصفا $\overline{أب}$ ، $\overline{جـو}$ على الترتيب ، رسم $\overleftrightarrow{سص}$ فقطع الدائرة في هـ ، و ، برهن أن $|س هـ| = |ص و|$.
المعطيات : $|أب| = |جـو|$ ، س منتصف $|أب|$ ، ص منتصف $|جـو|$.
المطلوب : إثبات أن : $|س هـ| = |ص و|$.

العمل : نسقط $\overline{م} \perp \overline{سص}$ ، ونرسم $\overline{م س}$ ، $\overline{م ص}$.
البرهان :

$$\therefore \overline{م} \perp \overline{هـو}$$


$$\therefore |أهـ| = |أل| و |أل| = |ل و| \dots (١)$$

$$\therefore س منتصف \overline{أب} \text{ (معطى)}$$

$$\therefore \overline{م س} \perp \overline{أب}$$

$$\therefore ص منتصف \overline{جـو} \text{ (معطى) .}$$

شكل (٥ - ١٩)



[٤] في الشكل (١١ - ٥) :


$\overline{أ ب}$ ، $\overline{أ ج}$ وتران متطابقان

في الدائرة م ، س ، ص منتصفا

$\overline{أ ب}$ ، $\overline{أ ج}$ على الترتيب ،

رسم $\overrightarrow{س ص}$ فقطع الدائرة في هـ ، و ،

أثبت أن $|س هـ| = |ص و|$.



شكل (٥ - ٢٢)

[٥] $\overline{أ ب ج}$ مثلث مرسوم داخل دائرة م ؛ فيه $|أ ب| = |أ ج|$ ، رسم

م $\overline{س س} \perp \overline{أ ب}$ يقطعه في س ، ورسم م $\overline{ص ص} \perp \overline{أ ج}$ يقطعه في ص فإذا

كان $|م س| = ٥$ سم ، $|ص ج| = ١٢$ سم ، أوجد طول نصف قطر

الدائرة م .


[٦] في الشكل (٥ - ٢٣) : م ، د مركزا دائرتين متطابقتين وغير

متقاطعتين نصف م $\overline{د د}$ في هـ ورسم المستقيم س ص ج و يمر بالنقطة


هـ ويقطع الدائرة م في س ، ص وقطع الدائرة د في جـ ، و ، حيث

م $\overline{أ أ} \perp \overline{س ص}$ ، د $\overline{ب ب} \perp \overline{ج و}$.

أثبت أن $|س ص| = |ج و|$.



شكل (٥ - ٢٣)




شكل (٢٤ - ٥)

في الشكل (٥ - ٢٤) : الشعاعان هـأ ، هـب الخارجان من مركز الدائرة هـ ، يشكلان زاوية تُسمى زاوية مركزية ، وعليه فإن :

الزاوية المركزية : هي زاوية رأسها مركز الدائرة .

إذا تأملنا في الشكل أعلاه نلاحظ أن الزاوية المركزية هـأهـب تقسم الدائرة إلى قوسين القوس هـأ ب ويسمى القوس الصغير أو القوس المقطوع ويرمز له بالرمز $\widehat{أب}$. القوس هـأ ج ب ويسمى بالقوس الكبير ويقرأ بثلاثة أحرف تمييزاً له عن القوس الصغير ، ويرمز له بالرمز $\widehat{أج ب}$.




شكل (٢٥ - ٥)

في الشكل (٥ - ٢٥) : نلاحظ أن النقطتين أ ، ب قد قسمت الدائرة إلى قوسين صغيراً وكبيراً ، وعند رسم الشعاعين مـأ ، مـب نحصل على زاويتين مركبتين هما $\times$ أم ب وقوسها $\widehat{أب}$ ، $\times$ أم ب المنعكسة وقوسها $\widehat{أج ب}$.

درجة قياس القوس :

درجة قياس القوس الصغير تساوي قياس زاويته المركزية المقابلة له



شكل (٥ - ٢٦)

الم ب زاوية مركزية قياسها 60° ،
فإننا نقول أن درجة قياس قوسها 60° ،

∴ درجة قياس القوس الكبير $360^\circ - 60^\circ = 300^\circ$ - درجة قياس القوس الصغير


فمثلاً درجة قياس $\widehat{AB}$ في الشكل (٥ - ٢٦) $= 60^\circ - 300^\circ = 300^\circ$

ما درجة قياس نصف الدائرة ؟

تدريب (١)

مبرهنة (٥ - ٣) :

إذا تطابقت زاويتان مركزيتان تساوى قياسا قوسيهما الصغيرين .



شكل (٥ - ٢٧)

المعطيات: $\angle AMB \cong \angle CMD$ و

[انظر الشكل (٥ - ٢٧)] .

المطلوب: إثبات أن :

قياس $\widehat{AB}$ = قياس $\widehat{CD}$

البرهان :

قياس $\widehat{AB}$ = قياس $\angle AMB$ (تعريف)

قياس $\widehat{CD}$ = قياس $\angle CMD$ (تعريف)

ولكن $\angle AMB \cong \angle CMD$ (معطى)


∴ قياس $\widehat{AB}$ = قياس $\widehat{CD}$ وهو المطلوب

إذا تساوى قياسا قوسين في دائرة تطابقت زاويتاهما المركزيتان .

تدريب (٢)

مثال (١)

برهن عكس المبرهنة (٥-٣) .



شكل (٥-٢٨)

في الشكل (٥-٢٨) : م مركز الدائرة،
أوجد ما يلي :

- ١) قياس $\widehat{ل د}$ ب) قياس $\widehat{ل ن ص}$
ج) قياس $\widehat{س ع}$ د) قياس $\widehat{س د ع}$


الحل :

- ١) قياس $\widehat{ل د} = ٣٨$ لأن $\widehat{و ه} = \widehat{س م ص} = \widehat{ل م د}$ (بالتقابل بالرأس)
ب) قياس $\widehat{ل د ص} = ١٨٠$ (نصف دائرة)
ج) قياس $\widehat{س ع} = ٧٦ - ١٨٠ = ١٠٤$
د) قياس $\widehat{س د ع} = ٧٦ + ١٨٠ = ٢٥٦$

مبرهنة (٥-٤) :

إذا تطابقت الأوتار في دائرة تساوت قياسات أقواسها المتناظرة

المعطيات :



شكل (٥-٢٩)

م دائرة فيها : $\overline{أ ب} \cong \overline{ج د}$

[انظر الشكل (٥-٢٩)]

المطلوب : إثبات أن :

$$\widehat{\text{قياس أ ب}} = \widehat{\text{قياس ج د}}$$

العمل : نرسم $\overline{\text{أ م}}$ ، $\overline{\text{ب م}}$ ، $\overline{\text{ج م}}$ ، $\overline{\text{د م}}$

البرهان :

$$\therefore \widehat{\text{أ م ب}} = \widehat{\text{أ م ج}} ، \widehat{\text{أ م د}} = \widehat{\text{أ م ب}} ، \widehat{\text{أ م د}} = \widehat{\text{أ م ج}} \quad (\text{لماذا؟})$$

$$\therefore \Delta \text{ أ م ب} \cong \Delta \text{ أ م د} \quad (\text{لماذا ؟})$$

$$\therefore \widehat{\text{أ م ب}} = \widehat{\text{أ م د}} \quad (\text{لماذا ؟})$$


وهو المطلوب .

$$\therefore \widehat{\text{قياس أ ب}} = \widehat{\text{قياس ج د}}$$

عكس المبرهنة (٤ - ٥) :

إذا تساوت قياسات الأقواس في دائرة تطابقت أوتارها المتناظرة


[انظر الشكل (٥ - ٣٠)] .



شكل (٥ - ٣٠)

تدريب (٣)


برهن عكس المبرهنة



شكل (٥ - ٣١)


- [١] في الشكل (٥ - ٣١) دائرتان متحدتا المركز ، $\overline{MO}$ قطر الدائرة الكبرى ، $\angle MOH$ حادة .
- (أ) سمّ القوس الصغير للدائرة الكبرى .
- (ب) سمّ قوسين كبيرين للدائرة الصغرى .
- (ج) أيهما أكبر في القياس $\widehat{MOH}$ أم $\widehat{BOH}$ ؟

- [٢] في الشكل (٥ - ٣٢) : دائرة $\odot D$ ، فيها $\overline{AD} \perp \overline{EH}$ ، وقياس $\widehat{SO} = ٣٠^\circ$ ، أوجد :



شكل (٥ - ٣٢)


- (أ) قياس $\widehat{SO}$
- (ب) قياس $\widehat{SO}$
- (ج) قياس $\widehat{SOH}$
- (د) قياس $\widehat{SOH}$



شكل (٥ - ٣٣)

- [٣] في الشكل (٥ - ٣٣) :
- م مركز الدائرة ، $|AB| = |CD|$
- برهن أن : $|AO| = |CO|$.

- [٤] في الشكل (٥ - ٣٤) :



شكل (٥ - ٣٤)


- $\overline{AB}$ قطر الدائرة م ، $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$
- أثبت أن : ج منتصف $\widehat{AC}$.

[٥] في الشكل (٥ - ٣٥) :

شكل (٥ - ٣٥)

$$\widehat{سأ} \approx \widehat{جسأ} .$$

أثبت أن : $\overline{أب} \approx \overline{جس} .$



٥ : ٥ القطاع الدائري

في الشكل (٥ - ٣٦) :

المنطقة المظللة المحددة بالقرس $\widehat{أب}$ ،

ونصفي القطرين $مأ$ ، $مب$ تسمى بالقطاع

الدائري الصغير . المنطقة غير المظللة

المحددة بالقرس $\widehat{أب}$ ونصفي القطرين $مأ$ ،

$مب$ تسمى بالقطاع الدائري الكبير .

طول القوس ، ومساحة القطاع :

تأمل القطاع الدائري $مأب$ في

الشكل (٥ - ٣٧) تلاحظ أن :


$$\text{طول القوس } \widehat{أب} = \frac{٣٧}{٣٦٠} \text{ من محيط الدائرة}$$

$$\text{أي أن طول القوس } \widehat{أب} = \frac{٣٧}{٣٦٠} \times \text{محيط الدائرة}$$


$$\therefore \frac{٣٧}{٣٦٠} = \frac{\text{طول } \widehat{أب}}{\text{محيط الدائرة}}$$

$$\text{مساحة القطاع الدائري } \widehat{أب} = \frac{٣٧}{٣٦٠} \times \text{مساحة الدائرة} .$$


$$\therefore \frac{٣٧}{٣٦٠} = \frac{\text{مساحة القطاع}}{\text{مساحة الدائرة}}$$



شكل (٥ - ٣٦)



شكل (٥ - ٣٧)



شكل (٥ - ٣٨)

$$\frac{\text{س}}{360} = \frac{\text{طول القوس}}{2\pi \text{ نق}}$$

$$\frac{\text{س}}{360} = \frac{\text{مساحة القطاع}}{2\pi \text{ نق}^2}$$

مثال (١)

مستعيناً بالشكل (٥ - ٣٩) أوجد :
 (١) محيط القطاع الدائري الصغير .
 (ب) مساحة القطاع الدائري الصغير .

الحل :

(١) نفرض أن طول $\widehat{أ ب}$ = س سم

$$\therefore \frac{75}{360} = \frac{\text{س}}{3 \times \pi \times 2}$$

$$\therefore \text{س} = \frac{75}{360} \times \pi \times 3 \times 2 = \frac{5}{4} \pi = \frac{5}{4} \times \frac{22}{7} = \frac{55}{14} = 3 \frac{13}{14}$$

∴ محيط القطاع = طول القوس + طول القطر .


$$\therefore \text{محيط القطاع الصغير} = 3 + 3 + 3 \frac{13}{14} = 9 \frac{13}{14} \text{ سم}$$

(ب) نفرض أن مساحة القطاع الصغير = ص سم^٢ .

$$\therefore \frac{75}{360} = \frac{\text{ص}}{3 \times \pi \times 2}$$

$$\therefore \text{ص} = \frac{75}{360} \times 3 \times \pi \times 2 = \frac{5}{8} \pi \text{ سم}^2$$

$$\therefore \text{ص} = \frac{5}{8} \times \frac{22}{7} = \frac{110}{56} = \frac{27.5}{14}$$



شكل (٥ - ٣٩)

مستعينا بالشكل (٥ - ٤٠) أوجد :

(١) طول القوس الكبير ؟ ج ب .

(ب) مساحة القطاع الدائري الكبير .

الحل :

(١) نفرض أن طول القوس الكبير = س سم

$$\therefore \frac{٨٠ - ٣٦٠}{٣٦٠} = \frac{س}{٦ \times \pi ٢}$$

$$\therefore س = \frac{٢٨٠}{٣٦٠} \times ٦ \times \frac{٣٣}{٧} \times ٢ = \frac{٢٨٠}{٣٦٠} \times ٦ \times \pi ٢ = ٨٨ \text{ سم}$$

(ب) نفرض أن مساحة القطاع الدائري الكبير = م سم^٢

$$\therefore \frac{٨٠ - ٣٦٠}{٣٦٠} = \frac{م}{٢٦ \times \pi}$$


$$\therefore م = \frac{٢٨٠}{٣٦٠} \times ٢٦ \times \pi = ٨٨ \text{ سم}^٢$$

تمارين ومسائل


[١] أوجد كلاً من : (١) محيط القطاع الدائري الصغير .

(ب) مساحة القطاع الدائري الصغير .


في كل من الأشكال (٥ - ٤١ ، ب ، ج ، د) ، (ط = ٣ ، ١٤)




شكل (٥ - ٤١)



شكل (٥ - ٤١ ج)




شكل (٥ - ٤١ ب)




شكل (٥ - ٤١ د)


الأشكال (٥ - ١٤٢ ، ب ، ج ، د) ، (ط = $\frac{22}{7}$) .




شكل (٥ - ١٤٢)



شكل (٥ - ١٤٢ ج)




شكل (٥ - ١٤٢ ب)



شكل (٥ - ١٤٢)

٥ : ٦ الزاوية المحيطية




شكل (٥ - ١٤٣)

تأمل الشكل (٥ - ١٤٣) ، ه نقطة على محيط الدائرة (م) ، ه أ ، ه ب شعاعان يقطعان محيط الدائرة في أ ، ب ، وبذلك تكونت لدينا زاوية هي $\angle$ ه ب ، مثل هذه الزاوية تسمى زاوية محيطية .


تعريف :

الزاوية المحيطية : هي زاوية يقطع ضلعاها قوساً من الدائرة ، ورأسها نقطة على محيط الدائرة .


من الشكل يلاحظ أن الزاوية المحيطية تقسم الدائرة إلى قوسين أحدهما القوس المقابل للزاوية ويسمى قوس الزاوية المحيطية ، والآخر القوس المعكوس للزاوية ويسمى القوس المنعكس للزاوية المحيطية .



شكل (٥-٤٤ ج)




شكل (٥-٤٤ ب)



شكل (٥-٤٤ أ)

نشاط (١)

ادرس الشكل (٥-٤٥) ثم أجب عن الأسئلة التالية :



شكل (٥-٤٥)

١- هل م ه ب مثلث متساوي الساقين ؟

ب - هل العبارات الآتية صحيحة ؟

$$(١) \text{ و } (٣) = (١) \text{ و } (٢)$$

$$(٢) \text{ و } (١) = (٢) \text{ و } (٢)$$

$$(٣) \text{ و } (٣) = (٢) \text{ و } (٢)$$

ج- إذا كانت الإجابة في (٣) صحيحة ، هل أنت مقتنع أن

قياس $\angle \text{م ه ب} = \frac{1}{2}$ قياس $\angle \text{ب}$ ؟


نشاط (٢)

ادرس الشكل (٥-٤٦) ثم أجب

على الأسئلة التالية :

١- هل $\angle \text{م ه ب}$ و

$$= \angle \text{م ه د} + \angle \text{د ه ب} .$$



شكل (٥-٤٦)

١. $\widehat{سأ} = \frac{1}{2}$ قياس $\widehat{سأ}$.

٢. $\widehat{سب} = \frac{1}{2}$ قياس $\widehat{سب}$.

٣. $\widehat{سأ} + \widehat{سب} = \frac{1}{2}$ قياس $\widehat{سأ} + \widehat{سب}$.

٤. $\widehat{سأ} + \widehat{سب} = \frac{1}{2}$ قياس $\widehat{سأ} + \widehat{سب}$.

٥. $\widehat{سأ} = \frac{1}{2}$ قياس $\widehat{سأ}$.

نشاط (٣)

ادرس الشكل (٥ - ٤٧) ، ثم أجب على الأسئلة التالية :

١- هل العبارات الآتية صحيحة ؟

١. $\widehat{سأ} = \widehat{سب} - \widehat{سأ}$.

٢. $\widehat{سأ} = \widehat{سب}$.

٣. $\widehat{سأ} - \widehat{سب} = \frac{1}{2}$ قياس $\widehat{سأ}$.

٤. $\widehat{سأ} = \frac{1}{2}$ قياس $\widehat{سأ}$.

شكل (٥ - ٤٧)


ب - من خلال إجاباتك على الأنشطة الثلاثة هل أنت مقتنع أن قياس الزاوية المحيطية يساوى نصف قياس القوس المقابل لها .

قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس المقابل لها .

وبصياغة أخرى :

قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها بالقوس .

مثال



شكل (٥ - ٤٨)

في الشكل (٥ - ٤٨) : م ، ب ، ج ، س
نقاط على الدائرة (م) . أوجد الآتي :


١ - و (× ا ج ب) .

ب - و (× ا س ب) .

الحل :

$$١ - و (× ا ج ب) = \frac{1}{2} = ٨٠ \times \frac{1}{2} = ٤٠$$

$$ب - و (× ا س ب) = \frac{1}{2} = ٨٠ \times \frac{1}{2} = ٤٠$$



شكل (٥ - ٤٩)

نشاط (٤)

في الشكل (٥ - ٤٩) قس الزوايا

× ا ج ب ، × ا س ب ، × ا ه ب


قارن القياسات، ماذا تلاحظ على الزوايا الثلاث؟

تلاحظ أن الزوايا الثلاث $\angle \alpha$ ، $\angle \beta$ ، $\angle \gamma$ زوايا محيطية مشتركة في قوس واحد ، كما تلاحظ أن قياسات الزوايا الثلاث متساوية .

نشاط (٥)

ادرس الشكل (٥ - ٥٠) ثم أجب على الأسئلة التالية :

١ - هل العبارات الآتية صحيحة ؟



شكل (٥ - ٥٠)

١. $\angle \alpha = \angle \beta$ و $\angle \gamma$ (١)


٢. $\angle \alpha = \angle \beta$ و $\angle \gamma$ (٢)

٣. هل الزاويتان $\angle \alpha$ ، $\angle \beta$ في قطعة دائرية واحدة ؟ ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟

مبرهنة (٥ - ٦) :

الزوايا المحيطية المشتركة في قوس واحد من الدائرة الواحدة متطابقة .

نشاط (٦)



في الشكل (٥١ - ٥) ، أ ، ب ، ج نقاط

تقع على الدائرة م ، و $\angle \alpha = \angle \beta$ (٥١ - ٥)

١ - هل الزاوية أ ج ب قائمة ؟

٢ - الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة تقابل قوساً قياسه ...

٣ - هل الزاوية المحيطية القائمة تقابل زاوية مركزية قياسها 180° ؟

شكل (٥١ - ٥)


إذا كانت الزاوية المحيطية مرسومة في نصف دائرة فإنها زاوية قائمة ،
وعكس المبرهنة صحيح أي أنه :
إذا كانت الزاوية المحيطية في الدائرة قائمة فإنها مرسومة في نصف دائرة .

برهن المبرهنة (٥ - ٧) وعكسها .


تدريب

تمارين ومسائل


[١] في الأشكال (٥ - ١٥٢ ، ب ، ج ، د ، م ، مركز الدائرة ، أوجد قيمتي
س ، ص في كل شكل .




شكل (٥ - ١٥٢ ج)




شكل (٥ - ١٥٢ ب)



شكل (٥ - ١٥٢)



شكل (٥ - ١٥٢ د)




شكل (٥ - ١٥٣)

[٢] مستعيناً بالشكل (٥ - ١٥٣) :


أثبت أن :

$$\widehat{A} + \widehat{B} = 180^\circ$$

في كل شكل من الشكلين التاليين :




شكل (٥-٤ ب)



شكل (٥-٤ أ)

[٤] أ ب قطر في الدائرة م ، ج نقطة على الدائرة نفسها، احسب $\angle$ ج ب .



شكل (٥-٥)


[٥] في الشكل (٥-٥) :

أ س $\approx$ ب ج . أثبت أن :

Δ هـ ج مثلثا متساوي الساقين .

٥ : الشكل الرباعي الدائري

تعلم أن أي مضلع تنتمي رؤوسه لدائرة واحدة يسمى مضلعاً دائرياً ، وعلى ذلك فالرباعي الذي تنتمي رؤوسه لدائرة واحدة يسمى رباعياً دائرياً .



شكل (٥-٦)

تأمل الشكل (٥-٦) تلاحظ أن :

أ ب ج د شكل رباعي مرسوم داخل دائرة

بحيث تقع رؤوسه الأربعة على الدائرة (م) ،

يسمى هذا الشكل رباعياً دائرياً .

الدائري ، وكذلك $\angle ب ج د$ ، $\angle ا ب ج$ جـ زاويتان متقابلتان .

مبرهنة (٥ - ٨) :

مجموع قياس الزاويتين المتقابلتين في الشكل الرباعي الدائري يساوي ١٨٠° .

المعطيات : $\angle ا ب ج$ و $\angle ب ج د$ شكل رباعي دائري، م مركز الدائرة.

المطلوب : إثبات أن :

$$\text{أولاً : } \angle ا ب ج + \angle ب ج د = ١٨٠^\circ$$

$$\text{ثانياً : } \angle ا ب ج + \angle ج د ا = ١٨٠^\circ$$

العمل : نرسم $\overline{م ب}$ ، $\overline{م د}$ [انظر شكل (٥ - ٥٧)]

البرهان :

شكل (٥ - ٥٧)

$$\angle ا ب ج = \angle ا ب م + \angle م ب ج \quad (١) \text{ (مبرهنة) } \dots \dots (١)$$

$$\angle ب ج د = \angle ب ج م + \angle م ج د \quad (٢) \text{ (مبرهنة) } \dots \dots (٢)$$

بجمع (١) ، (٢) ينتج :

$$\angle ا ب ج + \angle ب ج د = \angle ا ب م + \angle م ب ج + \angle ب ج م + \angle م ج د$$

لكن $\angle ا ب م + \angle م ب ج + \angle ب ج م + \angle م ج د = ٣٦٠^\circ$ (مجموع الزوايا حول نقطة) ،


$$\therefore \angle ا ب ج + \angle ب ج د = ٣٦٠^\circ \times \frac{١}{٢} = ١٨٠^\circ$$

وهو المطلوب أولاً

$$\therefore \angle 180^\circ = (\angle \text{ج} \text{ـ} \text{ـ} \text{ـ}) + (\angle \text{ب} \text{ـ} \text{ـ} \text{ـ})$$

وهو المطلوب ثانياً .

مثال (١)



شكل (٥ - ٥٨)

في الشكل (٥ - ٥٨) إذا كانت :
 $\angle 120^\circ = \angle ١$ ، $\angle 70^\circ = \angle ٢$
 فأوجد قياس كل من $\angle ٣$ ، $\angle ٤$.

الحل :

∴ رؤوس الشكل الرباعي ١ ب ج د تقع على الدائرة .

∴ ١ ب ج د شكل رباعي دائري .

$$\therefore \angle 180^\circ = (\angle \text{ج} \text{ـ} \text{ـ} \text{ـ}) + (\angle ١ \text{ـ} \text{ـ} \text{ـ}) \quad (\text{مبرهنة}) .$$

$$\therefore 60^\circ = 120^\circ - 180^\circ = (\angle ١ \text{ـ} \text{ـ} \text{ـ}) - 180^\circ = (\angle \text{ج} \text{ـ} \text{ـ} \text{ـ})$$

$$\text{وبالمثل } 110^\circ = 70^\circ - 180^\circ = (\angle \text{ب} \text{ـ} \text{ـ} \text{ـ}) - 180^\circ = (\angle \text{د} \text{ـ} \text{ـ} \text{ـ})$$

نشاط


ارسم مربعاً ، معيناً ، مستطيلاً ، ومتوازي أضلاع ، ثم ارسم دائرة تمر برؤوس كل شكل من هذه الأشكال ... ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟ متى يكون الشكل رباعياً دائرياً ؟

عكس المبرهنة (٥ - ٨) :


يكون الشكل رباعياً دائرياً إذا كان مجموع قياسي زاويتين متقابلتين فيه 180° .

المعطيات : ١ ب ج د شكل رباعي فيه : $\angle \text{ب} \text{ـ} \text{ـ} \text{ـ} + \angle \text{د} \text{ـ} \text{ـ} \text{ـ} = 180^\circ$


نرسم الدائرة التي تمر بالنقاط الثلاث ١ ، ب ، جـ (أي ثلاث نقاط ليست على إستقامة واحدة تمر بها دائرة واحدة) .



شكل (٥ - ٥٩ جـ)




شكل (٥ - ٥٩ بـ)



شكل (٥ - ٥٩)

فإن مرت بالنقطة ٥ [شكل (٥ - ٥٩)] تم المطلوب ، وإن لم تمر نفرض أن الدائرة تقطع ١ في النقطة هـ كما في الشكل (٥ - ٥٩ بـ) أو امتداده كما في الشكل (٥ - ٥٩ جـ) ثم نصل جـ هـ .
 ∴ الشكل ١ ب جـ هـ رباعي دائري . ∴ $\angle \text{ب} + \angle \text{هـ} = 180^\circ$ ،
 لكن $\angle \text{هـ} = (\angle \text{ب} + \angle \text{هـ}) + (\angle \text{هـ} + \angle \text{ب}) = 180^\circ$.

∴ $\angle \text{هـ} = (\angle \text{هـ} + \angle \text{ب}) = (\angle \text{هـ} + \angle \text{ب})$ وهذا غير ممكن إلا إذا انطبقت نقطة ٥ على نقطة هـ أي أن ١ ب جـ هـ شكل رباعي دائري وهو المطلوب .



شكل (٥ - ٦٠)

مثال (٢)

في الشكل (٥ - ٦٠) ١ ب جـ هـ رباعي ،
 ب هـ قطر فيه . $\angle \text{هـ} = (\angle \text{ب} + \angle \text{هـ}) = 65^\circ$ ،
 $\angle \text{هـ} = (\angle \text{ب} + \angle \text{هـ}) = 60^\circ$ ، $\angle \text{هـ} = (\angle \text{جـ} + \angle \text{هـ}) = 125^\circ$.
 أثبت أن ١ ب جـ هـ رباعي دائري .

المطلوب : إثبات أن : $\angle \text{أ ب ج} = \angle \text{أ ب د}$ ، و $\angle \text{أ ب ج} = \angle \text{أ ب د}$ ، و $\angle \text{أ ب ج} = \angle \text{أ ب د}$.
 البرهان : في المثلث أ ب ج .


$$\angle \text{أ ب ج} = \angle \text{أ ب د} = 180^\circ - [\angle \text{أ ب ج} + \angle \text{أ ب د}] = 180^\circ - (60^\circ + 65^\circ) = 55^\circ$$

$$\therefore \angle \text{أ ب ج} = \angle \text{أ ب د} = 55^\circ = \angle \text{أ ب ج} + \angle \text{أ ب د} = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$$

$\therefore \angle \text{أ ب ج} = \angle \text{أ ب د}$ شكل رباعي دائري (لأن فيه $\angle \text{أ ب ج} + \angle \text{أ ب د} = 180^\circ$ ، زاويتان متقابلتان متكاملتان) .

الزاوية الخارجة عن الشكل الرباعي الدائري :

إذا مدّ أحد أضلاع الشكل الرباعي الدائري على استقامته ، فإن الزاوية المحصورة بين امتداد هذا الضلع والضلع المجاور له تسمى زاوية خارجة عن الشكل الرباعي الدائري انظر الشكل (٥ - ٦١) :



شكل (٥ - ٦١)


س ص ع ل شكل رباعي دائري ، مدّ $\overline{\text{ص ع}}$ على استقامته إلى و ، $\angle \text{ل ع و}$ هي زاوية خارجة عن الشكل الرباعي الدائري س ص ع ل .

مبرهنة (٥ - ٩) :

الزاوية الخارجة عن الشكل الرباعي الدائري تساوي الزاوية المقابلة للزاوية المجاورة لها .

مدّ $\overline{\text{ب ج}}$ إلى هـ [انظر

الشكل (٥ - ٦٢)] .



المطلوب : إثبات أن $\angle \text{ج د ه} = \angle \text{ج د ه}$. (شكل (٥ - ٦٢)

البرهان : $\angle \text{ج د ه} + \angle \text{ج د ه} = 180^\circ$ (١)

(لأن ب ج د ه مستقيمة)

$\angle \text{ج د ه} + \angle \text{ج د ه} = 180^\circ$ (مبرهنة) (٢)

بمقارنة (١) ، (٢) ينتج أن :

$\angle \text{ج د ه} = \angle \text{ج د ه}$ وهو المطلوب .

مثال (٣)

في الشكل (٥ - ٦٣) : أ ب ج د شكل رباعي دائري فيه

$\angle \text{أ} = 60^\circ$. مدّ $\overline{\text{ب ج}}$ إلى هـ ، بحيث $|\text{ج د}| = |\text{ج ه}|$ ،

أثبت أن المثلث ج د ه متساوي أضلاع .


المعطيات : أ ب ج د شكل رباعي دائري ،

$\angle \text{أ} = 60^\circ$ ،

$|\text{ج د}| = |\text{ج ه}|$

المطلوب : إثبات أن :

المثلث ج د ه متساوي أضلاع .



شكل (٥ - ٦٣)

البرهان :

∵ $\angle \text{ج د ه} = \angle \text{ج د ه}$ الخارجية عن الشكل الرباعي الدائري أ ب ج د .

في Δ ج د ه: $\angle ه = (\angle ج د ه) + (\angle د ج ه) = (\angle د ج ه) + (\angle د ج ه) = 120^\circ$
 $\therefore |ج د| = |ج ه|$ (معطى)


$$(2) \quad 60^\circ = \frac{120^\circ}{2} = (\angle ج د ه) = (\angle د ج ه)$$

من (1) ، (2) ينتج أن :

$$60^\circ = (\angle ج د ه) = (\angle د ج ه) = (\angle د ج ه)$$

$\therefore \Delta ج د ه$ متساوي أضلاع .

تمارين ومسابقات



[١] في الشكل (٥ - ٦٤) :

أ ب ج د رباعي ، $\overline{ب د}$ قطريه

$$|ج د| = |ج ب| ، \angle ب د ج = 80^\circ ،$$

$$\angle د ج ب = 40^\circ .$$

أثبت أن : أ ب ج د رباعي دائري .


[٢] في الشكل (٥ - ٦٥) :


أ ب ج د رباعي دائري .

$$\text{إذا كان } \angle ب ج د = 62^\circ ،$$

$$\angle ب د ج = 30^\circ .$$

فأحسب قياس $\angle ب د ج$.





[٤] في الشكل (٥ - ٦٦) :

و $\angle \alpha = 112^\circ$ ،

أوجد قياس $\angle \delta$ هـ .

شكل (٥-٦٦)

[٥] α ب ج مثلث متساوي الساقين، فيه $|\alpha| = |\beta|$ ، س نقطة على $\overline{\alpha\beta}$ ،

ص نقطة على $\overline{\alpha\gamma}$ ، بحيث $\overline{SV} \parallel \overline{\beta\gamma}$.

أثبت أن : ب ج ص س رباعي دائري .

[٦] دائرتان متقاطعتان في α ، ب ، رسم المستقيم جـ دـ يقطع الأولى

في جـ والثانية في دـ . ورسم المستقيم هـ بـ و يقطع الأولى في هـ

والثانية في و . برهن على أن جـ هـ يوازي دـ و .

٥ : ٨ المماس

سبق أن تعرفت على الحالات الثلاث للاوضاع النسبية بين مستقيم ودائرة وهي :

(١) أن يقطع المستقيم الدائرة في نقطتين .


(٢) لا توجد أية نقطة مشتركة بين المستقيم والدائرة .

(٣) توجد فقط نقطة واحدة مشتركة بين المستقيم والدائرة

وفي الحالة الثالثة يسمى المستقيم **مماساً للدائرة** وتسمى


النقطة المشتركة **نقطة التماس** .

انظر الشكل (٥ - ٦٧) :



شكل (٥-٦٧)

المستقيم ل مماس للدائرة (م) ، P هي نقطة التماس .



شكل (٥ - ٦٨)

(١) ارسم دائرة مركزها (م) .

(٢) حدد نقطة مثل (ب) على محيط الدائرة

فيكون $\overline{MB}$ نصف قطر في الدائرة .

(٣) ارسم المستقيم ل عمودياً على $\overline{MB}$

عند النقطة ب .

هل $\overleftrightarrow{L}$ مماس للدائرة في نقطة (ب) ؟

للإجابة عن ذلك خذ نقطة أخرى مثل جـ $\overleftrightarrow{L} \ni$ ثم صل النقطة جـ بمركز

الدائرة (م) . ماذا تلاحظ ؟

ستلاحظ أن : $|MB| < |JB|$.

لكن $|MB| = \text{نق}$.

$\therefore |MB| < |JB|$.

إذن نقطة جـ لا تنتمي للدائرة (م) ، وهكذا كل نقطة تنتمي للمستقيم

ل غير النقطة ب يكون البعد بينها وبين مركز الدائرة دائماً أكبر من نصف قطر

الدائرة أي أن : ب هي النقطة الوحيدة التي تنتمي إلى كل من المستقيم ل

والدائرة . مما سبق يمكن القول أن :

المستقيم العمودي على نصف قطر دائرة من نقطة نهايته على

الدائرة يكون مماساً للدائرة عند هذه النقطة .

مماس الدائرة يكون عمودي على نصف القطر المار بنقطة التماس

المعطيات: $\overleftrightarrow{AB}$ يمس الدائرة (م) في نقطة جـ ، $\overline{MJ}$ نصف قطر .

[انظر الشكل (٥ - ٦٩)] .

المطلوب: إثبات أن : $\overline{MJ} \perp \overleftrightarrow{AB}$

العمل : نأخذ نقطة مثل س على

$\overleftrightarrow{AB}$ ونصل $\overline{MS}$.

البرهان :

∴ $\overleftrightarrow{AB}$ يمس الدائرة في جـ .

∴ كل نقطة على المماس غير نقطة جـ تقع خارج الدائرة ، لذلك

نقطة س تقع خارج الدائرة .

∴ $|MS| < |MJ|$.

لكن $\overline{MJ}$ نصف قطر في الدائرة .

وبالمثل يمكن إثبات أن م جـ أصغر من أي مستقيم واصل من

المركز (م) إلى أي نقطة على $\overleftrightarrow{AB}$ غير جـ .

∴ $\overline{MJ}$ أقصر القطع المستقيمة الواصلة من م إلى $\overleftrightarrow{AB}$.

∴ $\overline{MJ} \perp \overleftrightarrow{AB}$ وهو المطلوب .

نتيجة (١)

لا يمكن رسم أكثر من مماس واحد لدائرة من نقطة عليها .

العمود المقام على مماس دائرة من نقطة التماس يمر بمركزها .

مثال

أب قطر في الدائرة (م) ، ب ج مماس للدائرة م ، رسم ج أ فقطع المحيط في (س) ، أثبت أن : $\angle(س م أ) = \angle(س أ ب)$.

المعطيات : أب قطر في الدائرة (م) ،

ب ج مماس لها ، ج أ يقطع

الدائرة في (س)

المطلوب : إثبات أن :

$$\angle(س م أ) = \angle(س أ ب)$$

العمل : نرسم ب س .

البرهان :

انظر الشكل (٥٠ - ٧٠)

في $\Delta م أ س$: $\angle(س م أ) = \angle(س أ ب)$ لأن $|م أ| = |م س|$ — (١)

في $\Delta م س ب$: $\angle(س م ب) = \angle(س ب م)$ لأن $|م س| = |م ب|$ — (٢)


في $\Delta أ ب ج$ القائم في ب : $\angle(س أ ب) + \angle(س ب م) = 90^\circ$ — (٣)

بالمثل $\angle(س م أ) + \angle(س م ب) = 90^\circ$ — (٤)

من (٣) ، (٤) ينتج أن :

$$\angle(س م أ) + \cancel{\angle(س م ب)} = \angle(س أ ب) + \cancel{\angle(س م ب)}$$

$$\therefore \angle(س م أ) = \angle(س أ ب)$$




شكل (٥٠ - ٧٠)

المماسان المرسومان من نقطة خارج دائرة يقابلان زاويتين مركبتين متطابقتين .

نتيجة (٢)

القطعة المستقيمة الواصلة بين مركز دائرة ونقطة خارجها تنصف الزاوية التي ضلعاها مماسا الدائرة من تلك النقطة .

مثال (٢)



شكل (٥ - ٧٢)

النقطة P خارج الدائرة M ،

رسم المماسان $\overline{AB}$ ، $\overline{CD}$ يمسان

الدائرة في B ، D .

فإذا كان $\angle BPA = 70^\circ$ ، فأوجد $\angle BMD$ و $\angle BPD$ انظر

الشكل (٥ - ٧٢) .

الحل :

المعطيات : P نقطة خارج الدائرة M ، $\overline{AB}$ ، $\overline{CD}$ مماسان لدائرة ،
 $\angle BPA = 70^\circ$.

المطلوب : إيجاد $\angle BMD$ و $\angle BPD$

$\angle BMD$ شكل رباعي .

$$\therefore \angle BMD = \angle BPA + \angle BPD + \angle BMD + \angle BMD = 360^\circ$$

$$\therefore 360^\circ = 70^\circ + \angle BMD + 90^\circ + 90^\circ$$

$$\therefore \angle BMD = 360^\circ - (70^\circ + 90^\circ + 90^\circ)$$

$$= 110^\circ = 360^\circ - 250^\circ$$

«إذا رسم مستقيم من إحدى نهايتي وتر في دائرة يصنع معه زاوية تساوي بالقياس الزاوية المحيطية المقابلة للوتر من الجهة الأخرى كان ذلك المستقيم مماساً للدائرة» .

مثال (٣)

$\overline{AB}$ وتر في الدائرة (م) ، $\overline{As}$ مماس لها في أ ، رسم $\overline{Bs}$ فقطع محيط الدائرة في جـ . اثبت أن : $\angle (As) = \angle (Bs)$.

المعطيات : $\overline{AB}$ وتر في الدائرة م ، $\overline{As}$ مماس لها

$\overline{Bs}$ يقطع الدائرة في جـ

[انظر الشكل (٥-٧٤)]

المطلوب : إثبات أن :

$$\angle (As) = \angle (Bs)$$

شكل (٥-٧٤)

البرهان :

$\overline{As}$ مماساً ، $\overline{Aj}$ وتر التماس (معطى)

$$\angle (1) = \angle (3) \quad \text{---} \quad (1) \quad \text{مبرهنة (٥-١٢)}$$

$\angle 4$ خارجه عن المثلث أ ب جـ

$$\angle (4) = \angle (2) + \angle (3) \quad \text{---} \quad (2) \quad \text{(مبرهنة)}$$

من (١) ، (٢) ينتج أن :

$$\angle (1) + \angle (2) = \angle (4)$$

أي أن : $\angle (As) = \angle (Bs)$ وهو المطلوب .

[١] م دائرة، $\overline{AB}$ قطر فيها، ج نقطة على محيطها، مد $\overline{B}$ إلى النقطة «و»، ثم وصل $\overline{ج و}$. فإذا كان $\angle (ج و ب) = ٦٠^\circ$ وكان $\overline{ج و}$ مماساً للدائرة. فأثبت أن المثلث $\triangle ج و ب$ متساوي الساقين.


[٢] م دائرة قطرها $\overline{AB}$ فرضت نقطة ج على محيطها بحيث كان $|ج ب| = |ج ب|$ ، ثم رسم لها مماساً من النقطة (ج) لاقى امتداد $\overline{B}$ في النقطة «هـ»، أثبت أن: $|ج هـ| = |ج ب|$.

[٣] $\overline{AB}$ قطر في دائرة $\overline{AB}$ ، $\overline{آ و}$ وتران في جهة واحدة من $\overline{AB}$ ، مدّا كل من $\overline{آ ج}$ ، $\overline{آ و}$ حتى لاقيا المماس المرسوم من النقطة ب في النقطتين س، ص على الترتيب، أثبت أن الشكل س ج و ص رباعي دائري.

[٤] استعن بالشكل (٥-٧٥): لإيجاد كلٍّ من:

$$|أ ب|، |ب ج|، |ج د|، |د أ|$$

و $\angle (هـ م و)$.



[٥] رسم القطر $\overline{AB}$ في الدائرة (م) وفرضت النقطة ج على الدائرة، ثم رسم منها مماساً للدائرة، فإذا رسمت $\overline{آ و}$ عمودية على المماس، برهن أن: $\overline{آ ج}$ ينصف $\angle ب أ و$.

[٦] $\overline{AB}$ وتر في دائرة مركزها (م)، $\overline{ب س}$ مماساً لها، ج نقطة على $\overline{ب س}$ بحيث $|أ ب| = |ب ج|$ ، رُسم $\overline{ج د}$ فقطع محيط الدائرة في و، أثبت أن $\triangle ب و ج$ متساوي الساقين.


للدائرة ، ثم رسم $\overline{م س}$ ينصف $\angle م ب ج$ ، ويلاقي المماس في النقطة $س$. فإذا كان $\angle م ب ج = ٣٠^\circ$ ، فأثبت أن :
 أولاً : $\angle م ب ج = \angle م س ج = \angle م ب س = ٦٠^\circ$.

ثانياً : الشكل $س ب م ج$ رباعي دائري . ثالثاً : $\overline{س ب}$ مماس للدائرة في $ب$.
 [٨] $\overline{أ ب}$ ، $\overline{أ ج}$ وتران متطابقان في دائرة ، $\overline{أ هـ}$ مماس لها . برهن أن : $\overline{أ هـ} \parallel \overline{ب ج}$.

[٩] في الشكل (٥ - ٧٦)

أوجد مع البرهان :

$\angle م ب ج = \angle م س ج$.



شكل (٥ - ٧٦)

[١٠] $\angle م ب ج$ و $\angle م د ج$ رباعي دائري، رسم من النقطتين $أ$ ، $ب$ المماسان $\overline{أ هـ}$ ، $\overline{ب هـ}$ ،
 فتقاطعا في النقطة $(هـ)$ ، فإذا كان : $\angle م ب هـ = ٧٠^\circ$ ، $\angle م د هـ = ٤٠^\circ$ ،
 $\angle م ب ج = \angle م د ج = ٣٩^\circ$ ، فأوجد قياس زوايا المثلث $أ ب ج$


٥ : ٩ الأوضاع النسبية لدائرتين

هناك ثلاث حالات للأوضاع النسبية لدائرتين وهي :

أولاً : دائرتان منفصلتان :

في هذه الحالة لا توجد أي نقطة مشتركة بين الدائرتين أي أن :

ويقال عنهما دائرتان منفصلتان وفيهما حالتان هما : $\Phi = \mathcal{M}_1 \cap \mathcal{M}_2$




شكل (٥ - ٧٧)

وأن خط المركزين (البعد
بين المركزين) M_1M_2 يكون :

أكبر من مجموع طولي نصفي
القطرين للدائرتين. أي أن $|M_1M_2| < r_1 + r_2$
[انظر الشكل (٥ - ٧٧) .


الحالة الثانية : إحداهما تحوى الأخرى وبالتالي .



شكل (٥ - ٧٨)

اما أن تشتركا في المركز
وفي هذه الحالة نجد أن خط
المركزين يكون : $|M_1M_2| = 0$ صفراً
[انظر الشكل (٥ - ٧٨) .

واما أنهما مختلفتا المركزين وفي
هذه الحالة خط المركزين يكون أصغر من
مجموع نصفي قطريهما أي أن :




شكل (٥ - ٧٩)

$|M_1M_2| > r_1 + r_2$
[انظر الشكل (٥ - ٧٩) .

ثانياً : دائرتان متماستان :

في هذه الحالة توجد نقطة واحدة مشتركة (نقطة تماس) بين الدائرتين
 M_1, M_2 أي أن : $\{P\} = M_1 \cap M_2$ حيث P نقطة التماس ، وفي هذه الحالة
يقال أن الدائرتين متماستان وهناك حالتان هما :

الحالة الأولى : الدائرتان متماسكتان من الداخل




في نقطة ١ [انظر الشكل (٨٠-٥)]

$$\text{فيكون } |O_1O_2| = \text{نق}_1 - \text{نق}_2$$

شكل (٨٠-٥)

الحالة الثانية : الدائرتان متماسكتان من الخارج في



نقطة ١ [انظر الشكل (٨١-٥)]


$$\text{فيكون } |O_1O_2| = \text{نق}_1 + \text{نق}_2$$

شكل (٨١-٥)

ثالثاً : دائرتان متقاطعتان :

في هذه الحالة توجد نقطتان مشتركتان أو أكثر بين الدائرتين ، وفيها حالتان :

الحالة الأولى : الدائرتان المتقاطعتان بنقطتين فقط هما ١ ، ب



[انظر الشكل (٨٢-٥)] ،

$$O_1O_2 \cap O_2O_1 = \{P, Q\} \text{ حيث}$$

١ ، ب نقطتا التقاطع ويكون :


$$|O_1O_2| > \text{نق}_1 + \text{نق}_2$$

ويسمى $\overline{AB}$ وتر مشترك للدائرتين . شكل (٨٢-٥)


الحالة الثانية : الدائرتان متقاطعتان بأكثر من نقطتين ، فهما متطابقتان ، أي أن :

$$O_1O_2 \cap O_2O_1 = O_1O_2 \text{ ويكون } |O_1O_2| = \text{صفرًا}$$

نقطة التماس لدائرتين تقع على خط المركزين .



شكل (٥ - ٨٣)



شكل (٥ - ١٨٣)

المعطيات : م ، د دائرتان متماستان في

النقطة أ [انظر الشكلين

. [(٥ - ٨٣ ، ب)] .

المطلوب : إثبات أن :

م ، أ ، د على استقامة واحدة

البرهان :

∴ $\widehat{ABM}$ مماس مشترك للدائرتين عند أ

∴ $\angle APM = 90^\circ$ و $\angle BDM = 90^\circ$

و $\angle APM = 90^\circ$

∴ $\angle APM = 90^\circ$ و $\angle BDM = 90^\circ$ [انظر الشكل (٥ - ١٨٣)]

∴ $\widehat{ABM}$ منطبق على $\widehat{ABM}$ [انظر الشكل (٥ - ٨٣ ، ب)]

∴ م ، أ ، د على استقامة واحدة ،


وحيث أن $\overline{MD}$ هو خط المركزين ،

∴ النقطة أ (نقطة التماس) تقع على خط المركزين . وهو المطلوب .

مثال (١)

م ، د دائرتان متماستان من الخارج في نقطة أ . رسم $\overline{S}$ يمر بالنقطة

أ بحيث يقطع الدائرة م في س ، الدائرة د في ص ، أثبت أن : $\overline{SM} \parallel \overline{SD}$.



شكل (٥ - ٨٤)

الخارج في نقطة ١، $\overline{س ص}$
يمر بالنقطة ١، يقطع م في س،
د في ص .

المطلوب: إثبات أن : $\overline{س م} \parallel \overline{ص د}$.

العمل : نرسم خط المركزين م د [انظر الشكل (٥ - ٨٤)] .

البرهان : $|م ا| = |م س| = |نق$

∴ $\angle(م س ا) = \angle(م ا س) \dots (١)$ $\Delta(م س ا)$ متساوي الساقين

بالمثل $\angle(م د ا) = \angle(م ا د) \dots (٢)$ $\Delta(م د ا)$ متساوي الساقين

ولكن $\angle(م ا س) = \angle(م ا د)$ (بالتقابل بالرأس) $\dots (٣)$

بمقارنة (١)، (٢)، (٣) نحصل على أن :

$\angle(م س ا) = \angle(م د ا)$ وهما متبادلتان .

∴ $\overline{س م} \parallel \overline{ص د}$ وهو المطلوب .

مبرهنة (٥ - ١٤) :


خط المركزين لدائرتين متقاطعتين يكون عمودياً على الوتر المشترك وينصفه .

المعطيات : م، د دائرتان متقاطعتان في ١، ب ،

م د يقطع الوتر المشترك $\overline{ا ب}$ في س .

المطلوب : إثبات أن :

$\overline{م د} \perp \overline{ا ب}$ وينصفه .



شكل (٥ - ٨٥)

$$\left. \begin{aligned} \Delta \Delta : \Delta \text{ م د ، ب م د فيهما } | \Delta \text{ م } | &= | \text{ ب م } | = | \text{ نق } _1 \\ | \Delta \text{ د } | &= | \text{ ب د } | = | \text{ نق } _2 \\ \Delta \text{ م د } &\text{ ضلع مشترك} \end{aligned} \right\}$$

$$\therefore \Delta \text{ م د } \cong \Delta \text{ ب م د} .$$

$$\therefore \sphericalangle (\Delta \text{ م د } \times) = \sphericalangle (\Delta \text{ ب م د } \times)$$


$\Delta \text{ م د } : \text{ م د ب متساوي الساقين فيه } (| \Delta \text{ م } | = | \text{ ب م } |) , \text{ م س } \text{ منصف زاوية الرأس م} .$

$$\therefore \text{ م س } \perp \overline{\text{ ا ب }} \text{ وينصفه (مبرهنة)}$$

$$\therefore \text{ م د } \perp \overline{\text{ ا ب }} \text{ وينصفه وهو المطلوب} .$$

مثال (٢)

الدائرتان م ، د متقاطعتان في ب ، ج ، رسم و ه يمر بالنقطة ب ، ويوازي م د فقطع الدائرتين م ، د في و ، ه على التوالي .
أثبت أن : (١) $\overline{\text{ ب ج }} \perp \overline{\text{ و ه }}$ (٢) $| \Delta \text{ م د } | = | \Delta \text{ و ه } |$.



شكل (٥ - ٨٦)

المعطيات : م ، د دائرتان متقاطعتان في ب ، ج ،
و ه يمر بالنقطة ب ويقطع م في و ، د في ه ،
 $\overline{\text{ و ه }} \parallel \overline{\text{ م د }}$

[انظر الشكل (٥ - ٨٦) .]

المطلوب : إثبات أن : أولاً : $\overline{\text{ ب ج }} \perp \overline{\text{ و ه }}$ ثانياً : $| \Delta \text{ و ه } | = | \Delta \text{ م د } |$.

م د ⊥ ب جـ وينصفه (مبرهنة)

م د // و هـ (معطى)

∴ ب جـ ⊥ و هـ (وهو المطلوب أولاً) .


في Δ ج و هـ : م د // و هـ ، م د ينصف و جـ ، ج هـ

$$∴ |م د| = \frac{1}{2} |و هـ| .$$

$$∴ |و هـ| = 2 |م د| \quad \text{وهو المطلوب ثانياً .}$$

مثال (٣)

م ، د دائرتان متقاطعتان في س ، ص ، رسم م د فقطع س ص في ع بحيث كان |ع م| = 2 |ع د| ، ثم رسم س د و مد حتى لاقى محيط الدائرة د في ل .
اثبت أن : الشكل م ص ل ع متوازي أضلاع .



شكل (٥-٨٧)

المعطيات : م ، د دائرتان متقاطعتان في س ، ص

م د ، س ص يتقاطعان في ع

$$|ع م| = 2 |ع د|$$

رسم س د و مد حتى لاقى محيط الدائرة د في ل [انظر الشكل (٥-٨٧)] .

المطلوب : إثبات أن : الشكل م ص ل ع متوازي أضلاع .

البرهان :

م د ⊥ س ص وينصفه (مبرهنة)

$$|س ع| = |ع ص|$$

$$\therefore \overline{ع د} // \overline{ص ل} ، |ع د| = \frac{1}{2} |ص ل|$$

$$\therefore \overline{م د} // \overline{ص ل} \dots (١)$$

$$، \therefore |ع م| = \frac{1}{2} |ع د| \quad (\text{معطى})$$

$$\therefore |ع م| = |ص ل| \dots (٢)$$

في الشكل م ص ل ع :

من (١) : $\overline{م ع} // \overline{ص ل}$

ومن (٢) $|ع م| = |ص ل|$.

$\therefore$ الشكل م ص ل ع متوازي أضلاع وهو المطلوب .

تمارين ومسائل

[١] دائرتان متماستان ، نصف قطريهما ٣ سم ، ٢ سم ، ما المسافة بين مركزيهما

(١) إذا كانتا متماستين من الداخل . ب) إذا كانتا متماستين من الخارج .

[٢] م ، د دائرتان متماستان من الخارج في ب ، س نقطة خارجهما رسم

منها المماس المشترك س ب والمماس س ا للدائرة م ، والمماس س جـ


للدائرة د . أثبت أن : $|س ا| = |س ب| = |س جـ|$.

[٣] م ، د دائرتان متماستان من الخارج في ا ، رسم ب جـ المماس المشترك

لهما مس د في ب ، ومس م في جـ . أثبت أن :

(١) المماس المشترك للدائرتين عند ا ينصف ب جـ .

ب) وه (ب ا جـ) = ٩٠°



شكل (٥-٩٠)

[١] حدد في الشكل (٥ - ٩٠)

١) ثلاثة أنصاف أقطار .

ب) قطرين .

جـ) نصف دائرة .

د) أربعة أقواس .


[٢] $\overline{أ ب}$ وتر في دائرة طوله ٢٤ سم ، وبعده عن المركز هـ سم ، $\overline{ج د}$ وتر

آخر في الدائرة بعده عن المركز ١٢ سم ، احسب طول $\overline{ج د}$.

[٣] $\overline{أ ب}$ ، $\overline{أ ج}$ وتران في الدائرة م ، و $(\angle ب أ ج = ٥٤^\circ)$ ، هـ منتصف

$\overline{أ ب}$ ، $\overline{أ ج}$ على الترتيب . رسم $\overline{و م}$ فقطع $\overline{أ ج}$ في و ، أثبت أن :

$$|م هـ| = |هـ و| .$$



شكل (٥-٩١)

[٤] في الشكل (٥ - ٩١) : م مركز

الدائرة ، و $(\angle ص م س = ٤٠^\circ)$

$\overline{م ص} \parallel \overline{ع س}$ ، أوجد


و $(\angle ص ع س)$ ، و $(\angle س ص س)$

[٥] في الشكل (٥ - ٩٢) : س ص ع

مثلث فيه $|س ص| = |س ع|$.

$\overline{ص ع}$ قطر الدائرة (م) . أوجد

و $(\angle س ص ع)$ ، و $(\angle س ع ص)$.




شكل (٥-٩٢)

و (١٨ م ب) = ٩٠ . أوجد قيم

س ، ص بالدرجات .

[٧] أثبت أن الزاويتين المتقابلتين في الشكل الرباعي الدائري متكاملتان .



شكل (٥-٩٤)

[٨] في الشكل (٥-٩٤): م مركز

الدائرة ، أوجد ω (α م ب) .

[٩] فى الشكل (٥ - ٩٥) : م ، د دائرتان

مقاطعتان في ١، ب. أس قطر في

الدائرة م ، $\overline{AC}$ قطر في الدائرة د ،

مد $\overline{AB}$ على استقامته إلى النقطة ع .

فإذا كان: $\overline{CS}$ مماساً للدائرة M ، $\overline{CS}$

مماساً للدائرة $\odot$. وإذا كان $\overline{M \odot}$ يقطع

$\overline{ab}$ في ج ، $w = (x \text{ س } a \text{ ب}) = w(x \text{ ص } a \text{ ب})$ ، أثبت أن :

٢) الشكل ع س ١ ص رباعي دائري. ب) النقاط س، ب، ص على استقامة واحدة.

[١٠] ا ب ج د ، شكل رباعي مرسوم داخل دائرة ، فإذا كان $\angle ج$ ينصف كلا

من الزاويتين ١ ، ج ، فأثبت أن $\overline{AJ}$ قطر في الدائرة .

[١١] ا ب ج مثلث مرسوم في دائرة فيه : و (ا ج) = ٤٠° ، و (ج ب) = ٨٠° ،

رسم $\overleftrightarrow{S}$ مماساً للدائرة وماراً بالنقطة A بحيث $AS \perp$ ، AS في جهتين

مختلفتين من $\overline{A}$ ، عينت النقطة $\mathcal{D}$ على $\overleftarrow{A}$ بحيث $|A| = |A \cup \mathcal{D}|$

[١٣] م ، د دائرتان متماستان من الخارج في ١ . رسم ب ج ماراً بالنقطة ١ ويقطع م في ب ، ويقطع د في ج ، أثبت أن : القطر ب ص // القطر ج س .

[١] ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي :

(١) مساحة القطاع الدائري. (٢) طول قوس القطاع الدائري الصغير.

(٣) طول قوس القطاع الدائري الكبير .

(ب) قياس الزاوية المحيطية يساوي :

(١) ضعف قياس قوسها المقطوع . (٢) قياس قوسها المقطوع .

(٣) نصف قياس قوسها المقطوع .

(ج) قياس الزاوية المركزية يساوي :

(١) ضعف قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها بالقوس .

(٣) قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها بالقوس .

(٤) الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة تكون :

(١) زاوية منفرجة . (٢) زاوية حادة . (٣) زاوية قائمة .

(هـ) الزاوية المركزية المقابلة لقوس $= ١٨٠^\circ$:

(١) زاوية قائمة . (٢) زاوية مستقيمة . (٣) زاوية حادة .

(و) الزاويتان المحيطيتان المرسومتان في قوس واحد من الدائرة تكونان :

(١) متطابقتان . (٢) متكاملتان . (٣) متتامتان .


[٢] $\overline{AB}$ وتر في الدائرة م ، نقطة E منتصف $\overline{AB}$. و $(\angle MEA) = ٢٥^\circ$.

أوجد و $(\angle MEA)$.

[٣] في الشكل (٥ - ٩٦) :

م مركز الدائرة ، أوجد

قيم S ، V .



شكل (٥ - ٩٦)

[٤] $\triangle ABC$ شكل رباعي دائري ، $\overline{AB}$ قطر في الدائرة . و $(\angle BAC) = ٣٥^\circ$.

أوجد و $(\angle BAC)$.

[٥] م ، د دائرتان متقاطعتان في P ، ب ، فإذا كانت S نقطة على

محيط (م) ، ورسم منها مماس يقطع امتداد $\overline{BP}$ في النقطة ع وكان

$\overline{DE}$ يقطع $\overline{AB}$ في E . المطلوب :

(١) أثبت أن الشكل SME رباعي دائري .


(ب) إذا كان و $(\angle BAC) = ٣٠^\circ$ ، فأثبت أن $\triangle SME$ متساوي

الأضلاع .

البعد بين نقطتين


٦ : ١

نشاط (١)



- في مستوى إحداثي، ارسم ΔABC حيث $A(2, 3)$ ، $B(1, 3)$ ، $C(1, 1)$ ،
 جـ $(1, 1)$ [انظر الشكل (١-٦)].
 - ما نوع المثلث ABC ؟
 - ما طول AB ؟ ما طول BC ؟
 - استخدم مبرهنة فيثاغورس لحساب طول AC .

نشاط (٢)



- لتكن $A(3, 4)$ ، $B(2, 4)$ ، $C(2, 2)$ [انظر الشكل (٢-٦)]
 - ارسم من A مستقيماً يوازي محور الصادات،
 ومن B مستقيماً يوازي محور السينات.
 لتكن D نقطة تقاطع المستقيمين.

- ما إحداثي النقطة ج بدلالة إحداثيات أ ، ب ؟
- ما نوع المثلث أ ب ج ؟
- ما طول ب ج ؟ وما طول أ ج ؟
- استخدم مبرهنة فيثاغورس لحساب طول أ ب ،
- مما سبق نستنتج أنه :

إذا كان أ (س_١ ، ص_١) ، ب (س_٢ ، ص_٢) فإن

$$|أ ب| = \sqrt{(س_١ - س_٢)^2 + (ص_١ - ص_٢)^2}$$

مثال (١)

أوجد البعد بين النقطتين أ ، ب في الحالات الآتية :

١ (١ ، ٥) ، ب (٢ ، ٢) ٢ (٢ ، ٣) ، ب (٥ ، ٢) ٣ (١ ، ٣) ، ب (٥ ، ٢)

الحل : [١] البعد بين نقطتين أ ، ب =

$$|أ ب| = \sqrt{(س_١ - س_٢)^2 + (ص_١ - ص_٢)^2}$$

$$= \sqrt{(٢ - ١)^2 + (٢ - ٥)^2}$$

وحدة طولية $\sqrt{٦٥} = \sqrt{١٦ + ٤٩} = \sqrt{(٤-)^2 + (٧-)^2}$

$$(٢) |أ ب| = \sqrt{(١ - ٢)^2 + [(٣ -) - ٥ -]^2}$$

$$\text{وحدة طولية} \quad \sqrt{13} = \sqrt{9+4} = \sqrt{9+2(2-)} =$$

مثال (٢)

لتكن Δ ب ج (٢، ٢)، ب (١-، ٥)، ج (١، -٥). برهن أن Δ ب ج قائم الزاوية .

الحل :

$$|أ ب| = \sqrt{(2-1)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10} \text{ وحدة طولية،}$$

$$|أ ج| = \sqrt{(2-1)^2 + (2+5)^2} = \sqrt{1+49} = \sqrt{50} \text{ وحدة طولية،}$$

$$|ب ج| = \sqrt{(1-1)^2 + (5+5)^2} = \sqrt{0+100} = 10 \text{ وحدة طولية،}$$

$$|أ ب|^2 + |أ ج|^2 = 10 + 50 = 60 = |ب ج|^2$$

$$|أ ب|^2 + |أ ج|^2 = |ب ج|^2$$

$$|أ ب|^2 + |أ ج|^2 = |ب ج|^2$$

∴ Δ ب ج قائم الزاوية في ب .

مثال (٣)

إذا كانت Δ ب ج (٣، ٥)، ب (١-، ٤)، ج (٢-، ٢)، د (٢، ١-)، فبرهن أن الشكل أ ب ج د متوازي أضلاع ، ثم أوجد طول كل من قطريه .

$$\sqrt{17}V = \sqrt{16+1}V = \sqrt{2(3-1-)} + \sqrt{2(5-4-)}V = |ب أ|$$

$$\sqrt{37}V = \sqrt{1+36}V = \sqrt{2(1+2-)} + \sqrt{2(4-2-)}V = |ب ج|$$

$$\sqrt{17}V = \sqrt{16+1}V = \sqrt{2(2+2-)} + \sqrt{2(2+1-)}V = |س ج|$$

$$\sqrt{37}V = \sqrt{1+36}V = \sqrt{2(3-2-)} + \sqrt{2(5-1-)}V = |س أ|$$

لاحظ أن :

$$|ب ج| = |س أ| ، \quad |ب ج| = |س أ|$$

∴ الشكل أ ب ج و متوازي أضلاع لأن فيه كل ضلعين متقابلين متساويان

$$\sqrt{74}V = \sqrt{25+49}V = \sqrt{2(3-2-)} + \sqrt{2(5-2-)}V = |ب ج|$$

$$\sqrt{34}V = \sqrt{9+25}V = \sqrt{2(1+2-)} + \sqrt{2(4-1-)}V = |س ب|$$

تمارين ومسائل

[١] أوجد البعد بين النقطتين في كل زوج مما يلي :

- أ) س (٠، ٣) ، ص (٤، ٤) ب) س (٢، ٤-) ، ص (٣، ٥)
 ج) س (٢-، ٠) ، ص (١، ٤) د) س (٣، ٤-) ، ص (٣، ٥-)
 هـ) س (١-، ٥-) ، ص (٤، ٢) و) س (٤، ٧) ، ص (١-، ٦-)

قائم الزاوية ، وحدد رأس الزاوية القائمة .

[٣] إذا كانت $س$ و $(١-، ١-)$ ، هـ $(١-، ٣)$ ، و $(١، ٤)$ ، فبرهن أن Δ هـ و متساوي الساقين .

[٤] إذا كانت س $(٥، ١)$ ، د $(٢-، ٦)$ ، ل $(٥-، ٤)$ ، ط $(٢، ١-)$ ، فبرهن أن الشكل س د ل ط متوازي أضلاع .


[٥] أثبت أن النقاط أ $(٧، ٤)$ ، ب $(٣، ٢)$ ، جـ $(١-، ٤)$ ، و $(٣، ٦)$ هي رؤوس معين ، احسب مساحته .

[٦] أثبت أن النقاط هـ $(٣، ١)$ ، و $(١-، ٤)$ ، ل $(٧-، ٤-)$ ، ط $(٣-، ٧-)$ هي رؤوس مستطيل ، أوجد محيطه ومساحته .

احد اثبات منتصف القطعة المستقيمة

٦ : ٢

نشاط (١)



لتكن أ $(٨، ٥)$ ، ب $(٢، ١)$ نقطتين في مستوى إحداثي [انظر الشكل (٦-٣)] ،

- اسقط من أ ، ب عمودين على محور السينات يقطعانه في أ_١ ، ب_١ .
- لتكن م_١ هي منتصف $\overline{أ١ ب١}$ ،

ما إحداثي النقطة م_١ ؟

النسبي للنقطة م .

– أسقط من $أ$ ، ب عمودين على محور الصادات تقطعه في النقطتين $أ_٢$ ، $ب_٢$ على التوالي .


– لتكن $م_٢$ نقطة منتصف $أ_٢ ب_٢$ ، ما إحداثي النقطة $م_٢$.

– اقم من $م_٢$ عمودياً على محور الصادات يلاقي $أب$ في نقطة $د$.
ما الإحداثي الصادي للنقطة $و$.

– هل تنطبق نقطة $م$ على نقطة $د$ ؟ تلاحظ انهما نقطة واحدة .

– ما إحداثي النقطة $م$ تلاحظ أن نقطة $م$ منتصف $أ ب$.

نشاط (٢)



شكل (٦ - ٤)

– اختر نقطتين مثل $أ(١, ١)$ ، $ب(٤, ٤)$ ،

$ب(٤, ٤)$ ، $أ(١, ١)$ ، ثم ارسم $أب$

[انظر الشكل (٦ - ٤)] ،

– باستخدام المسطرة أو الفرجار حدد

منتصف $أب$ ولتكن النقطة $ج$ نس

– أوجد إحداثي النقطة $ج$.

– قارن إحداثي النقطة $ج$ بمجموع

الإحداثيين السينيين والصاديين

للنقطتين $أ$ ، $ب$.

إذا كانت $أ(س_١، ص_١)$ ، $ب(س_٢، ص_٢)$ ، فإن إحداثي منتصف $\overline{أب}$

ولتكن $م$ هي $(\frac{س_١ + س_٢}{٢} ، \frac{ص_١ + ص_٢}{٢})$.

مثال (١)

أوجد منتصف $\overline{أب}$ في كلٍّ من الحالتين التاليتين :

(١) $أ(١، ٢)$ ، $ب(٦، ١٤)$ (٢) $أ(-٨، ٥)$ ، $ب(٤، -٣)$.

الحل :

$$(١) م = (\frac{س_١ + س_٢}{٢} ، \frac{ص_١ + ص_٢}{٢}) = (\frac{١ + ٦}{٢} ، \frac{٢ + ١٤}{٢}) م = (\frac{٧}{٢} ، \frac{١٦}{٢})$$

$$(٢) م = (\frac{س_١ + س_٢}{٢} ، \frac{ص_١ + ص_٢}{٢}) = (\frac{-٨ + ٤}{٢} ، \frac{٥ + (-٣)}{٢}) م = (-٢ ، ١)$$

مثال (٢)

إذا كان $أب$ جدو متوازي أضلاع ، حيث $أ(٥، ٥)$ ، $ب(٣، ١)$ ،
جدو $(-٣، ١)$ ، فأوجد إحداثي النقطة و .

الحل :

لتكن $م$ نقطة تقاطع قطري متوازي الأضلاع ،

∴ $م$ منتصف كلٍّ من $\overline{أج}$ ، $\overline{ب و}$.

$$\therefore م = \left(\frac{3-5}{2}, \frac{1-5}{2} \right) = \left(\frac{2}{2}, \frac{4}{2} \right) = (1, 2)$$

$\therefore$ ب (1, 3) ، لتكن و (س، ص)

$$\therefore م = \left(\frac{ص+1}{2}, \frac{س+3}{2} \right) = (1, 2)$$

$$\therefore 1 = \frac{س+3}{2} \quad \text{ومنها} \quad 2 = 3 + س \quad ، \quad 1 = س$$

$$، \quad 2 = \frac{ص+1}{2} \quad \text{ومنها} \quad 4 = 1 + ص \quad ، \quad 3 = ص$$

فتكون و (3, 1-).

تمارين ومسائل

[١] أوجد إحداثي نقطة منتصف $\overline{سص}$ في كلِّ الحالات الآتية :

أ) س (5, 4) ، ص (1, 2-)

ب) س (3-، 5-) ، ص (1-، 0)

ج) س (5، 1، 2) ، ص (3-، 3، 5-)

د) س (5، 2، 0) ، ص (2-، 3، 2)

[٢] لتكن س (2-، 4) ، ص (2، 4) ، ع (0، 6) ، ولتكن م نقطة

منتصف $\overline{سص}$ ، و نقطة منتصف $\overline{صع}$ ، برهن أن $|م| = \frac{1}{2} |س|$.

[٣] أ ب ج د مستطيل فيه : أ (2، 3) ، ب (1-، 3) ، ج (2-، 1-)

و (2، 2-) ، برهن أن القطرين $\overline{أج}$ ، $\overline{ب د}$ ينصف كلُّ منهما الآخر.

و (٢ ، ٠) ، فإذا كانت هـ ، و ، م ، ن منتصفات $\overline{أب}$ ، $\overline{بج}$ ، $\overline{جـد}$ ، و $\overline{أد}$ على الترتيب ، فما نوع الشكل هـ و م ن ؟

٦ : ٣ الانعكاس

درست في الصف السابع الانعكاس في أحد المحورين الإحداثيين ، تذكر أن :

– صورة النقطة (س ، ص) بالانعكاس في محور السينات هي النقطة (س ، - ص)

– صورة النقطة (س ، ص) بالانعكاس في محور الصادات هي النقطة (- س ، ص) .

تدريب (١)


أوجد صورة كلٍ من النقاط : أ (٢ ، ١) ، ب (-١ ، ١) ، جـ (٠ ، -٤) ، د (٣ ، ٠) بالانعكاس في محور السينات مرة وفي محور الصادات مرة أخرى .

في هذا البند ستتعرف على الانعكاس في مستقيم (ليس بالضرورة أن يكون هذا المستقيم أحد محوري الإحداثيات) .

- على ورقة شفافة ، ارسم مستقيم $ل$ ،
- اختر نقطة $أ$ خارجة عن $ل$ [انظر الشكل (٥ - ٦)] .
- اطوِ الورقة حول $ل$ وعين عليها
- النقطة المقابلة للنقطة $أ$ ، سمّها $أ'$.
- افتح الورقة ، وارسم $أأ'$.
- حدد نقطة تقاطع $ل$ مع $أأ'$ ،
- سمّها $د$.

- تحقق من أن $أأ' \perp ل$ ، وأن $|أد| = |أ'د|$.


بالنشاط السابق نكون قد حددنا النقطة $أ'$ صورة النقطة $أ$ بالانعكاس في المستقيم $ل$ ، يسمى $ل$ محور الانعكاس .
وبصورة عامة :



شكل (٦ - ٦)

لإيجاد صورة النقطة $أ$ بالانعكاس في المستقيم $ل$ ، نرسم من $أ$ قطعة مستقيمة عمودية على المستقيم $ل$ ونمدّها على استقامتها بقدر طولها إلى $أ'$ ، فتكون $أ'$ صورة $أ$ بالانعكاس في $ل$ ، كما في الشكل (٦ - ٦) :

إذا كان $أ$ صورة $أ$ بالانعكاس في $\overleftrightarrow{ل}$ ، فإن $أ \perp \overleftrightarrow{ل}$ ، $|أ| = |أ|$ ، حيث $د$ هي نقطة تقاطع $\overleftrightarrow{أأ}$ مع $\overleftrightarrow{ل}$ والعكس صحيح .




شكل (٦ - ٧)

تأمل الشكل (٦ - ٧)، تلاحظ أن :

- صورة $أ$ بالانعكاس في $\overleftrightarrow{ل}$ هي $أ$.
- صورة $أ$ بالانعكاس في $\overleftrightarrow{أأ}$ هي $أ$ نفسها .
- صورة $ب$ بالانعكاس في $\overleftrightarrow{ل}$ هي $أ$.
- صورة $ج$ بالانعكاس في $\overleftrightarrow{أأ}$ هي $د$.
- صورة $ج$ بالانعكاس في $\overleftrightarrow{ل}$ هي $ج$ نفسها .
- صورة $و$ بالانعكاس في $\overleftrightarrow{ل}$ هي $و$ نفسها .
- صورة $و$ بالانعكاس في $\overleftrightarrow{أأ}$ هي $و$ نفسها .


مما سبق نجد أنه :

إذا كانت النقطة $س$ واقعة على محور الانعكاس ، فإن صورتها هي $س$ نفسها .



شكل (٦ - ٨)

- لإيجاد صورة $أ$ بالانعكاس في $\overleftrightarrow{ل}$ ،
- نوجد صورة كل من $أ$ ، $ب$ بهذا
- الانعكاس ثم نصل بين الصورتين
- فنحصل على $\overleftrightarrow{أأ}$ ، هي
- صورة $أ$ بالانعكاس في $\overleftrightarrow{ل}$ ، كما في الشكل (٦ - ٨) :



من الشكل (٦ - ٩) ، أكمل
الجدول التالي ، حيث $\leftrightarrow$ ل هو
محور الانعكاس .

شكل (٦ - ٩)

الشكل	م	هـ	م هـ	س	و هـ	جـ	جـ بـ
الصورة						و جـ	هـ م


خواص الإنعكاس :

نشاط (٢)

على الشكل (٦ - ١٠) :
أ ب جـ مثلث ، إحداثيات رؤوسه ،
هي : (٢ ، ٦) ، (٢ ، ٢) ، (١ - ، ٢)
على الترتيب .

– أنقل الشكل على ورقة رسم بياني ،
ثم ارسم صورته بالإنعكاس في محور
الصادات ، سمّها م ، ب ، جـ .

– باستخدام قانون البعد بين نقطتين




شكل (٦ - ١٠)

- قارن بين طول كل ضلع في Δ $أ ب ج$ وطول صورته في Δ $أ ب ج$.
 ماذا تستنتج بالنسبة لطول كل ضلع وطول صورته بالانعكاس ؟
- باستخدام المنقلة ، قس زوايا كل من المثلثين $أ ب ج$ ، $أ ب ج$.
 ماذا تلاحظ بالنسبة لقياس كل زاوية وقياس صورتها بالانعكاس ؟
 من النشاط السابق نستنتج أن :

١ – الانعكاس في محور يحفظ الأطوال .

٢ – الانعكاس في محور يحفظ قياس الزوايا .

مثال (١)



شكل (٦-١١)

- في الشكل (٦-١١) :
- Δ $أ ب ج$ صورة Δ $أ ب ج$ بالانعكاس في المحور $أ ب$.
- بالاستعانة بالبيانات الموضحة على الشكل ، وباستخدام خواص الانعكاس ،
- أوجد :

(١) قياس كل من :

$\angle أ ب ج$ ، $\angle أ ب ج$ ، $\angle أ ب ج$ ، $\angle أ ب ج$

(٢) $|أ ب|$ ، $|أ ب|$ ، $|أ ب|$ ، $|أ ب|$

(١) $\Delta: \text{س}, \text{ص}, \text{ع} \rightarrow \text{صورة } \Delta \text{ س ص ع}$

$$\lambda_0 = (s \times) \circ = ({}_1 s \times) \circ \therefore$$

(لماذا؟) $\overset{\circ}{o} = (\overset{\circ}{\lambda} + \overset{\circ}{o}) - \overset{\circ}{\lambda} = (\text{ص}, \text{خ}) \sim$

$$o_1 = (\text{ex}) \rightsquigarrow (\text{ex}) \rightsquigarrow$$

$$\circ_1 = (\text{ }_1\text{ } \otimes) \circ = (\text{ } \otimes) \circ ,$$

$$(٢) \quad |s \text{ ص}| = |s_١ \text{ ص}_١| = |٢,٥ \text{ سم}|$$

$$|ص, ع, ا| = |ص ع| = ۳ = سم.$$

س، ع، | = ٢,٥ سم (لماذا؟)

التناظر - محور التناظر :

نشاط (۳)

على الشكل (٦ - ١٢) :

۲ ب ج و مستطیل .

– حدد صور النقاط ا، ع، و، ج، ل، هـ


بالإنعكاس في المحور $s \leftrightarrow s^*$.

– أين تقع صورة كل نقطة بالنسبة للمستطيل

(داخله ، خارجہ ، علیہ) ؟

- اختر نقاطاً أخرى من المستطيل ، تحقق

من أن صورها هي نقاط على المستطيل نفسه.




شكل (٦-١٢)

در خط أن صورة كل نقطة من المستطيل بناءً انعكاس في $\overleftrightarrow{MN}$ هي نقطة على المستطيل نفسه .
 من ذلك نستنتج :

إذا كانت صورة كل نقطة من شكل في المحور $\overleftrightarrow{L}$ هي نقطة على الشكل نفسه ، فإن $\overleftrightarrow{L}$ يسمى محور تناظر ، ونقول أن الشكل متناظر حول هذا المحور .

مثال (١)

في كل شكل من الأشكال (٦ - ١٣ ، ب ، ج) يوجد محوراً إنعكاس حدد أيهما محور تناظر للشكل .



شكل (٦ - ١٣ ج)

شكل (٦ - ١٣ ب)

شكل (٦ - ١٣ أ)

الحل :

في الشكل (٦ - ١٣) : $\overleftrightarrow{AB}$ محور تناظر له ، بينما $\overleftrightarrow{CD}$ لا يمثل محور تناظر للشكل لأن صورة النقطة أ مثلاً بالانعكاس في $\overleftrightarrow{CD}$ تقع داخل الشكل وليس عليه (تحقق من ذلك) .

للشكل .


— في الشكل (٦ - ١٣ ج) : $\overleftrightarrow{ك}$ محور تناظر له ، بينما $\overleftrightarrow{م}$ ليس كذلك .
لماذا ؟

مثال (٣)

١ ب ب ١ ، شكل رباعي متناظر حول محور الصادات ، إذا كانت
١ (٧ ، ٣) ، ب (٣ ، ٧) . عين إحداثي ١ ، ب ، ثم ارسم الشكل .

الحل :

حيث أن الشكل ١ ب ب ١ ، متناظر حول محور الصادات ، فإن
١ ، ب ، هما صورتا ١ ، ب بالانعكاس في محور الصادات .
١ (٧ ، ٣) ∴ (٧ ، ٣-) ١ ،
ب (٣ ، ٧) ∴ (٣ ، ٧-) ١ ،
انظر شكل (٦ - ١٤)




[١] أوجد صورة كلٍ من النقاط التالية : س (١ ، ٣) ، ص (٢ ، -٣) ،

ع (-٣ ، ٢) ، ل (٠ ، ٤) ،

(٢) بالانعكاس في محور السينات ، ب) بالانعكاس في محور الصادات .

[٢] ارسم صورة كلٍ مما يأتي بالانعكاس في $\overleftrightarrow{L}$:



[٣] ارسم صورة المثلث أ ب جـ [شكل (٦-١٥)]

بالإنعكاس في $\overleftrightarrow{ل}$ ، ثم أكمل ما يلي :

١. صورة أ هي أ نفسها ، صورة ب هي ...

٢. صورة جـ هي جـ ، صورة جـ هي ...


٣. صورة جـ ب هي جـ ب ، صورة جـ ب هي ...

٤. المثلث أ ب جـ متساوي الساقين لأن ...

٥. $\overleftrightarrow{ل}$ محور تناظر المثلث ...

٦. يسمى الشكل أ ب جـ ... حول $\overleftrightarrow{ل}$.

٧. و (أ ب جـ) = ...




شكل (٦-١٥)

[٤] فيما يلي :ضع علامة (✓) أسفل الشكل المتناظر بالنسبة للمحور المعطى :



شكل (٦-١٧)

٥] اكتب اسم كل شكل من الأشكال التالية ، وعلِّن المتوازيات فيها ، وارسم محور تناظر له .



٦] كم محور تناظر لكلٍ من :

١) المربع (ب) المستطيل (ج) المثلث المتساوي الساقين (د) الدائرة .

٧] ارسم المربع الذي رؤوسه أ (٢ ، ٢) ، ب (٢ ، ٨) ، ج (٨ ، ٨) ،

و (٨ ، ٢) ثم ارسم صورته بالانعكاس في :

١) المحور الصادي ص ص' .

ب) المحور م م' حيث م (٢ ، ٥) ، م' (٨ ، ٥) .

هل المربع أ ب ج د متناظر بالنسبة للمحور م م' ؟ علل إجابتك ؟

سبق وأن تعرفت على مفهوم الانسحاب .

تذكر أن :

- صورة النقطة (س ، ص) تحت تأثير انسحاب باتجاه محور السينات وبمقدار d من الوحدات هي النقطة (س + د ، ص) .
- صورة النقطة (س ، ص) تحت تأثير انسحاب باتجاه محور الصادات وبمقدار d من الواحدات هي النقطة (س ، ص + د) .
- ويكون الاتجاه موجباً أو سالباً بالنسبة لأي من المحورين بحسب إشارة d .

تدريب

أوجد صورة كلٍّ من النقاط التالية : (١ ، ٣) ، (١ ، -١) ،


(٤ ، -٢) ، (-٢ ، ٠) ، (٠ ، ٢) ، تحت تأثير انسحاب :

أ) بالاتجاه الموجب لمحور السينات بمقدار وحدتين .

ب) بالاتجاه السالب لمحور الصادات بمقدار ٣ وحدات .

في هذا البند ستتعرف على الانسحاب بشكل عام وفي أي اتجاه كان .

نشاط (١)



في الشكل (٦-١٨) : $\overrightarrow{AA'} = d$

- ارسم $\overrightarrow{AA'}$ بحيث : $\overrightarrow{AA'} \parallel \overrightarrow{AB}$ ،
 $| \overrightarrow{AA'} | = d$.

بهذا الإجراء تكون قد عينت $\overrightarrow{AA'}$ صورة A ،

بانسحاب مقداره d سم وباتجاه $\overrightarrow{AB}$.

شكل (٦-١٨)

بالانسحاب السابق نفسه .

– تحقق من أن $\overline{هه_1} \parallel \overline{أب}$ ، $|هه_1| = 3سم$ ،

من النشاط السابق نستنتج أن :

١ – الانسحاب يتحدد بعنصرين هما : المقدار (المسافة) والاتجاه .


٢ – لأي نقطة س من المستوى ، يمكن تعيين الصورة س_١ بانسحاب محدد مقداره واتجاهه .

٣ – تكون النقطة ص_١ صورة للنقطة ص بانسحاب مقداره وحدة طولية واتجاهه $\overleftarrow{أب}$.

إذا كان (١) $صص_1 \parallel \overleftarrow{أب}$

(٢) $|صص_1| = د$.

مثال (١)



في الشكل (٦ – ١٩) : $\overleftarrow{س ع} \parallel \overleftarrow{أ ب}$ ،

$|س ع| = |أ ب|$.

(١) أوجد صورة ١ بانسحاب مسافته $|س ع|$ واتجاهه $\overleftarrow{س ع}$.

(ب) هل ع صورة س بالانسحاب السابق ؟

(ج) إذا كان $|س ع| = |١ ع|$ فهل ١ صورة س


بالانسحاب السابق نفسه ؟

شكل (٦ – ١٩)

- ١) صورة Γ بالانسحاب المعرف سابقاً هي النقطة B ، لأن $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{SE}$ ،
 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{SE}|$.
- ب) نعم لأن $|\overrightarrow{SE}|$ هي نفس مسافة الانسحاب واتجاهه نفس اتجاه الانسحاب .
- ج) لا لأن $\overrightarrow{SA} \nparallel \overrightarrow{SE}$

خواص الانسحاب :

نشاط (٢)



شكل (٦ - ٢٠)

- في الشكل (٦ - ٢٠) :
- ١) B جـ مثلث ، إحداثيات رؤوسه
 $(5, 3)$ ، $(1, 0)$ ، $(1, 3)$ على التوالي .
- ٢) انقل الشكل على ورقة رسم بياني ،
ثم ارسم صورته بانسحاب مسافته
٤ وحدات وباتجاه محور السينات

- الموجب ، تحصل على الصور Γ ، B ، Γ .
- ٣) ما إحداثيات كلٍّ من Γ ، B ، Γ ؟
- ٤) باستخدام قانون البعد بين نقطتين


أوجد كلاً من $|\overrightarrow{AB}|$ ، $|\overrightarrow{BC}|$ ، $|\overrightarrow{AC}|$ ، $|\overrightarrow{A'B}|$ ، $|\overrightarrow{B'C}|$ ، $|\overrightarrow{A'C}|$.

- استخدم المنقلة لقياس زوايا المثلث ١ ب ج و لقياس زوايا المثلث ٢ ب ج .
- ماذا تلاحظ بالنسبة لقياس كل زاوية في المثلث ١ ب ج وقياس صورتها في المثلث ٢ ب ج ؟
- ستلاحظ أن : (١) طول القطع المستقيمة يبقى ثابتاً بعد الانسحاب .
- (٢) قياس الزوايا يبقى هو نفسه بعد الانسحاب .
- من النشاط السابق نستنتج أن :

(١) الانسحاب يحافظ على الأطوال .

(٢) الانسحاب يحافظ على قياس الزوايا .

مثال (٢)



شكل (٦ - ٢١)

في الشكل (٦ - ٢١) :

Δ ١ ب ج صورة المثلث ١ ب ج

بانسحاب مقداره ٣ وحدات طولية واتجاهه ج ب .

فإذا كان $|١ ج| = ٢$ سم ، $ج ب \perp ١ ب$ ،

$و ه \parallel ج ب$ ، و $(١ ج) = ٢٠^\circ$ ،

فأجب على ما يلي :

(٢) بين أن $ج ب \perp ١ ب$

(١) أوجد $|١ ه|$

(٤) أوجد و $(١ ج)$.

(٣) بين أن $و ه \parallel ج ب$

(١) ∴ ١ صورة ١ بانسحاب مقداره = ٣ وحدات

∴ $3 = |111|$ وحدات طولية

(٢) ∴ ب١ صورة ب ، و (ب × ب) = ٩٠ « لأن جَب ⊥ اَب »

∴ و (ب × ب١) = و (ب × ب) = ٩٠ « خواص الانسحاب »

(٣) ∴ ه١ صورة ه .

∴ و (ه × ه١) = و (ه × ه)

لكن و (ه × ه) = و (ب × ب) « لأن و ه // ب ج »

∴ و (ه × ه١) = و (ب × ب) = و (ب × ب١)

∴ و ه١ ه // ب١ ج١ .

(٤) في Δ ا ب ج ، ∴ و (ب × ب) = ٩٠ ، و (ا × ا) = ٢٠

∴ و (ج × ج) = ٧٠

لكن و (ج × ج١) = و (ج × ج) « خواص الانسحاب »

∴ و (ج × ج١) = ٧٠ .

مثال (٣)

Δ س١ ص١ ع١ صورة المثلث س ص ع بالانعكاس في محور السينات ،

حيث س (١- ، ٣) ، ص (١- ، ١) ، ع (٣- ، ١) ، فإذا كان Δ س٢ ص٢ ع٢

صورة Δ س١ ص١ ع١ بانسحاب مقداره ٤ وحدات في الاتجاه الموجب لمحور

السينات ، فأوجد إحداثيات رؤوس المثلث س٢ ص٢ ع٢ .

$$س (١- ، ٣) \leftarrow س (١- ، ٣-)$$

$$ص (١- ، ١) \leftarrow ص (١- ، ١-)$$

$$ع (١ ، ٣-) \leftarrow ع (١- ، ٣-)$$

ثم نوجد صور س ، ص ، ع بانسحاب مقداره ٤ وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السينات كما يلي :

$$س (١- ، ٣-) \leftarrow س (٣- ، ١- + ٤) = س (٣- ، ٣)$$

$$ص (١- ، ١) \leftarrow ص (١- ، ١- + ٤) = ص (١- ، ٣)$$

$$ع (١- ، ٣-) \leftarrow ع (١- ، ٣- + ٤) = ع (١- ، ١)$$

تمارين ومسابائل

[١] عين العبارات الصحيحة و صوّب العبارات الخاطئة فيما يلي :

إذا انسحب شكل هندسي في المستوى فإن :

١) كل نقطة من نقاط الشكل تتحرك نفس المسافة .

ب) جميع القياسات والمسافات بين أجزاء الشكل تبقى ثابتة .

جـ) هناك دائماً نقطة ثابتة . د) يتغير اتجاه الشكل .


[٢] في الشكل (٦ - ٢٢) :

١) صورة أ بانسحاب مسافته = |م جـ| ،

باتجاه م جـ . عيّن :

١) صورة أ بانسحاب مسافته |م و| ،

باتجاه م و .



(٣) ب صورة ب بانسحاب مسافته = |م ج| ، باتجاه م ج .

[٣] ١، ب نقطتان في المستوى الإحداثي حيث ١ (٣، ٢) ، ب (١، ١) ، ح
انسحاب ينقل ب إلى ب١ (١، ٤) ، حدد عناصر ح (مسافته ،
اتجاهه) ثم أوجد إحداثي ١ صورة ١ بهذا الانسحاب .


[٤] ١ ب ج مثلث ، إحداثيات رؤوسه على الترتيب هي : (١، ١-) ،
(٣، ١-) ، (٤، ١) ، أوجد صورة Δ ١ ب ج تحت تأثير :
(١) انعكاس في محور الصادات .

(٢) انسحاب مسافته = ٣ وحدات طولية وفي الاتجاه الموجب لمحور
السينات .


٦ : ٥ الدوران

في الشكل (٦ - ٢٣) ، دائرة
مركزها م ، ١ إحدى نقاطها ، للانتقال
على الدائرة انطلاقاً من النقطة ١ ، يمكنك
أن تسلك أحد الاتجاهين :
الأول : اتجاه عقارب الساعة ، ويسمى
الاتجاه السالب .

الأخر : عكس اتجاه عقارب الساعة ،
يسمى الاتجاه الموجب .



شكل (٦ - ٢٣)



شكل (٦ - ٢٤)


على الدائرة (م) .

– حددنا النقطة S_1 على الدائرة بحيث يكون الاتجاه من S إلى S_1 هو الاتجاه الموجب ، و $\angle (S M S_1) = 60^\circ$ ،
نقول أن : S_1 صورة S بدوران مركزه

(م) ، قياسه $(+60^\circ)$ ونرمز لهذا الدوران بالرمز σ_60 ،

– حددنا النقطة S_2 على الدائرة بحيث يكون الاتجاه من S إلى S_2 هو الاتجاه السالب ، و $\angle (S M S_2) = 30^\circ$ ، لذلك نقول أن :
 S_2 صورة S بدوران مركزه (م) ، قياسه (-30°) ، ونرمز لهذا الدوران بالرمز σ_{-30} .

نشاط (١)



شكل (٦ - ٢٥)

– حدد في مستوى النقطتين M ، P .

– ارسم $\overline{MP}$.

– افتح الفرجال فتحة بقدر $|MP|$.

واركزه على M ، ثم ارسم قوساً من P بالاتجاه الموجب .

– باستخدام المنقلة ، ارسم زاوية قياسها 45° بحيث $\overrightarrow{MP}$ أحد ضلعيها ،

ضلعيها الآخر $\overrightarrow{MA}$ (شعاع يبدأ من M ويقطع القوس في نقطة A)

[انظر الشكل (٦ - ٢٥)] .


– تحقق من أن $|MA| = |MP|$

(م ، + ٤٥) .

– اختر نقاطاً أخرى في المستوى وحدد صورها بالدوران السابق نفسه ،
تحقق في كل مرة أن البعد بين كل نقطة ومركز الدوران يساوي البعد بين
صورة هذه النقطة والمركز نفسه .
من النشاط السابق نستنتج أنه :

- ١ – يمكن تعيين صورة أي نقطة في المستوى بدوران محدد المركز والقياس .
- ٢ – تكون النقطة س_١ صورة النقطة س بدوران مركزه (م) وقياسه (هـ)
إذا كان : $|م س| = |م س_١|$ و $\angle م س س_١ = \angle م س س_٢$ هـ
يكون قياس الدوران موجباً إذا كان الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة .
ويكون سالباً إذا كان مع اتجاه عقارب الساعة .

مثال (١)



شكل (٦ - ٢٦)

- في الشكل (٦ - ٢٦) : $\overline{ل ب}$
تقطع $\overleftrightarrow{ل}$ في النقطة م ، أوجد :
(١) صورة ل بالدوران (م ، + ٦٠)
(٢) صورة ب بالدوران (م ، - ٥٠)
(٣) صورة م بكل من الدورانين السابقين .

الحل :

- (١) صورة ل بالدوران (م ، + ٦٠) هي ل_١ [انظر شكل (٦ - ٢٦)] . لاحظ أن

حركة عقارب الساعة (اتجاه موجب) .

(٢) بنفس الطريقة السابقة [انظر الشكل (٦ - ٢٦)] حيث ب_١ صورة ب بالدوران (م ، - ٥٠) والاتجاه من ب إلى ب_١ ، مع اتجاه حركة عقارب الساعة (اتجاه سالب) .


(٣) صورة م بكلٍ من الدورانين السابقين هي م نفسها ، لأنها مركز الدوران

مثال (٢)

ارسم صورة $\overline{س ص}$ تحت تأثير : (١) و (م ، - ٩٠)

(٢) و (م ، + ٩٠) .

الحل :



[انظر الشكل (٦ - ٢٧)] .


الاتجاه هنا سالب (مع عقارب الساعة) .

شكل (٦ - ٢٧)


انظر الشكل (٦ - ٢٨) .

الاتجاه هنا موجب

(عكس عقارب الساعة)



شكل (٦ - ٢٨)



شكل (٦ - ٢٩)

– على مستوى إحداثي، حدد النقطتين

أ (١، ٢)، ب (٢، ١) كما

في الشكل (٦ - ٢٩).

– عين أ صورة أ بالدوران (م، +٩٠°).

– عين ب صورة ب بالدوران (م، -٩٠°).

– ما إحداثي أ؟ قارن بإحداثي أ.

– ما إحداثي ب؟ قارن بإحداثي ب.

– تلاحظ أن أ (١، ٢)، ب (٢، ١)، ج (٣، ١).

– اختر نقاطاً أخرى في المستوى، عين صورها بالدوران (م، +٩٠°) مرة

وبالدوران (م، -٩٠°) مرة أخرى، قارن بين إحداثي كل نقطة وإحداثي

صورتها، ماذا تلاحظ؟

من النشاط السابق نستنتج أنه :

لأي نقطة (س، ص) في المستوى الإحداثي :

أ) صورة النقطة (س، ص) تحت تأثير و (و، +٩٠°) هي

النقطة (ص، س).

ب) صورة النقطة (س، ص) تحت تأثير و (و، -٩٠°) هي

النقطة (ص، -س).

و هي نقطة الأصل (٠، ٠).

أ (٣، ٠)، ب (٢، ٣)، ج (٢، ٠)، د (٠، ٠)، هـ (٠، ٢)، و (١، -١) تحت تأثير (١) و (و، ٩٠+) و (٢) و (و، ٩٠-) حيث و نقطة الأصل.


الحل :

أ (٣، ٠)، ب (٣، ٢)، ج (٣، ٢)، د (٠، ٢)، هـ (٠، ٠)، و (١، -٢).

أ (٣، ٠)، ب (٣، ٢)، ج (٣، ٢)، د (٠، ٢)، هـ (٠، ٠)، و (١، -٢).

خواص الدوران :

نشاط (٣)



١) على مستوى إحداثي ، ارسم المثلث أ ب ج، حيث أ (٣، ٣) ب (١، ٣)، ج (١، -١) كما في الشكل (٦ - ٣٠) .
٢) أوجد صورة Δ أ ب ج بالدوران (و، ٩٠+)، سمّ المثلث الناتج أ، ب، ج.

١، ب، |، |ب، ج، |، |، ج، |.

٤) قارن بين أطوال أضلاع المثلث ١ ب ج ونظائرها في المثلث ١ ب ج.

٥) باستخدام المنقلة أوجد قياس كل من $\angle$ ، $\angle$ ب ، $\angle$ ج ، $\angle$ د.

$\angle$ ب ، $\angle$ ج.

٦) قارن بين قياسات زوايا المثلث ١ ب ج ونظائرها في المثلث ١ ب ج.

من النشاط السابق نستنتج أن :

١) الدوران يحافظ على الأطوال

٢) الدوران يحافظ على قياس الزوايا.

تمارين ومسائل

[١] فسر معنى كل مما يأتي :

١) د (٣٠ + ، م) د (٢) د (٩٠ + ، و) د (٣) د (٩٠ - ، و) .

[٢] أوجد صور كل من النقاط الآتية : ١) (٢ - ، ٠) ، ب (٠ ، ٥) ، ج (- ٣ ، ٢)

تحت تأثير كل من : ١) د (٩٠ + ، و) د (٢) د (٩٠ - ، و) .


[٣] في الشكل (٦ - ٣١) : دائرة

مركزها (م) ، ب نقطتان عليها،

حدد النقطتين ١ ، ب بحيث :

١) صورة ١ بالدوران (م ، ٧٠)

٢) صورة ب بالدوران (م ، ٣٠) .



شكل (٦ - ٣١)

[٤] أنقل الشكل (٦ - ٣٢) :

ثم ارسم صورة $\overline{س ص}$
بالدوران (١ ، - ٩٠) .

شكل (٦ - ٣٢)

ص

٢ x

[٥] في مستوى إحداثي، ارسم Δ أ ب ج، حيث أ (٣ ، ٢) ، ب (١ ، ٣) ،

جـ (١ ، ١) ، ثم ارسم صورته بالدوران (و ، + ٩٠) .

[٦] إذا كانت أ صورة النقطة أ بالدوران (م ، - ٤٥) ، فما الدوران الذي

يجعل النقطة أ صورة للنقطة أ ؟

٦ : ٦ التكبير

تمهيد :

تذكر أن كلاً من الانعكاس والانسحاب والدوران يحول كل نقطة في المستوى إلى نقطة أخرى في المستوى نفسه ، لذلك نسمي كل منها **تحويلاً هندسياً** ، وتذكر أيضاً أن التحويلات سابقة الذكر تحفظ قياس الأطوال ، لذلك تسمى **تحويلات متقايسة** .


في هذا البند ستتعرف على تحويل هندسي رابع يسمى التكبير ، وهو تحويل لا يحفظ الأطوال .

نشاط (١)

في الشكل (٦ - ٣٣) : س ، ص ، م

ثلاث نقاط في المستوى .

شكل (٦ - ٣٣)



– ارسم م س ، وحدد عليه س_١ بحيث $\frac{1}{1} = \frac{|م س|}{|م س|}$ ،

بهذا الاجراء تكون قد حددت النقطة س_١ صورة النقطة س بتكبير مركزه م ونسبته ٢ ، تسمى هذه النسبة معامل التكبير .

– لتكن ص_١ صورة ص بتكبير مركزه م ، ونسبته ٢ .

– ما الشروط التي يجب أن **تحفظ** لهذا التكبير ؟

الشروط : (١) أن تقع ص_١ على م ← ص .

$$(٢) \quad ٢ = \frac{|م ص|}{|م ص|}$$

– اختر نقاطاً أخرى في المستوى ، وحدد صورها بالتكبير السابق نفسه ماذا تلاحظ ؟


من النشاط السابق نستنتج أنه :

– لأي نقطة س في المستوى يمكن تعيين س_١ صورة س بتكبير محدد المركز والمعامل .

– تكون النقطة س_١ صورة النقطة س بتكبير مركزه م ومعامله د ، إذا كان :

$$(١) \quad س, م \ni م \leftarrow س \quad (س, م \text{ تقع على } م \leftarrow س) .$$

$$(٢) \quad د = \frac{|م س|}{|م س|} .$$



شكل (٦-٣٤)

على مستوى إحداثي، حدد النقطة

١ (١، ٢) كما في الشكل (٦-٣٤)

– حدد النقطة ١ صورة ١ بتكبير مركزه

و [نقطة الأصل (٠، ٠)] ومعامله ٣.

– ما إحداثي النقطة ١ ؟

– إذا كانت ب (٢، ٣)، فما إحداثي

صورتها ب بالتكبير السابق نفسه ؟

– ما نسبة إحداثي كل صورة إلى إحداثي النقطة نفسها ؟

– قارن تلك النسب بمعامل التكبير ، ماذا تلاحظ ؟

تلاحظ أن :

$$\frac{\text{الإحداثي السيني لـ ١}}{\text{الإحداثي السيني لـ ب}} = \frac{\text{الإحداثي السيني لـ ١}}{\text{الإحداثي السيني لـ ب}} = ٣ = \text{معامل التكبير}$$

$$\frac{\text{الإحداثي الصادي لـ ١}}{\text{الإحداثي الصادي لـ ب}} = \frac{\text{الإحداثي الصادي لـ ١}}{\text{الإحداثي الصادي لـ ب}} = ٣ = \text{معامل التكبير}$$

من النشاط السابق نستنتج أن :

صورة النقطة (س ، ص) بتكبير مركزه نقطة الأصل (٠ ، ٠)

ومعامله د هي (د س ، د ص) .

سنرمز للتكبير الذي مركزه م ومعامله د بالرمز ت (م ، د)

وحيث أن التكبير : ت (م ، د) يمثل النقطة (س ، ص) إلى النقطة

(د س ، د ص) فإننا نعبر عن ذلك رمزياً كما يلي :

ت : (س ، ص) $\leftarrow$ (د س ، د ص) .

مثال (١) عين صورة كل نقطة مما يأتي بالتكبير [٢ ، (٠ ، ٠)] أي :

ت : (س ، ص) $\leftarrow$ (٢ س ، ٢ ص) .

(أ) (٣ ، ٣ -) ، (ب) (٢ ، ٤ -) ،
(ج) (٢ - ، ١ -) ، (د) (٠ ، ٠) .

الحل :

(أ) (٣ ، ٣ -) $\leftarrow$ (٢ × ٣ ، ٢ × ٣ -) = (٦ ، ٦ -) .

(ب) (٢ ، ٤ -) $\leftarrow$ (٢ × ٢ ، ٢ × ٤ -) = (٤ ، ٨ -) .

(ج) (٢ - ، ١ -) $\leftarrow$ (٢ × ٢ - ، ٢ × ١ -) = (٤ - ، ٢ -) .


(د) (٠ ، ٠) $\leftarrow$ (٢ × ٠ ، ٢ × ٠) = (٠ ، ٠) .

تلاحظ من المثال السابق الفقرة (د) أن صورة النقطة (٠ ، ٠) هي (٠ ، ٠) نفسها ذلك لأن النقطة (٠ ، ٠) هي مركز التكبير . وبصورة عامة ، لأي تكبير ت (م ، أ) يكون : ت : م $\leftarrow$ م أي أن صورة مركز التكبير هي النقطة نفسها .

ارسم صورة $\overline{س}$ بالتكبير :

١) ت (٢، م) . ب) ت (١، م) . ج) ت (٢، م) . د) ت (١، م) . حيث $\overline{س} \neq \overline{ص}$.

الحل :



شكل (٦ - ٣٥)

١) نحدد $\overline{س}$ صورة $\overline{س}$ بالتكبير
(٢، م) ، ثم $\overline{ص}$ صورة $\overline{ص}$
بالتكبير نفسه ، نرسم $\overline{س_١}$ ،
وهي صورة $\overline{س}$ بالتكبير (٢، م)
[انظر الشكل (٦ - ٣٥)] .

ب) نحدد $\overline{س}$ صورة $\overline{س}$ بالتكبير


(١، م)) باتباع ما يلي :

نرسم $\overline{م س}$ ثم نحدد عليه نقطة

$$\overline{س_١} \text{ بحيث يكون } \frac{1}{2} = \frac{|م س_١|}{|م س|}$$

(معامل التكبير) ، فتكون $\overline{س_١}$ صورة

$\overline{س}$ بالتكبير (١، م) ،



شكل (٦ - ٣٦)


- بنفس الطريقة نعين $\overline{ص_١}$ صورة $\overline{ص}$ بالتكبير (١، م) ،

- نرسم $\overline{س_١ ص_١}$ وهي صورة $\overline{س ص}$ بالتكبير (١، م) ،

لاحظ في الشكل (٦ - ٣٦) أن $|س_١ ص_١| < |س ص|$ ، وهي حالة تكبير ، أما في الشكل (٦ - ٣٦) فتلاحظ أن $|س_١ ص_١| > |س ص|$ ، وهي حالة تصغير ، وبصورة عامة يحدث التصغير عندما تكون $٠ < د < ١$ ، أي عندما يكون معامل التكبير أكبر من الصفر وأقل من الواحد .

خواص التكبير :

نشاط (٣)



شكل (٦ - ٣٧)

- على الشكل (٦ - ٣٧) : أ ب ج مثلث ، إحداثيات رؤوسه ، كما في الرسم ، - أنقل الشكل إلى ورقة رسم بياني .
- أرسم المثلث أ ب ج ، صورة المثلث أ ب ج بتكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله ٣ .

- ما إحداثيات النقاط أ ، ب ، ج .

- باستخدام قانون البعد بين نقطتين ، أوجد أطوال أضلاع Δ أ ب ج ، أ ب ج ، ثم قارن بينها ، ماذا تلاحظ ؟

$$٣ = \frac{|أ_١ ج_١|}{|أ ج|} = \frac{|ب_١ ج_١|}{|ب ج|} = \frac{|أ_١ ب_١|}{|أ ب|}$$

لا بد أنك لاحظت أن

- باستخدام المنقلة أوجد قياس زوايا Δ أ ب ج ، أ ب ج ، ثم قارن بين

المثلث Δ ب ج ، ماذا تلاحظ ؟
 في Δ ب ج . تلاحظ أن $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ ، لماذا ؟
 هل $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ ؟ لماذا ؟
 من النشاط السابق نستنتج أن :

- ١ - التكبير يكبر أبعاد الأضلاع أو يصغرها بنسبة معينة هي معامل التكبير
- ٢ - التكبير يحفظ قياس الزوايا .

مثال (٣)

إذا كانت S_1 هي صورة S بتكبير (M, D) ، فأوجد
 معامل التكبير (D) في كل من الحالات الآتية :

$$(1) \quad |MS| = 4 \text{ سم} , \quad |MS_1| = 12 \text{ سم}$$

$$(2) \quad |MS| = 8 \text{ سم} , \quad |MS_1| = 4 \text{ سم}$$

$$(3) \quad |SS_1| = 4 \text{ سم} , \quad |SS_1| = 24 \text{ سم}$$

الحل :

(١) حيث أن S_1 صورة S بالتكبير (M, D) ، فإن :

$$D = \frac{|MS|}{|MS_1|} \quad (\text{شروط التكبير}) ,$$

$$\therefore |MS| = 4 \text{ سم} , \quad |MS_1| = 12 \text{ سم}$$


$$\therefore D = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

(٣) من خواص التكبير نجد أن :

$$\mathcal{D} = \frac{|س١ ص١|}{|س ص|} \quad \therefore \mathcal{D} = \frac{٢٤}{٤} = ٦ .$$

مثال (٤)

في الشكل (٦-٣٨) : أ ب ج د شبه منحرف ، فيه



أ د // ب ج ، $|س٢| = |سم ٢|$ ،
 $|ب ج| = |سم ٤|$ ، فإذا كانت ب ج
 صورة أ د بتكبير (م ، د) ،

فأوجد معامل التكبير (د) ، وعيّن مركز التكبير (م) .
 شكل (٦-٣٨)

الحل :

∴ ب ج صورة أ د بالتكبير (م ، د)

$$\therefore \mathcal{D} = \frac{|ب ج|}{|س١|} = \frac{٤}{٢} = ٢$$

ومركز التكبير (م) هي نقطة تقاطع $\overleftrightarrow{ب أ}$ ، $\overleftrightarrow{ج د}$ ، لماذا ؟

تدريب

في الشكل (٦-٣٨) : ارسم $\overleftrightarrow{ب أ}$ ، $\overleftrightarrow{ج د}$ ، حدد نقطة تقاطعهما (م) ،

$$\text{ثم تحقق أن } \mathcal{D} = \frac{|م ب|}{|م أ|} = \frac{|م ج|}{|م د|} = ٢ \text{ سم} .$$

[١] عيّن صورة كلٍ من النقاط التالية : $(٣، ٣)$ ، $(٠، ٦-)$ ، $(٣، ١٢-)$

تحت تأثير كلٍ من : (١) ت (و ، ٤) (٢) ت (و ، $\frac{٢}{٣}$) .

[٢] التكبير ت (و ، ٥) مركزه نقطة الأصل و (٠ ، ٠) ومعامله ٥ ، إذا كان :

ت (و ، ٥) : $١ \leftarrow ١$ فأوجد معامل التكبير في كلٍ من الحالات الآتية :

$$(١) \quad ١ \leftarrow (٢، ٣) \quad ١ \leftarrow (٨، ١٢)$$

$$(٢) \quad ١ \leftarrow (٥، ٠) \quad ١ \leftarrow (١٠، ٠)$$

$$(٣) \quad ١ \leftarrow (٨، ٤) \quad ١ \leftarrow (٢، ١)$$


$$(٤) \quad ١ \leftarrow (٩، ٦) \quad ١ \leftarrow (٩، ٥، ١٣)$$

[٣] إنقل الشكل (٦ - ٣٩) إلى دفترك، ثم ارسم :

(١) صورة ١ بالتكبير (م ، ٣) .

(٢) صورة $ب$ بالتكبير نفسه .

(٣) صورة $\overline{١ ب}$ بالتكبير نفسه .



شكل (٦ - ٣٩)

[٤] ارسم صورة $\Delta ١ ب ج$ الذي رؤوسه $١ (٢، ١)$ ، $ب (٠، ١)$ ،

جـ $(٢-، ١-)$ بالتكبير (و ، ٢) ، حيث و هي نقطة الأصل (٠ ، ٠) .

[٥] بين أن $\Delta ١ ب ج$ ، $١ ب ج$ الموضحة بياناتهما في التمرين [٤]

متشابهة (تذكر أنه : يتشابه المثلثان إذا تناسبت أضلاعهما المتناظرة) .

[١] أوجد | س ص | في كلٍ مما يلي :

(أ) س (٣ ، ٥) ، ص (-٢ ، ٨)

(ب) س (٠ ، ٢) ، ص (-٥ ، ٣)

(جـ) س (-١ ، -٢) ، ص (-٤ ، ٥)

[٢] أوجد إحداثيات نقطة منتصف س ص في كلٍ مما يلي :

(أ) س (١ ، ٣) ، ص (-٣ ، ١)

(ب) س (٥ ، ٣ ، ٢) ، ص (-٥ ، ١ ، ٠)

(جـ) س (-١ ، ٥ ، ٠) ، ص (٤ ، ٠ ، ٧ ، ١)

[٣] حدد نوع التحويل الهندسي الذي يجعل ع_١ صورة ع ، كما في مثال

الفقرة (١) في كلٍ مما يلي :

(أ) ع (س ، ص) ← ع_١ (٢ س ، ٢ ص) تكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله ٢ ،

(ب) ع (س ، ص) ← ع_١ (س ، -ص)

(جـ) ع (س ، ص) ← ع_١ (-ص ، س)

(د) ع (س ، ص) ← ع_١ (س - ١ ، ص)


(هـ) ع (س ، ص) ← ع_١ ($\frac{1}{4}$ س ، $\frac{1}{4}$ ص)

(و) ع (س ، ص) ← ع_١ (س ، ص + ٣)

[٤] عين صورة كل نقطة من النقاط : س (٠ ، -٣) ، ص ($\frac{1}{4}$ ، ٢) ، ($\frac{1}{4}$ ، ١) ،


ع ($\frac{3}{4}$ ، -٢) تحت تأثير كلٍ من :

- (١) انحراف α في المحور السيني :
 (ب) انسحاب في الاتجاه الموجب للمحور الصادي بمقدار ٣ وحدات .
 (جـ) دوران مركزه نقطة الأصل و (٠ ، ٠) ، وزاويته (- ٩٠) .
 (د) تكبير مركزه نقطة الأصل ومعامله ٣ .



- [٥] استعن بالشكل (٦ - ٤٠) واكمل
 الآتي ، علماً بأن : ١ ب جـ د مربع ،
 ١ صورة المثلث م ١ ص بالانعكاس
 في $\vec{ك}$ هي
 (ب) صورة المثلث م ص ب بانسحاب
 مسافته |ب م| وفي اتجاه $\vec{ب د}$ هي ...
 (جـ) صورة المثلث م ع ب بالدوران
 (م ، ٩٠) هي

- (د) صورة المثلث ١ ص م بالتكبير (١ ، ٢) هي
 (هـ) المستقيم يمثل محور تناظر للمستطيل ١ ص د د .
 (و) الشكلان ١ ص د د ، ب ص د جـ متناظران حول المحور
 [٦] انقل الشكل (٦ - ٤١) إلى دفترك ثم



- ارسم صورة $\vec{ب د}$ تحت تأثير :
 ١ انعكاس في المحور ل .
 (ب) انسحاب مسافته |ب م| وباتجاه $\vec{ل}$.
 (جـ) د (م ، ٤٥) د (س ، ٢) .

[٧] في مستوى إحداثي ، ارسم Δ ب ج الذي إحداثيات رؤوسه هي

أ (١ ، ٣) ، ب (٥ ، ٦) ، ج (٤ ، -١) ، ثم أجب عما يلي :

أ) بين ان Δ ب ج قائم الزاوية .

ب) أوجد إحداثيات نقطتي المنتصف للضلعين أ ب ، أ ج ، سمّهما و ، هـ ، على الترتيب .

ج) ما التحويل الهندسي الذي يجعل Δ ب ج صورة للمثلث أ و هـ ؟

[٨] على مستوى إحداثي ، ارسم مربعاً طول ضلعه ٢ سم ، ثم :

أ) كبر أضلاعه إلى ثلاثة أمثالها ، كم تصبح مساحته ؟

ب) صغر أضلاعه إلى النصف ، كم تصبح مساحته ؟


(اعتبر مركز التكبير هي نقطة الأصل في كل حالة) .

[١] إذا كانت : $(١, ١)$ و $(٣, ٢)$ هـ فأوجد :

١) $|هـ|$ (ب) إحداثيات نقطة منتصف $هـ$.

[٢] ارسم صورة $أب$ بالانعكاس في $ل$ ،

[انظر الشكل (٦-٤٢)]




شكل (٦-٤٢)

[٣] اذكر خواص الانعكاس في محور .

[٤] في الشكل (٦-٤٣) حدد أي

من المستقيمان $أج$ ، $سم$ يعتبر محور

تناظر للمستطيل $أب ج د$.



شكل (٦-٤٣)

[٥] في $\Delta أب ج$: $|أب| = |أج|$ ،

١) ارسم صورة $\Delta أب ج$ بانسحاب مسافته وحدتين وفي اتجاه $ب ج$ ،

سم المثلث الناتج $أ, ب, ج$.

ب) هل $|أ, ب| = |أ, ج|$ ؟ لماذا ؟

[٦] ارسم صورة المثلث الذي رؤسسه س (١، ٣)، ص (١، ١-)، ع (١، ١) (٦، ١)

تحت تأثير :

(١) و (و، ٩٠°) .

(ب) ت (و، ٢)

(اعتبر و هي نقطة الاصل في الحالتين) .

[٧] أكمل ما يلي : (١) الدوران يحفظ الأطوال ، ... ،

(ب) التكبير يحفظ قياس الزوايا ، ويكبر ... ، ويحفظ

مقدمة :

تعرفت في الصفوف السابقة على بعض الأساليب الخاصة بعرض البيانات الاحصائية كالجداول والأشكال البيانية ، وهي أساليب مهمة إلا أنها غير كافية أحياناً . لذلك لابد لنا من أساليب أخرى تفيد في عرض وتلخيص البيانات الاحصائية وإجراء المقارنات ، من أبرز هذه الأساليب استخدام مقاييس إحصائية لوصف وتحليل البيانات وأول أنواعها ما يسمى بمقاييس النزعة المركزية . وفي هذه الوحدة سنتعرف على المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال ، وهي كثيرة الاستعمال لوصف البيانات الإحصائية في التطبيقات الحياتية المختلفة .

٧ : ١ المتوسط الحسابي

سبق وان تعرفت على كيفية حساب المتوسط الحسابي باستخدام العلاقة التالية :

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع البيانات}}{\text{عددها}}$$

وكذلك على استخدامه للمقارنة ، فمثلاً : إذا كان متوسط دخل أسرة هو (١٠٠٠٠) ريال في الشهر ومتوسط دخل أسرة أخرى هو (١٢٠٠٠) ريال في الشهر فنقول أن دخل الأسرة الثانية أعلى من دخل الأولى . وفي الصف الثامن تعرفت على كيفية حساب المتوسط الحسابي من جداول تكرار بسيطة . وفي هذا الدرس سنتعمق في حساب المتوسط باستخدام جداول تكرار بسيطة بفئات وبدون فئات فمثلاً :

إذا كان لدينا الملاحظات التالية : $s_1, s_2, \dots, s_d$ فإن المتوسط

الحسابي يُعطى بالعلاقة التالية :

$$\bar{s} = \frac{s_1 + s_2 + \dots + s_d}{d}$$

حيث s_1 تعني الملاحظة الأولى ، s_2 الملاحظة الثانية... الخ ، (...)
النقاط الثلاث تعني أن هناك ملاحظات أخرى ، أمّا s_d فتعني الملاحظة
الأخيرة التي رتبها d ، وبالتالي فإن عدد الملاحظات هو d .

ولتسهيل التعبير عن المجموع السابق، يُستخدم الرمز مجـ (ويُقرأ مجموع)
للدلالة على المجموع ، أي عندما يكون لدينا (d) من الملاحظات ، فإن :

$$\bar{s} = \frac{\text{مج}_d s_r}{d}$$

مثال (١) عبر عن المتوسط الحسابي بالرموز إذا كان لدينا البيانات التالية :

$s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7, s_8$.

الحل :

$$\bar{s} = \frac{s_1 + s_2 + \dots + s_8}{8} = \frac{\text{مج}_8 s_r}{8}$$

مثال (٢)

لدينا البيانات التالية : ٢ ، ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٥ ، ٩ ، ١٠ ، ١ ، ١٤ .

أولاً : عبر متوسطها الحسابي بالرموز . ثانياً : اوجد متوسطها الحسابي .

$$\frac{س_٩ + \dots + س_٢ + س_١}{٩} = \frac{\text{مركز } س_١}{٩} = \bar{س} : \text{أولاً}$$

$$\frac{١٤ + ١ + ١٠ + ٩ + ٥ + ٣ + ٤ + ٦ + ٢}{٩} = \bar{س} : \text{ثانياً}$$

$$\therefore \bar{س} = \frac{٥٤}{٩} = ٦ .$$

حساب المتوسط الحسابي لتوزيع تكراري بسيط

سبق وأن تعرفت على أن التوزيعات التكرارية البسيطة نوعان ، هما :

– توزيعات تكرارية بسيطة بدون فئات .

– توزيعات تكرارية بسيطة كفئات .

تذكر أن :

الفئة هي مجموعة من المشاهدات (الملاحظات) أو البيانات تبدأ بملاحظة تسمى الحد الأدنى للفئة وتنتهي بملاحظة تسمى الحد الأعلى للفئة .

طول الفئة = الحد الأعلى الحقيقي – الحد الأدنى الحقيقي .
أو هو الفرق بين الحد الأدنى لفئة والحد الأدنى للفئة التي تليها .

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الأدنى} + \text{الحد الأعلى}}{٢} .$$

وحجم العينة هو مجموع التكرارات . الأمثلة التالية توضح كيفية حساب المتوسط الحسابي من خلال التوزيع التكراري البسيط .

أولاً : حساب المتوسط الحسابي لتوزيع تكراري بدون فئات :

في مادة الرياضيات [الدرجة العظمى (٢٠) درجة] :

الدرجة س	التكرار ك	الدرجة × التكرار س × ك
١١	٢	٢٢
١٢	٣	٣٦
١٣	٥	٦٥
١٤	٢	٢٨
١٥	٣	٤٥
١٦	٢	٣٢
١٧	٢	٣٤
١٨	١	١٨
المجموع	٢٠ طالباً	٢٨٠ درجة

حيث ك تعني تكرار الدرجة س. احسب المتوسط الحسابي للبيانات العددية السابقة .

الحل :

مجموع (حواصل ضرب الدرجة × تكرارها)

المتوسط الحسابي = $\frac{\text{مجموع التكرارات}}{\text{مجموع التكرارات}}$

$$\frac{\sum_{i=1}^n s_i k_i}{\sum_{i=1}^n k_i} =$$

وباستخدام المعلومات من الجدول السابق نحصل على :

$$\bar{s} = \frac{280}{20} = 14 \text{ درجة .}$$

إذا كان لدينا الملاحظات : $s_1, s_2, \dots, s_j$
لدينا التكرارات المناظرة : $k_1, k_2, \dots, k_j$
فإن المتوسط الحسابي يُعطى من العلاقة :

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع (حواصل ضرب الملاحظة} \times \text{تكرارها المناظر)}$$

$$\text{مجموع التكرارات}$$

ورمزياً :

$$\bar{s} = \frac{s_1 k_1 + s_2 k_2 + \dots + s_j k_j}{k_1 + k_2 + \dots + k_j} = \frac{\sum s_j k_j}{\sum k_j}$$

ثانياً : حساب المتوسط الحسابي لتوزيع تكراري كفئات :

اعتمد على جدول التكرار التالي ذي الفئات لإيجاد المتوسط

مثال (٤)

الحسابي $\bar{s}$:

الفئة	مركز الفئة s_r	التكرار k_r	مركز الفئة $\times$ التكرار $s_r \times k_r$
٣٠ - ٣٤	٣٢	٣	٩٦
٣٥ - ٣٩	٣٧	٦	٢٢٢
٤٠ - ٤٤	٤٢	١٠	٤٢٠
٤٥ - ٤٩	٤٧	٤	١٨٨
٥٠ - ٥٤	٥٢	٥	٢٦٠
٥٥ - ٥٩	٥٧	٢	١١٤
المجموع		٣٠	١٣٠٠

من الجدول نجد أن عدد القيم س هو (٦) قيم ،

أي أن $٦ = ٥$.

$$\therefore \text{مجموع } \frac{٦}{١} \text{ س مركر} = \text{س } \frac{١}{١} \text{ ك} + \text{س } \frac{٢}{٢} \text{ ك} + \text{س } \frac{٣}{٣} \text{ ك} + \text{س } \frac{٤}{٤} \text{ ك} + \text{س } \frac{٥}{٥} \text{ ك} + \text{س } \frac{٦}{٦} \text{ ك}$$

$$= ٢ \times ٥٧ + ٥ \times ٥٢ + ٤ \times ٤٧ + ١٠ \times ٤٢ + ٦ \times ٣٧ + ٣ \times ٣٢ =$$

$$= ١٣٠٠ = ١١٤ + ٢٦٠ + ١٨٨ + ٤٢٠ + ٢٢٢ + ٩٦ =$$

$$\text{مجموع التكرارات} = \text{مجموع } \frac{٦}{١} \text{ ك} = \text{ك } \frac{١}{١} + \text{ك } \frac{٢}{٢} + \text{ك } \frac{٣}{٣} + \text{ك } \frac{٤}{٤} + \text{ك } \frac{٥}{٥} + \text{ك } \frac{٦}{٦}$$

$$= ٣٠ = ٢ + ٥ + ٤ + ١٠ + ٦ + ٣ =$$

$$\therefore \text{س} = \frac{\text{مجموع } \frac{٦}{١} \text{ س مركر}}{\text{مجموع } \frac{٦}{١} \text{ ك}} = \frac{١٣٠٠}{٣٠} = ٤٣,٣ \text{ (تقريباً) .}$$

$\therefore$ حجم العينة في المثال السابق = ٣٠ .

مثال (٥)

فيمايلي عدد القطع التي انتجها (٢٠) عاملاً في أحد المصانع .

٣٣	٣٢	٣٧	٤٠	٣٥
٣٧	٢٠	٣٥	٣٣	٣٧
٣٧	٢٧	٣٥	٣٢	٤٠
٣٩	٢٥	٤٠	٣٧	٣٩

(ب) كوّن جدولاً تكرارياً كفاءات بحيث يكون طول الفئة (٦) ثم أوجد المتوسط الحسابي .

(ج) قارن بين المتوسطين في ١ ، ب .

الحل :

المجموع	٤٠	٣٩	٣٧	٣٥	٣٣	٣٢	٢٧	٢٥	٢٠	الدرجات
٢٠	٣	٢	٥	٣	٢	٢	١	١	١	التكرار
٦٩٠	١٢٠	٧٨	١٨٥	١٠٥	٦٦	٦٤	٢٧	٢٥	٢٠	القطعة X التكرار

$$\frac{\text{مجموع (حواصل ضرب القطعة X تكرارها)}}{\text{مجموع التكرارات}} = \text{المتوسط الحسابي}$$

$$= \frac{٦٩٠}{٢٠} = ٣٤,٥ \text{ قطعة}$$

المجموع	٤٣-٣٨	٣٧-٣٢	٣١-٢٦	٢٥-٢٠	الفئات
	٤٠,٥	٣٤,٥	٢٨,٥	٢٢,٥	مركز الفئة
٢٠	٥	١٢	١	٢	التكرار
٦٩٠	٢٠٢,٥	٤١٤	٢٨,٥	٤٥	مركز الفئة X التكرار

$$\frac{\text{مجموع (حاصل ضرب مركز الفئة X تكرارها)}}{\text{مجموع التكرارات}} = \therefore \text{المتوسط الحسابي}$$

$$= \frac{٦٩٠}{٢٠} = ٣٤,٥ .$$

(ج) تلاحظ أن المتوسطين متساويان .

[١] اعتمد جدول التكرار التالي :

الملاحظة	٥	٤	٣	١	المجموع
التكرار	١	٤	٢	٣	١٠
الملاحظة × التكرار	٥	١٦	٦	٣	٣٠

- ١) ما الملاحظة التي لها تكرار أكثر ؟ (ب) أحسب المتوسط الحسابي .
- [٢] الجدول التكراري التالي يبين علامات احد الصفوف في مادة الإحصاء (الدرجة العظمى ٢٠ درجة) .

الدرجة	٧	٩	١٠	١٢	١٤	١٥	١٧	١٨	المجموع
التكرار	٢	١	٢	٣	٢	٣	٤	٣	٢٠
الدرجة × التكرار									

- ١) أكمل الجدول اعلاه . (ب) ما الدرجة التي لها تكرار أكثر؟
- (جـ) احسب المتوسط الحسابي .

[٣] يمثل الجدول التكراري التالي بيانات موزعة في جدول كفاءات :

الفئات	١٠ - ١٤	١٥ - ١٩	٢٠ - ٢٤	٢٥ - ٢٩	المجموع
مركز الفئة	١٢	١٧	٢٢	٢٧	—
التكرار	٣	٧	١٢	٦	٢٨ طالباً
مركز الفئة × التكرار	٣٦	١١٩	٢٦٤	١٦٢	٥٨١

- ١) ما عدد الفئات . (ب) ما حجم العينة ؟

- (جـ) أحسب المتوسط الحسابي .

المدارس :

الفئات	٢٠- ٢٨	٢٩- ٣٧	٣٨- ٤٦	٤٧- ٥٥	٥٦- ٦٤	المجموع
مركز الفئة	٢٤	٣٣	٤٢	٥١	٦٠	-
التكرار	٥	٧	١٥	١٠	١٣	٥٠
مركز الفئة × التكرار						

١) أكمل الجدول أعلاه . (ب) ما حجم العينة ؟

(ج) إحصاء المتوسط الحسابي .

[٥] أكمل الجدول التكراري التالي ، ثم أوجد المتوسط الحسابي .

الفئات	١٠- ١٨	١٩- ٢٧	٢٨- ٣٦	٣٧- ٤٥	المجموع
مركز الفئة					
التكرار	٥	٨	١٠	٧	٣٠
مركز الفئة × التكرار					

[٦] البيانات التالية تمثل درجات الحرارة العظمى المسجلة خلال ٣٠ يوماً في

مدينة صنعاء :

٢٧	٢٥	٢٢	٢٢	٢٤
٢٦	٢٢	٢٧	٢٥	٢٣
٢٤	٢٦	٢٥	٢٤	٢٢
٢٢	٢٣	٢٧	٢٢	٣٠
٢٤	٣٠	٢٤	٢٥	٢٣
٢٣	٢٦	٢٤	٢٩	٢٧

ب) كَوْنُ جدولاً تكرريراً كفتات بحيث يكون طول الفئة (٥) ثم أوجد المتوسط الحسابي .
 جـ) قارن بين المتوسطين في ١ ، ب .

٧ : ٢ المنوال

يعتبر المنوال من اكثر مقاييس النزعة المركزية لسهولة في حسابه ، حيث يُعرّف كالتالي :

المنوال هو القيمة الأكثر تكراراً في البيانات الإحصائية .

حساب المنوال لتوزيع تكراري بدون فئات :

مثال (١) إذا كان لديك البيانات الآتية :

٨ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ .

فتلاحظ أن (١٥) تكررت (٥) مرات وهي أكثر البيانات تكراراً ، وعلى هذا الأساس فإن المنوال هو (١٥) .

مثال (٢)

اعتبر البيانات التالية : ٧ ، ٩ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٢ ، ٤٨ ، والتي تلاحظ أن تكرارات هذه البيانات متساوية ، أي أن كل منها تكررت مرة واحدة ، وفي هذه الحالة ليس لها منوال أي عديمة المنوال .

٣٥ ، ٣١ ، ٢٦ ، ٢٦ ، ٢٦ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٢١ ، ١٨ ، ١٨

تجد (٣) تكرارات للدرجة (٢٣) ومثلها للدرجة (٢٦) وهنا يمكن اعتبار كل منهما منوالاً أي إذا تساوت قيمتان من حيث تكرارهما يكون للقيم منوالين .

حساب المنوال لتوزيع تكراري كفئات :

في التوزيعات التكرارية ذات الفئات نستخدم التعريف التالي :

المنوال هو مركز الفئة ذات التكرار الأكبر .

مثال (٤) أوجد المنوال من جدول التوزيع التكراري التالي :

الفئات	١٨ - ١٠	٢٧ - ١٩	٣٦ - ٢٨	٤٥ - ٣٧
التكرار	٥	٨	١٠	٧

الحل :

نجد أن الفئة (٣٦ - ٢٨) لها أكبر تكرار (١٠) ، وبالتالي فإن المنوال هو

$$\text{مركز هذه الفئة ، أي أن المنوال} = \frac{٣٦ + ٢٨}{٢} = \frac{٦٤}{٢} = ٣٢ .$$

مثال (٥) أوجد المنوال للتوزيعات التكرارية التالية :

الفئات	٥ - ٠	١١ - ٦	١٧ - ١٢	٢٣ - ١٨	٢٩ - ٢٤	٣٥ - ٣٠
التكرار	٤	٥	٨	٧	٨	٣

بما أن الفئتين (١٢-١٧)، (٢٤-٢٩) لهما التكرار نفسه .

∴ التوزيعات التكرارية لها منوالان ، هما :

$$\text{المنوال الأول} = \frac{١٧ + ١٢}{٢} = \frac{٢٩}{٢} = ١٤,٥$$

$$\text{المنوال الثاني} = \frac{٢٩ + ٢٤}{٢} = \frac{٥٣}{٢} = ٢٦,٥$$

تمارين ومسائل

[١] أوجد المنوال لكل من المجموعات التالية :

(أ) ٨ ، ٨ ، ٨ ، ٨ ، ٣ ، ٣ ، ٣ ، ٤ ، ٤ ، ٤

(ب) ٥ ، ٤ ، ٢ ، ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٣

(ج) ٥ ، ٤ ، ٤ ، ٤ ، ٤ ، ٦ ، ٩ ، ٩ ، ٩ ، ٩

[٢] أوجد المنوال للتوزيعات التكرارية الآتية :

(ج)

(ب)

(أ)

التكرار	الفئات
٦	١٤ - ١٠
٦	١٩ - ١٥
٦	٢٤ - ٢٠
٦	٢٩ - ٢٥
٦	٣٤ - ٣٠

التكرار	الفئات
٣	١٤ - ١٠
٩	١٩ - ١٥
٦	٢٤ - ٢٠
٩	٢٩ - ٢٥
٢	٣٤ - ٣٠

التكرار	الفئات
٤	١٤ - ١٠
٧	١٩ - ١٥
٨	٢٤ - ٢٠
٥	٢٩ - ٢٥
٣	٣٤ - ٣٠

الفئات	١٠ - ١٩	٢٠ - ٢٩	٣٠ - ٣٩	٤٠ - ٤٩	٥٠ - ٥٩
مركز الفئة	١٤,٥	٢٤,٥	٣٤,٥	٤٤,٥	٥٤,٥
التكرار	٣	٥	٨	١	٣

[٤] أوجد المنوال والمتوسط الحسابي لجدول التوزيعات التكرارية التالية :

الفئات	١٠ - ١٨	١٩ - ٢٧	٢٨ - ٣٦	٣٧ - ٤٥	٤٦ - ٥٤
التكرار	١	٥	٣	٨	٣

[٥] الجدول التالي يوضح غياب طلاب الصف التاسع في إحدى المدارس خلال

العام الدراسي :

عدد أيام الغياب	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
التكرار	٧	١٥	٢٢	٢٤	١٧	١٠	٦	٣

١ (أوجد المتوسط الحسابي لعدد أيام الغياب .

ب (أوجد المنوال لعدد أيام الغياب .

٧ : ٣ التكرار المتجمع

سبق أن تعلمت في الصفين السابع والثامن كيفية تكوين جداول إحصائية بيانية وكذلك جداول تكرارية بسيطة بدون فئات وبفئات . كما تعرفت على بعض أساليب التمثيل البياني .

وهنا سوف نتعرف على كيفية تكوين جداول للتكرار المتجمع ، أي التكرار التراكمي ، وهو نوعان تصاعدي وتنازلي ، كما ستتعرف على كيفية رسم منحني كل منهما .

يبين الجدول التكراري التالي توزيع درجات اختبار شهري في الرياضيات لطلاب الصف التاسع . (درجته العظمى ٣٠ درجة) .

الدرجات	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	المجموع
التكرار	١	١	٢	٨	٩	١٥	١٢	١٠	٤	٦٢

كوّن جدول التكرار المتجمع التصاعدي والتنازلي .

الحل :

أولاً : لتكوين الجدول التكراري المتجمع التصاعدي نفتح سطرًا ثالثًا في الجدول السابق وذلك للتكرار المتجمع التصاعدي كما يلي :

أول تكرار = ١ ، ثاني تكرار = ١ + ١ = ٢ ، ثالث تكرار = ٢ + ٢ = ٤ ، رابع تكرار = ٤ + ٨ = ١٢ ، ... وهكذا ، فكل تكرار متجمع هو مجموع ذلك التكرار مع كل التكرارات السابقة ، فيكون جدول التكرار المتجمع الصاعد هو :

الدرجات	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	المجموع
التكرار	١	١	٢	٨	٩	١٥	١٢	١٠	٤	٦٢
التكرار المتجمع الصاعد	١	٢	٤	١٢	٢١	٣٦	٤٨	٥٨	٦٢	

ملحوظة : التكرار المتجمع الصاعد لدرجة ما هو عدد الطلاب الحاصلين على تلك الدرجة أو على درجة أصغر منها .

ثانياً : لتكوين جدول التكرار المتجمع التنازلي ، نفتح سطرًا ثالثًا للتكرار المتجمع التنازلي .


تعلم أن مجموع التكرارات في الجدول السابق هو ٦٢ ، هذه القيمة هي أول تكرار .

تكرار = $61 - 1 = 60$ ، رابع تكرار = $60 - 2 = 58$ ، ... وهكذا ، فكل تكرار متجمع هو مجموع التكرارات كلها ناقصاً مجموع التكرارات السابقة .
فيصبح جدول التكرار المتجمع النازل كالتالي :

الدرجات	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	المجموع
التكرار	١	١	٢	٨	٩	١٥	١٢	١٠	٤	٦٢
التكرار المتجمع النازل	٦٢	٦١	٦٠	٥٨	٥٠	٤١	٢٦	١٤	٤	


ملحوظة : التكرار المتجمع النازل لدرجة ما هو عدد الطلاب الحاصلين على هذه الدرجة أو على درجة أكبر منها .

التمثيل البياني لجدولي التكرار المتجمع التصاعدي والتنازلي :



لرسم منحنى التكرار المتجمع التصاعدي نستخدم جدول التكرار المتجمع التصاعدي .
انظر الشكل (٧ - ١)

الدرجة



* يمكن تمثيل كل جدول تكراري (تصاعدي أو تنازلي) بيانياً منفرداً أو في رسم بياني واحد .

* كما أنه يمكن عمل جدول واحد يحتوي التكرارين المتجمعين التصاعدي والتنازلي .

تمارين ومسابائل

[١] الجدول التكراري التالي يوضح درجات (٣٠) طالباً في اختبار شهري في مادة الرياضيات (الدرجة العظمى ٣٠ درجة) .

الدرجة	٨	١١	١٤	١٧	٢٠	٢٣	المجموع
التكرار	٣	٦	١٠	٤	٥	٢	٣٠
التكرار المتجمع الصاعد	٣			٢٣			
التكرار المتجمع النازل	٣٠					٢	

(١) أكمل الجدول السابق :

- (ب) ارسم منحني كل من التكرارين المتجمعين التصاعدي والتنازلي .
- [٢] جدول التوزيع التكراري التالي يمثل درجات الصف التاسع في مادة العلوم في احد الاختبارات الشهرية : الدرجة العظمى (٥٠ درجة) .

الفئات	مركز الفئة	التكرار	التكرار المتجمع الصاعد	التكرار المتجمع النازل
١٠ - ١٤		٤		
١٥ - ١٩	١٧	٩		
٢٠ - ٢٤		١٥		
٢٥ - ٢٩		١٢		٤٢
٣٠ - ٣٤		٢٠	٦٠	
٣٥ - ٣٩		٧		
٤٠ - ٤٤	٤٢	٣		
المجموع		٧٠		

(١) أكمل الجدول أعلاه .

- (ب) ارسم منحني التكرار المتجمع التصاعدي ومنحني التكرار المتجمع التنازلي على الشكل نفسه .

(جـ) ما النقطة التي يتقاطع عندها المنحنيان التصاعدي والتنازلي ؟

(د) أوجد المتوسط الحسابي .

- [٣] الجدول التالي يوضح توزيعات التكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع النازل :

الفئات	مركز الفئة	التكرار	التكرار المتجمع الصاعد	التكرار المتجمع النازل
٠ - ٤	٢	١	١	
٥ - ٩		٣		٤٩
١٠ - ١٤		٩		
١٥ - ١٩		٨		
٢٠ - ٢٤	٢٢	١٠		
٢٥ - ٢٩		١٢		
٣٠ - ٣٤		٤		
٣٥ - ٣٩	٣٧	٣	٥٠	
المجموع		٥٠		

١) أكمل الجدول أعلاه .

ب) ارسم منحني التكرار المتجمع التصاعدي ومنحني التكرار المتجمع التنازلي على الشكل نفسه .

ج) ارسم عموداً من نقطة التقاطع على المحور الأفقي ، ما إحداثيات هذه النقطة ؟

د) أوجد المنوال . هـ) إحسب المتوسط الحسابي .

[٤] بلغت أعمار (٣٠) عضواً ينتمون لنادٍ رياضي كما يلي :

١١	١٢	١٣	٢٠	٢١	١١	١٥	١٦	٣٠	٣٦
٢٢	٢٠	١٨	١٩	١٧	١٢	٢٠	٢٣	٢٧	٢٩
٢١	٢٥	٢٤	٢٣	٣١	٣٢	٣٥	٣٦	٣١	٣٠

٣٠				١٠ - ١٤
	١٠			
		٣	٢٧	
		٣		٣٥ - ٣٩
		٣٠	المجموع	

(١) أكمل الجدول (علماً بأن طول الفئة = ٥)

(ب) ارسم التكرار المتجمع التصاعدي والتكرار المتجمع التنازلي .

(جـ) أوجد المنوال . (د) أوجد المتوسط الحسابي .

٧ : ٤ الوسيط

البيانات التالية تمثل أوزان سبعة اطفال بالكيلوجرام ١٨ ، ٢١ ، ١٢ ، ١٩ ، ٢٥ ، ١٥ ، ١٦ وعند ترتيب هذه الأوزان تصاعدياً تكون : ١٢ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٥ ، رتب هذه الأوزان تنازلياً .

تلاحظ أن القيمة ١٨ تتوسط هذه القيم بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً لذا نسمى مثل هذه القيمة الوسيط ويُعرف كالتالي :

الوسيط لمجموعة من القيم هو القيمة التي تتوسط هذه القيم بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً .

التي تقع في الوسط تماماً إذا كان عدد القيم (ن) عدداً فردياً أما إذا كان عدد القيم (ن) عدداً زوجياً فإننا نأخذ متوسط القيمتين الوسطيتين لهذه القيم .

أوجد الوسيط للقيم الآتية :

مثال (١)

١ (٧٨ ، ٨٨ ، ٥٥ ، ٦٢ ، ٧٠ ، ٨٢ ، ٨٠ ،

ب (٣٢ ، ٢٨ ، ٢٥ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٠ ، ٣٨ ، ٢٢

الحل :

١ (ترتب القيم تصاعدياً كما يلي :

٥٥ ، ٦٢ ، ٧٠ ، ٧٨ ، ٨٠ ، ٨٢ ، ٨٨ لاحظ أن القيمة ٧٨

تتوسط القيم ، وذلك لأن عددها فردياً .

∴ الوسيط لهذه القيم = ٧٨

ب (نرتب القيم تصاعدياً كما يلي :

٢٢ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٨ نلاحظ أن القيمتين

٣٠ ، ٣٢ تتوسطان القيم ، وذلك لأن عددها زوجياً .

∴ الوسيط = $\frac{30 + 32}{2} = \frac{62}{2} = 31$.

حساب الوسيط في التوزيعات التكرارية :

عندما يكون لدينا توزيعات تكرارية ، فإنه لا يمكننا إيجاد الوسيط مباشرة

لذلك علينا ان نتبع الخطوات التالية :

١ (نكون جدولاً تكرارياً متجمعاً صاعداً أو نازلاً .

١) نعين ترتيب الوسيط وهو $\frac{n}{2} - \frac{1}{2}$ سواء كانت (ن) فردية أو زوجية

٣) نحدد الفئة الوسيطة التي تحتوي على ترتيب الوسيط .

٤) يتم حساب الوسيط للتكرار المتجمع الصاعد من العلاقة الآتية :

$$\text{الوسيط} = 1 + \frac{\frac{n}{2} - K_1}{K_2} \times L$$

حيث : ١ = الحد الأدنى الحقيقي للفئة الوسيطة

ن = التكرار الكلي

K_1 = التكرار المتجمع التصاعدي للفئة السابقة للفئة الوسيطة

K_2 = تكرار الفئة الوسيطة .

ل = طول الفئة الوسيطة .

٥) يتم حساب الوسيط للتكرار المتجمع النازل من العلاقة الآتية :

$$\text{الوسيط} = B - \frac{\frac{n}{2} - K_3}{K_4} \times L$$

حيث : ب = الحد الأعلى الحقيقي للفئة الوسيطة

ن = التكرار الكلي

K_3 = التكرار المتجمع التنازلي للفئة اللاحقة للفئة الوسيطة

K_4 = تكرار الفئة الوسيطة .

ل = طول الفئة الوسيطة .

المتجمع التصاعدي (٦٠) وهذا يناظر الملاحظة (٢) وحيث ان ترتيب الوسيط يساوى ترتيب الفئة الوسيطة .

(٣) الفئة الوسيطة هي (١,٥ - ٢,٥) حدها الأدنى الحقيقي ١,٥ وحدها الأعلى الحقيقي ٢,٥ وهي تناظر التكرار (٢٥) .
طول الفئة = ٢,٥ - ١,٥ = ١

(٤) نحسب الوسيط للتكرار المتجمع الصاعد من العلاقة :

$$\text{الوسيط} = ١ + \frac{\frac{ن}{٢} - ك_١}{ك_٢} \times ل$$

$$\text{الوسيط} = ١,٥ + \frac{٣٥ - \frac{١٠٠}{٢}}{٢٥} \times ١$$

$$= ١,٥ + \frac{١٥}{٢٥} \times ١$$

$$= ١,٥ + \frac{٣}{٥} = ١,٥ + ٠,٦ = ٢,١$$

(٥) نحسب الوسيط للتكرار المتجمع التنازلي من العلاقة :

$$\text{الوسيط} = ب - \frac{\frac{ن}{٢} - ك_٣}{ك_٢} \times ل$$

$$= ٢,٥ - \frac{٤٠ - \frac{١٠٠}{٢}}{٢٥} \times ١$$

$$= ٢,٥ - ٠,٤ = ٢,١$$

الوسيط لل تكرار المتجمع الصاعد هو نفسه لل تكرار المتجمع النازل وبالتالي
يمكن حسابه بواحدة فقط من هاتين الطريقتين .

مثال (٣)

من جدول التكرار الآتي أوجد الوسيط باستخدام التكرار المتجمع الصاعد :

الفئات	التكرار
٣ - ٧	٢
٨ - ١٢	٣
١٣ - ١٧	١٠
١٨ - ٢٢	٥
٢٣ - ٢٧	٤
المجموع	٢٤

الحل :

(١) نكون جدول التكرار المتجمع الصاعد كما يلي :

الفئات	التكرار	التكرار المتجمع الصاعد
٣ - ٧	٢	٢
٨ - ١٢	٣	٥ ك ^١
١٣ - ١٧	١٠ ك ^٢	١٥
١٨ - ٢٢	٥	٢٠
٢٣ - ٢٧	٤	٢٤
المجموع	٢٤	

المتجمع التصاعدي (١٥) وهذا يناظر الفئة (١٣ - ١٧) .

(٣) الفئة الوسطية هي (١٢,٥ - ١٧,٥) حدها الأدنى ١٢,٥ وحدها

الأعلى ١٧,٥ ، طول الفئة = ١٧,٥ - ١٢,٥ = ٥

(٤) نحسب الوسيط للتكرار المتجمع الصاعد من العلاقة :

$$\text{الوسيط} = ١ + \frac{\frac{ن}{٢} - ١}{\text{ك}} \times \text{ل}$$

$$\text{الوسيط} = ١٢,٥ + \frac{٥ - \frac{٢٤}{٢}}{١٠} \times ٥$$

$$١٦ = ٣,٥ + ١٢,٥ = \frac{٣٥}{١٠} + ١٢,٥ = ٥ \times \frac{٧}{١٠} + ١٢,٥ =$$

تدريب في المثال (٣) احسب الوسيط باستخدام التكرار المتجمع النازل

تأكد من أن قيمة الوسيط مطابقة للقيمة التي حصلت عليها بالنسبة للتكرار المتجمع الصاعد .

حساب الوسيط بيانياً :

يمكننا إيجاد الوسيط من خلال الرسم البياني وذلك باتباع الخطوات التالية :


– نرسم منحني التكرار المتجمع التصاعدي مع منحني التكرار المتجمع التنازلي

ومن نقطة تقاطع هذين المنحنيين انزل عموداً على المحور الأفقي .

– نقطة تقاطع العمود مع المحور الأفقي هي الوسيط .

الملاحظة	التكرار	التكرار المتجمع الصاعد	التكرار المتجمع النازل
٨	٣	٣	٣٠
١١	٦	٩	٢٧
١٤	١٠	١٩	٢١
١٧	٤	٢٣	١١
٢٠	٥	٢٨	٧
٢٣	٢	٣٠	٢
	٣٠		

التكرار المتجمع



شكل (٧-٣)

الحل :

(١) ارسم منحنى التكرار المتجمع الصاعد ومنحنى التكرار المتجمع النازل .

(٢) عين نقطة تقاطع المنحنيين .

(٣) انزل عموداً من نقطة

تقاطع المنحنيين على المحور الأفقي .

(٤) نلاحظ أن العمود يقطع المحور

الأفقي عند القيمة ١٤ تقريباً .

الوسيط ≈ 14 .

تحقق من صحة الاجابة جبرياً .

تدريب

[١] أوجد الوسيط لكل من القيم التالية :

٩ ، ٦ ، ١٢ ، ٧ ، ٤ (أ)

٣١ ، ٤٦ ، ٣٩ ، ٤٢ ، ٦٥ ، ٢٨ ، ٣٧ (ب)

١٥ ، ١٧ ، ١١ ، ١٤ ، ٨ ، ١٢ (جـ)

٩٥ ، ٩٢ ، ٧٥ ، ٨١ ، ٧٩ ، ٨٥ ، ٧٣ ، ٨٢ (د) .

[٢] إذا كانت أعمار خمسة أشخاص كما يلي :

٤٤ ، ٣٧ ، ٢٨ ، ٣٥ ، ٣٣ . أوجد الوسيط لهذه الأعمار .

[٣] أوجد الوسيط لجدول التكرار التالي باستخدام التكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع النازل ، وقارن بين الاجابتين .

الملاحظة	التكرار	التكرار المتجمع الصاعد	التكرار المتجمع النازل
٣٢	٣	٣	٣٠
٣٧	٦	٩	٢٧
٤٢	١٠	١٩	٢١
٤٧	٤	٢٣	١١
٥٢	٥	٢٨	٧
٥٧	٢	٣٠	٢
المجموع	٣٠		

[٤] لديك الجدول التكراري ذو الفئات التالية :

الفئات	٥ - ٢	٩ - ٦	١٣ - ١٠	١٧ - ١٤	المجموع
التكرار	٥	٤	٨	٣	٢٠
التكرار المتجمع الصاعد	٥	٩	١٧	٢٠	
التكرار المتجمع النازل	٢٠	١٥	١١	٣	

١ (أوجد الوسيط باستخدام التكرارين المتجمعين الصاعد والنازل .

[٥] الجدول التالي يوضح درجات الحرارة المسجلة خلال خمسة وعشرين يوماً

لمدينة الحوطة بلحج :

درجة الحرارة	٢٩	٣٢	٣٤	٣٥	٣٦	المجموع
التكرار	٣	٥	٧	٨	٢	٢٥
التكرار المتجمع الصاعد	٣	٨	١٥	٢٣	٢٥	
التكرار المتجمع النازل	٢٥	٢٢	١٧	١٠	٢	

١ (احسب الوسيط للتكرار المتجمع الصاعد .

ب (احسب الوسيط للتكرار المتجمع النازل .

جـ (أوجد الوسيط بيانياً . د (قارن بين الوسيطات الثلاثة .

٧ : ٥ تمارين ومسائل عامة

[١] أوجد المتوسط الحسابي والوسيط للقيم التالية :

١ (١٧ ، ٢٦ ، ٣٢ ، ٢٢ ، ٢٧ ،

ب (٥٥ ، ٦٢ ، ٥٨ ، ٦٠ ، ٦٣ ، ٥٩ ،

[٢] إذا كانت قيم المتغير س هي : ٨ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ،

١ (أوجد قيمة المتوسط الحسابي وقيمة الوسيط للمتغير س .

ب (أوجد قيمة المتوسط الحسابي وقيمة الوسيط للمتغير س + ٣ .

[٣] أوجد المنوال لكل من الحالات الآتية :

١ (٣ ، ٥ ، ٣ ، ٨ ، ٥ ، ٩ ، ٥ .

ب (١٤ ، ١٦ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٣ ، ١٧ .

جـ (٢٦ ، ٣٢ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ٢٩ .

(الدرجة العظمى ٦٠ درجة) .

الدرجة	٢١	٢٧	٣٠	٣٦	٤٢	٤٥	٥٤	٥٦	المجموع
التكرار	٥	٨	٨	١٤	١٣	١٦	١٢	٤	٨٠
الدرجة × التكرار									

١ (أكمل الجدول التكراري اعلاه . ب) ما حجم العينة .

جـ) احسب المتوسط الحسابي . د) أوجد المنوال لهذه الدرجات .

هـ) احسب الوسيط لهذه الدرجات .

[٥] البيانات التالية تمثل عدد الاشخاص الذين ارتادوا المكتبة خلال عشرة أيام :

١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٤٠ ،

١٤٢ ، ١٤٦ ، ١٣٥ ، ١٤٨ ، ١٥٠ ،

١ (اكتب البيانات السابقة في جدول تكراري ثم احسب المتوسط الحسابي والوسيط لهذه البيانات .

ب (اكتب البيانات السابقة في جدول تكراري بشكل فئات بحيث يكون طول الفئة = ٤ ، ثم أوجد المتوسط الحسابي والوسيط لهذه البيانات .

جـ) قارن بين المتوسطين الحسابيين في ١، ب وكذلك بين الوسيطين في ١، ب أيضاً .

[٦] الجدول التالي يوضح استهلاك الماء بالتر المكعب لعشرين أسرة في مدينة

الحديدة خلال شهرين فقط :

كمية الماء بالتر المكعب	٣٠	٣٢	٣٣	٣٥	٣٨	المجموع
التكرار	٣	٥	٨	٢	٢	٢٠
التكرار المتجمع الصاعد						
التكرار المتجمع النازل						

١ (أكمل الجدول .

ب (أوجد الوسيط باستخدام التكرار المتجمع الصاعد .

جـ (أوجد الوسيط باستخدام التكرار المتجمع النازل .

د (أوجد الوسيط بيانياً . هـ (قارن بين الوسيطات الثلاثة السابقة .

[٧] البيانات التالية توضح عدد أفراد ٣٠ أسرة في محافظة اب :

٥ ، ٤ ، ١ ، ٥ ، ٦ ، ٣ ، ٧ ، ٩ ، ٣ ، ٤

٨ ، ٣ ، ٢ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٧ ، ٨ ، ٦

٤ ، ٧ ، ٣ ، ٦ ، ٧ ، ٥ ، ٤ ، ٥ ، ٨ ، ٩

١ (كوّن جدولاً تكرارياً للبيانات السابقة ، ثم أوجد المتوسط والوسيط والمنوال .

ب (كوّن جدولاً تكرارياً للبيانات السابقة بشكل فئات بحيث يكون

طول الفئة = ٢ ، ثم أوجد الوسيط باستخدام التكرار المتجمع

الصاعد والمتوسط الحسابي .

جـ (أوجد الوسيط بيانياً .

٧ : ٦ اختبار الوحدة

[١] أوجد كلاً من المتوسط الحسابي والمنوال والوسيط لكل من القيم التالية :

١ (٥ ، ٤ ، ٨ ، ٦ ، ١٣ ، ٥ ، ١١ ، ٥ ، ١٥

ب (٣ ، ٥ ، ٣ ، ٩ ، ٣ ، ١٥ ، ٣ ، ٧

الملاحظة	١	٢	٣	٤	٥	المجموع
التكرار	٣	٥	٢	٣	٣	١٦
الملاحظة × التكرار	٣	١٠	٦	١٢	١٥	٤٦

أوجد : ١ (المتوسط الحسابي . ب) المنوال .

[٣] لديك جدول التوزيع التكراري الآتي :

الفئات	٣ - ٥	٦ - ٨	٩ - ١١	١٢ - ١٤	المجموع
مركز الفئة					
التكرار	٢	٦	٦	٣	١٧
مركز الفئة × التكرار					

١ (أكمل الجدول . ب) أوجد المنوال .

جـ) أوجد المتوسط الحسابي .

[٤] الجدول التالي يوضح درجات ٣٥ طالباً في مادة اللغة العربية :

الدرجة	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	المجموع
التكرار	٢	٣	٦	٩	٨	٥	٢	٣٥
التكرار المتجمع الصاعد								
التكرار المتجمع النازل								

١ (أكمل الجدول .

ب) أوجد الوسيط باستخدام التكرار المتجمع الصاعد .

جـ) أوجد الوسيط بيانياً . د) قارن بين الوسيطين .

تم الكتاب بحمد الله

بيانات المستجيب:

الاسم /	المؤهل وتاريخه /	التخصص /
العمل الحالي /	المحافظة /	

بيانات الكتاب:

المادة /	الصف /	اسم الكتاب /
الجزء /	الطبعة /	السنة الدراسية /
تاريخ تعبئة الاستبانة /		

نهدف من هذه الاستبانة تقييم الكتاب بغرض تحسينه في الطبقات القادمة،
نرجو التكرم بوضع علامة (✓) تحت الوصف الذي تراه مناسباً لإيجابتك أمام كل بند.

البيانات	جيد جداً	جيد	مقبول	ضعيف
أولاً - الأهداف: - وضوح الصياغة. - تقيس فكرة محددة. - يمكن قياسها. - شاملة (معرفية - مهارية - وجدانية).				
ثانياً - المادة العلمية وأسلوب عرضها: - ملائمة لغة الكتاب لمستوى المتعلم. - سلامة ووضوح لغة الكتاب. - ترسيخ المحتوى للقيم الدينية والوطنية. - مادة الكتاب تكسب المتعلم خبرات جديدة. - ملائمة المادة لمشكلات المتعلم واهتماماته. - مادة الكتاب تساعد المتعلم على فهم المشكلات. - مادة الكتاب تراعي الفروق الفردية. - خلو الكتاب من التكرار في الموضوعات. - يراعي أسلوب عرض المادة الترابط والتسلسل المنطقي. - مراعاة مادة الكتاب للحدائق والدقة العلمية. - عرض المادة تحفيظ علم القراءة والبحث والتفكير.				
ثالثاً - الوسائل التعليمية: - وضوحها ودقتها. - ارتباطها بموضوعات الدرس. - مدى ارتباطها بالأهداف. رابعاً - التقويم: - الأنشطة والتمارين تكسب المتعلم مهارات متنوعة. - بطاقات التفكير تثير دافعية البحث والإطلاع. - الأسئلة والتمرينات تقيس مدى تحقيق الأهداف. - مناسبة لمستوى المتعلم. - دقة وضوح الصياغة. - تراعي الفروق الفردية. - متنوعة وشاملة للجوانب المعرفية. - تساعد المتعلم في تطبيق ما تعلمه في مواقف الحياة المختلفة. - كفاية الأسئلة في مساعدة المتعلم على استيعاب مادة الكتاب. خامساً - الشكل والإخراج الفني: - ارتباط الغلاف بمحتوى الكتاب. - متانة تجليد الكتاب. - وضوح الألوان ومناسبتها. - وضوح ودقة الطباعة.				

