



الجمهورية التونسية
وزارة التربية والتعليم
قطاع المناهج والتوجيه
الإدارة العامة للمناهج

الرياضيات

للمصف الثاني الثانوي (القسم العلمي)

الجزء الأول

فريق التأليف

د. شكيب محمد باجرش / رئيساً

د. أمة الآله علي حميد الحوري	أ. سالمين محمد باسلوم (منسقاً)
د. عوض حسين البكري	د. محمد علي مرشد
د. محمد رشاد الكوري	أ. يحيى بكار مصطفى
د. محمد حسن عبده المسوري	أ. عبدالباري طه حيدر
د. عبدالله سالم بن شحنة	أ. نصر محمد بدر
د. عبدالرحمن محمد مرشد الجابري	أ. جميلة إبراهيم الرازحي
د. علي شاهر القرشي	أ. عادل علي مقبل البنأ
أ. مريم عبدالجبار سلمان	أ. عبدالرحمن عبدالله عثمان

أ. يحيى محمد الكنز

فريق المراجعة والتطوير:

د/ أمة الآله علي حميد الحوري.	أ/ أحمد عائش عبدالله الحيمي.
أ/ عبد الحكيم حسن السفيني.	أ/ شرف عثمان الخامري.
أ/ يحيى محمد الكنز.	أ/ عارف سيف الشرعبي.
أ/ جميلة إبراهيم الرازحي.	أ/ حميد الرومي.

الإخراج الفني

صف طباعي وتصميم وإخراج: جلال سلطان علي

أشرف على التصميم: حامد عبدالعالم الشيباني

١٤٣٥هـ / ٢٠١٤م



المصدر: قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٦م بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية

أعضاء اللجنة العليا للمناهج

أ.د. عبدالرزاق يحيى الأشول.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| د. عبدالله عبده الحامدي. | أ/ علي حسين الحيمي. |
| د/ صالح ناصر الصوفي. | د/ أحمد علي المعمري. |
| أ.د/ محمد عبدالله الصوفي. | أ.د/ صالح عوض عرم. |
| أ/ عبدالكريم محمد الجنداري. | د/ إبراهيم محمد الحوثي. |
| د/ عبدالله علي أبو حورية. | د/ شكيب محمد باجرش. |
| د/ عبدالله لميس. | أ.د/ داوود عبدالملك الحدابي. |
| أ/ منصور علي مقبل. | أ/ محمد هادي طواف. |
| أ/ أحمد عبدالله أحمد. | أ.د/ أنيس أحمد عبدالله طائع. |
| أ.د/ محمد سرحان سعيد المخلافي. | أ/ محمد عبدالله زبارة. |
| أ.د/ محمد حاتم المخلافي. | أ/ عبدالله علي إسماعيل. |
| د/ عبدالله سلطان الصلاحي. | |

قررت اللجنة العليا للمناهج طباعة هذا الكتاب .

في اطار تنفيذ التوجهات الرامية للاهتمام بنوعية التعليم، وتحسين مخرجاته تلبية للاحتياجات ووفقاً للمتطلبات الوطنية.

فقد حرصت وزارة التربية والتعليم في إطار توجهاتها الإستراتيجية لتطوير التعليم الأساسي والثانوي على إعطاء أولوية استثنائية لتطوير المناهج الدراسية، كونها جوهر العملية التعليمية وعملية ديناميكية تتسم بالتجديد والتغيير المستمرين لاستيعاب التطورات المتسارعة التي تسود عالم اليوم في جميع المجالات.

ومن هذا المنطلق يأتي إصدار هذا الكتاب في طبعته المعدلة ضمن سلسلة الكتب الدراسية التي تم تعديلها وتنقيحها في عدد من صفوف المرحلتين الأساسية والثانوية لتحسين وتجويد الكتاب المدرسي شكلاً ومضموناً، لتحقيق الأهداف المرجوة منه، اعتماداً على العديد من المصادر أهمها: الملاحظات الميدانية، والمراجعات المكتبية لتلافي أوجه القصور، وتحديث المعلومات، وبما يتناسب مع قدرات المتعلم ومستواه العمري، وتحقيق الترابط بين المواد الدراسية المقررة، فضلاً عن إعادة تصميم الكتاب فنياً وجعله عنصراً مشوقاً وجذاباً للمتعلم وخصوصاً تلاميذ الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

ويعد هذا الإنجاز خطوة أولى ضمن مشروعي التطويري المستمر للمناهج الدراسية ستتبعها خطوات أكثر شمولية في الأعوام القادمة، وقد تم تنفيذ ذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في وزارة التربية والتعليم، والجامعات من الذين أنضجتهم التجربة وصقلهم الميدان برعاية كاملة من قيادة الوزارة والجهات المختصة فيها.

ونؤكد أن وزارة التربية والتعليم لن تتوانى عن السير بخطى حثيثة، ومدرسة؛ لتحقيق أهدافها الرامية إلى تنوير الجيل وتسليحه بالعلم وبناء شخصيته المتزنة والمتكاملة القادرة على الإسهام الفاعل في بناء الوطن اليمني الحديث والتعامل الإيجابي مع كافة التطورات العصرية المتسارعة والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

أ.د. عبدالرزاق يحيى الأشول

وزير التربية والتعليم

رئيس اللجنة العليا للمناهج

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وآله وصحبه وسلم .
إن إعادة النظر في مناهج الرياضيات وكتبها المدرسية أمر ضروري تحتّمه مواكبة التطور العلمي ،
وتحديث تربويات الرياضيات إضافة إلى مساهمة التغيرات الاجتماعية .
واستجابة لذلك يأتي هذا الكتاب « كتاب الرياضيات للصف الثاني الثانوي – القسم العلمي »
كحلقة ضمن سلسلة متكاملة على مرحلتين : الأساسية (١ - ٩) ، والثانوية من (الأول الثانوي
إلى الثالث الثانوي) .

لقد عُرِضت مواضيع الكتاب في تماسك ، وتكامل وفق تسلسل علمي ونفسي تربوي ، ومراعاة
للفروق الفردية ، وتم تقديم المادة الدراسية بأسلوب سلس واضح لاغموض فيه ولا تعقيد ؛ حيث أوردنا قدرًا
كافيًا من الأمثلة بعد العرض النظري وأتبعنا ذلك بعدد من التمارين والمسائل آملين إتاحة فرص كثيرة
للتعامل مع المادة ؛ ليكون الطالب محور التعلم معتمداً على النشاط بدافع ذاتي محققاً بذلك الأهداف
الوجدانية .

واتساقاً مع كتاب الصف الأول الثانوي والمواد المرافقة له ؛ فإن هذا الكتاب وما يرافقه من كتاب
التمارين ، ودليل المعلم يهتم اهتماماً كبيراً بالمفاهيم الأساسية إلى جانب تقديمه معارف سليمة ومراعاته
انسجام الموضوعات مع عمليات التعلم الطبيعي للطلبة كما يحفز المدرسين على ابتكار أساليب تدريس
جديدة بما يضمن لطلبتهم تعلماً فاعلاً .

ومن أهم أهداف وزارة التربية والتعليم أن يظل التطوير في نمو وتطور مستمرين بمتابعة كل جديد في
تدريس الرياضيات وهذا لا يتأتى إلا بالاستفادة من واقع التطبيق في الميدان التدريسي . فإذا راعينا كل
المبادئ المذكورة أعلاه بقدر ما وفقنا المولى عز وجل بإعداد هذه المواد التربوية في ضوء إستراتيجيات تهدف
إلى تقديم الأجدود (مادة وطريقة) ؛ فإننا ننظر بشوق بالغ أن يوافينا ذوو العلاقة بملاحظاتهم بغية
الاستفادة منها .

نسأل المولى العلي القدير أن نكون قد وفقنا في كل ما نصبو إليه فهو ولي التوفيق والهادي إلى سواء
السبيل .

المؤلفون

المحتويات

الصفحة	الموضوع
٦	الوحدة الأولى - الحلقة والحقل
٦	١ - ١ مراجعة وتمهيد
١٤	٢ - ١ الحلقة
٢١	٣ - ١ الحقل
٢٤	٤ - ١ حقل الأعداد الحقيقية
٢٨	الوحدة الثانية - الدوال الحقيقية
٢٨	١ - ٢ الدوال الحقيقية
٤٠	٢ - ٢ بعض أنواع الدوال وتمثيلها
٥٢	٣ - ٢ اطراد الدوال
٦١	الوحدة الثالثة - المتتاليات
٦١	١ - ٣ المتتاليات
٧٠	٢ - ٣ المتتالية الحسابية
٧٤	٣ - ٣ المتتالية الهندسية
٩٦	الوحدة الرابعة - اللوغاريتمات
٩٦	١ - ٤ الدالة الأسية
٩٨	٢ - ٤ اللوغاريتمات وخواصها
١٠٥	٣ - ٤ الدالة اللوغاريتمية
١٠٩	٤ - ٤ اللوغاريتم المعتاد
١١٣	٥ - ٤ اللوغاريتم الطبيعي
١١٦	٦ - ٤ التبسيط باستخدام اللوغاريتمات
١١٨	الوحدة الخامسة - النهايات والاتصال والاشتقاق
١١٨	١ - ٥ نهاية الدوال الحقيقية
١٣٣	٢ - ٥ الاتصال
١٣٩	٣ - ٥ معدل تغير الدالة
١٤٥	٤ - ٥ المشتقة
١٥٢	٥ - ٥ المشتقة عند نقطة والمشتقة على فترة
١٥٨	٦ - ٥ قواعد الدوال القابلة للاشتقاق

مراجعة وتمهيد

١ : ١

تعرفت سابقاً على العملية الثنائية ، والنظام الرياضي ذي العملية الواحدة ، وكمثال على ذلك درست بنية الزمرة وخواصها الأساسية .

تذكر

يسمى الزوج المرتب $(S, *)$ نظاماً رياضياً ذا عملية واحدة ، إذا كانت S مجموعة غير خالية والعملية $*$ ثنائية (مغلقة) على S .

تدريب (١ - ١)

بين أيّاً مما يلي نظاماً رياضياً ذا عملية واحدة :

$(+, \cdot)$ ، $(\times, \vee)$ ، $(+, \cup)$ ، $(-, \cap)$ ، $(\div, \cap)$.

مثال (١ - ١)

بين فيما إذا كان كل من $(S, *)$ ، $(S, \cap)$ ، $(S, \cup)$ نظاماً رياضياً ذا عملية واحدة . حيث العملية $*$ معرفة كما يلي :

$$s * v = \frac{sv}{2} ; \quad \forall s, v \in H$$

الحل :

إذا كان $s, v \in H$ ، فإن $s \cap v \in H$ ، وبالتالي $\frac{sv}{2} \in H$ ، وعليه فإن $(S, *)$ نظام رياضي ذو عملية واحدة . أما $(S, \cap)$ ليس نظاماً رياضياً ذا عملية واحدة ؛ لأن العملية $*$ ليست مغلقة على S . إذ أن $1, 3 \in S$ ، $1 * 3 = \frac{3 \times 1}{2} = \frac{3}{2} \notin S$.

تذكر

النظام الرياضي $(S, *)$ يسمى زمرة ، إذا تحققت فيه الشروط الآتية :

١ - الخاصية التجميعية ؛ أي أن : $1 * (b * c) = (1 * b) * c$ ؛ $1 \neq b, c$ ، $1 \in S$.

٢ - وجود العنصر المحايد ؛ أي أن $\exists e \in S$ ، بحيث $a * e = a = e * a$ ؛ $\forall a \in S$ يسمى و عنصراً محايداً .

٣ - وجود النظير ، أي أن : $\forall a \in S$ ، $\exists a^{-1} \in S$ ، بحيث $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$. يسمى a^{-1} نظيراً للعنصر a .
وإذا كانت العملية $*$ تبديلية ، سميت الزمرة $(S, *)$ زمرة تبديلية .

تدريب (١ - ٢)

بين أياً من الأنظمة الآتية يمثل زمرة ، مع ذكر السبب :
(ط ، +) ، (ص ، +) ، (ن ، ×) ، (ن ، *) ، (ن ، ×) ، وإذا كانت أي منها زمرة فهل هي تبديلية ؟

تذكّر

$$ص_0 = \{ 0, 1, 2, \dots, 9 \}$$

$$ص_3^* = \{ 1, 2, 3, \dots, 9 \}$$

نرمز لعملية الجمع على $ص_0$ بالرمز $\oplus$ ، وتعرف كما يلي :

$$a \oplus b = \text{باقي قسمة } (a + b) \text{ على } 10$$

نرمز لعملية الضرب على $ص_0$ بالرمز $\odot$ وتعرف كما يلي :

$$a \odot b = \text{باقي قسمة } (a \cdot b) \text{ على } 10$$

$$\text{فمثلاً : } ص_0 = \{ 0, 1, 2 \} , \quad ص_3^* = \{ 1, 2 \} , \quad ص_6^* = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \} , \quad ص_9^* = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$$

ومن تعريف العملية $\oplus$ على $ص_0$ مثلاً نجد أن :

$$2 \oplus 3 = 5 , \quad 4 \oplus 2 = 6 , \quad 5 \oplus 3 = 8$$

ومن تعريف العملية $\odot$ على $ص_0^*$ مثلاً نجد أن :

$$2 \odot 3 = 6 , \quad 4 \odot 3 = 12 \Rightarrow 2 , \quad 1 \odot 4 = 4$$

تدريب (١ - ٣)

بين أن $(ص_0, \oplus)$ زمرة بينما $(ص_0^*, \odot)$ ليست زمرة .

مثال (١ - ٢)

برهن أن $(ص_0, \oplus)$ زمرة تبديلية .

مثال (۱ - ۳)

بين أيّاً من $(\odot, \text{ص}_\circ^*)$ ، $(\odot, \text{ص}_\circ^*)$ يشكل زمرة .

الحل :

بما أن كل من V_1^* ، V_2^* مجموعة منتهية ، فيمكن تمثيل العملية المعرفة على كل منهما بالجدولين التاليين:

၈	၇	၆	၀	၄	၃	၂	၁	၀
၈	၇	၆	၀	၄	၃	၂	၁	၁
၇	၀	၃	၁	၈	၆	၄	၂	၂
၆	၃	.	၆	၃	.	၆	၃	၃
၀	၁	၆	၂	၇	၃	၈	၄	၄
၄	၈	၃	၇	၂	၆	၁	၀	၀
၃	၆	.	၃	၆	.	၃	၆	၆
၂	၄	၆	၈	၁	၃	၀	၇	၇
၁	၂	၃	၄	၀	၆	၇	၈	၈

جدول (۱ - ۲)

ε	۳	۲	۱	⊙
ε	۳	۲	۱	۱
۳	۱	ε	۲	۲
۲	ε	۱	۳	۳
۱	۲	۳	ε	ε

جدول (۱ - ۱)

من الجدول (١ - ١) الخاص بالنظام (ص.ه* ، ☉) نلاحظ ما يلي :

١ ■ إن العملية $\odot$ ثنائية على V^* ، يتضح ذلك من كون أي عنصر في الجدول هو عنصر من المجموعة V^* .

$$\xi = \gamma \odot \gamma = (\xi \odot \gamma) \odot \gamma, \quad \xi = \xi \odot 1 = \xi \odot (\gamma \odot \gamma) \quad \blacksquare \gamma$$

أي أن : $(2 \odot 3) \odot 4 = 2 \odot (3 \odot 4)$ ، وبصورة عامة يمكن التحقق من أن :

$$A \in \mathcal{V}^{\otimes n}$$

أي أن العملية ⑤ تجميعية .

٣. ■ للنظام (صه* ، ٥) عنصر محايد هو (١) يتضح ذلك من تطابق عناصر الصف الأول مع عناصر

الصف الرئيس مع عناصر العمود الأول مع العمود الرئيس وتقاطعهما هو العنصر (١).

■ ٤ لكل عنصر من ص* نظير بالنسبة للعملية ⑤ ، نوضحها في الجدول التالي :

العنصر	١	٢	٣	٤
النظير	١	٣	٢	٤

مما سبق نستنتج أن $(\odot, \text{ص.ه.}^*)$ زمرة .
 من الجدول (١ - ٢) نلاحظ أن العملية $\odot$ ليست ثنائية على ص.ه.^* ذلك لأن $3 \odot 3 = 0 \neq \text{ص.ه.}^*$ ،
 وهذا يكفي للقول أن $(\odot, \text{ص.ه.}^*)$ ليس نظاماً ، وبالتالي ليس زمرة .

تدريب (١ - ٤)

- ١ - بين أن الزمرة $(\odot, \text{ص.ه.}^*)$ تبديلية .
- ٢ - باستخدام فكرة البرهان في المثال (١ - ٢) برهن أن النظام $(\odot, \text{ص.ه.}^*)$ زمرة تبديلية ، حيث و عدد أولي .

تذكر

في الزمرة $(\text{س.ه.}, *)$ تتحقق الخواص الأساسية الآتية :

- ١ ■ $a * b = b * a \Leftrightarrow b = a$ (خاصية الحذف)
 $b * a = a * b \Leftrightarrow b = a$.
- ٢ ■ للمعادلة $a * \text{س} = b$ حل وحيد هو $\text{س} = a * b$ ، حيث a نظير العنصر a
 للمعادلة $\text{س} * a = b$ حل وحيد هو $\text{س} = b * a$.
- ٣ - العنصر المحايد في الزمرة وحيد .
- ٤ - نظير أي عنصر في الزمرة وحيد .

مثال (١ - ٤)

ليكن $(\odot, \text{ص.ه.}^*)$ نظاماً رياضياً تجميعياً ، حيث العملية $\odot$ معرفة على ص.ه.^* على النحو التالي :

$$a \odot b = \frac{a}{b} .$$

- ١ - بين أن $(\odot, \text{ص.ه.}^*)$ زمرة تبديلية .
- ٢ - حل المعادلة $\text{س} \odot 2 = 4$ في كل من الزمرة $(\odot, \text{ص.ه.}^*)$ ، والزمرة $(\odot, \text{ص.ه.}^*)$.

الحل :

- ١ - بما أن النظام $(\odot, \text{ص.ه.}^*)$ هو نظام رياضي تجميعي ، فعلينا فقط إيجاد العنصر المحايد ، نظير كل عنصر ،
 والتحقق من أن العملية $\odot$ تبديلية على ص.ه.^* :
 أولاً - نوجد العنصر المحايد (و) .
 نفرض أن و هو العنصر المحايد بالنسبة للعملية $\odot$ ، فنجد أن :

$$a \odot \text{و} = \frac{a}{\text{و}} = \frac{a}{\text{و}} = \text{و} \odot a : \text{و} \in \text{ص.ه.}^* \quad (\text{من تعريف العملية } \odot) .$$

$$\therefore \frac{a}{\text{و}} = \text{و} \quad (\text{تعريف العنصر المحايد}) \quad \therefore \text{و} = 2$$

∴ العنصر المحايد (و) = ٢ .

ثانياً - نوجد النظير (أ) .

نفرض أن أ هو نظير العنصر ١ بالنسبة للعملية ○ ، فنجد أن :

$$١ \circ \hat{أ} = \frac{١ \hat{أ}}{٢} = \frac{\hat{أ} ١}{٢} = \hat{أ} \circ ١ \quad (\text{من تعريف العملية } \circ) .$$

$$٢ = \frac{١ \hat{أ}}{٢} \quad (\text{من تعريف النظير و حيث } ٢ = و) .$$

$$\hat{أ} ١ = ٢ \quad ، \quad \frac{٤}{١} = \hat{أ} \quad \therefore$$

ثالثاً - الخاصية التبادلية :

$$١ \circ ب = \frac{١ ب}{٢} = \frac{ب ١}{٢} = ب \circ ١ \quad \therefore \quad \circ \text{ عملية تبادلية}$$

مما سبق نستنتج أن : (○ ، *) زمرة تبادلية .

٢ - أولاً - في الزمرة (○ ، *)

$$س \circ ٢ = ٤ \iff س = ٢ \circ ٤ \quad (\text{خاصية } ٢)$$

$$\iff س = ٢ \circ \frac{٤}{٤} \quad (\text{لأن } \frac{٤}{٤} = ١)$$

$$س = ١ \circ ٢ = \frac{١ \times ٢}{٢} = ١ \quad (\text{من تعريف العملية } \circ)$$

$$\therefore س = ١$$

ثانياً - في الزمرة (○ ، *) ، ومن الجدول (١-١) السابق نجد أن :

$$س \circ ٤ = ٢ \iff س = ٢ \circ ٤$$

$$٢ = ٤ \circ ٢ \quad \text{لماذا ؟}$$

$$٣ = ٢ \circ ٤ \quad \text{لماذا ؟}$$

النظام ذو العمليتين :

تعريف (١-١)

يسمى الثلاثي المرتب (س ، * ، ○) نظاماً رياضياً ذا عمليتين ، إذا كانت س مجموعة غير خالية ، وكل من العمليتين * ، ○ ثنائية على س .

مثال (١-٥)

لتكن س = { ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ } ولنعرّف العمليتين * ، ○ على النحو التالي :

$$٧ س ، ص \ni س ، س * ص = \frac{س + ص}{٢} ، س \circ ص = س .$$

فهل (س، *، ○) نظام رياضي ذو عمليتين؟

الحل :

إن العملية * ليست ثنائية على س، لأن: $٢، ٤ \in س$ ، $٢ * ٤ = \frac{٢+٤}{٢} = ٣ \notin س$.
وعليه فإن (س، *، ○) ليس نظاماً رياضياً ذا عمليتين، [على الرغم من أن العملية ○ ثنائية على س].

تعريف (١-٢)

ليكن (س، *، ○) نظاماً رياضياً ذا عمليتين، يقال أن العملية ○ تتوزع على العملية * إذا كان لكل ا، ب، ج $ا \in س$ ، يتحقق:

$$ا \circ (ب * ج) = (ا \circ ب) * ج$$

$$(ا * ب) \circ ج = ا \circ (ب \circ ج)$$

مثال (١-٦)

ليكن (ص، *، ○) نظاماً رياضياً ذا عمليتين معرفتين على النحو التالي:

$$ا \circ ب = ا + ب$$

$$ا * ب = ا \cdot ب$$

فبين أن العملية ○ تتوزع على العملية *.

الحل :

بفرض أن: ا، ب، ج $\in ص$ ، فإن:

$$ا \circ (ب * ج) = (ا + ب \cdot ج) = (ا + ب) * ج$$

$$(ا * ب) \circ ج = (ا \cdot ب) + ج = ا * (ب + ج)$$

لماذا؟

$$ا \circ (ب * ج) = (ا + ب \cdot ج) = (ا + ب) * ج$$

$$(ا * ب) \circ ج = (ا \cdot ب) + ج = ا * (ب + ج)$$

∴ العملية ○ تبديلية.

$$ا \circ (ب * ج) = (ا + ب \cdot ج) = (ا + ب) * ج$$

$$(ا * ب) \circ ج = (ا \cdot ب) + ج = ا * (ب + ج)$$

أي أن (ا * ب) ○ ج = (ا + ب) * ج

من (١) ، (٢) نستنتج أن العملية $\circ$ تتوزع على العملية $*$.

تدريب (١ - ٥)

في المثال (١ - ٦) بيّن أن العملية $*$ لا تتوزع على العملية $\circ$.

تمارين ومسائل (١ - ١)

[١] بين أيًا من الأنظمة الرياضية التالية يمثل زمرة :

- أ ($(+ , *$ ح) ، ، (ب ($(\times , *$ ح) ، ،
 ج ($(+ , *$ ص_٨) ، ، (د ($(\odot , *$ ص_{١١}) ، ،
 هـ ($(\odot , *$ ص_{١١}) ، ، (و ($(+ , *$ ص_{١٢}) ، .

[٢] ليكن ($\circ , *$ ح) نظاماً رياضياً تجميعياً ، حيث العملية $\circ$ معرفة على $*$ ح على النحو التالي :

س $\circ$ ص = ٣ س ص ، $\forall$ س ، ص $\exists$ ح ، فاثبت أن ($\circ , *$ ح) زمرة تبديلية .

[٣] إذا كان كل من النظامين ($\odot , *$ ص_٦) ، ($(+ , *$ ص_٦) زمرة تبديلية .

فأوجد حلّ :

أ (المعادلة : س $\odot$ ٢ = ١ في الزمرة ($(+ , *$ ص_٦)

ب (المعادلة : ٦ $\odot$ س = ٤ في الزمرة ($(\odot , *$ ص_٦)

[٤] لنعرف على $\mathcal{N}$ * العمليات $\circ , *$ على النحو التالي :

$$س * ص = س + ص - ١$$

$$س \circ ص = س + ص - س ص .$$

فأجب عما يلي :

أ (هل ($\mathcal{N} , *$ ، $\circ$) نظام رياضي ذو عمليتين ؟

ب (هل العملية $*$ تتوزع على العملية $\circ$ ؟

ج (هل العملية $\circ$ تتوزع على العملية $*$ ؟

[٥] ليكن ($\mathcal{S} , *$) نظاماً رياضياً ذا عملية ، وليكن $\mathcal{A} , \mathcal{B} , \mathcal{C} \in \mathcal{S}$ بحيث : $\mathcal{A} * \mathcal{B} = \mathcal{A} * \mathcal{C}$

فهل من الضروري أن يكون $\mathcal{B} = \mathcal{C}$ ؟ ولماذا ؟

[٦] في الزمر المنتهية يمكننا تمثيل عملياتها في الجداول . فسّر لماذا لا يمكن أن يتكرر عنصر ما في سطر ، أو عمود واحد .

[٧] ليكن $(\{9\}, *)$ نظاماً رياضياً ذا عملية .

- أ () أوجد $9 * 9$ ،
 ب () هل العملية $*$ تبديلية ؟
 ج () هل العملية $*$ تجميعية على $\{9\}$ ؟
 د () هل للنظام عنصر محايد ؟
 هـ () هل النظام زمرة ؟

الحلقة

١ : ٢

عندما ندرس نظاماً رياضياً ذا عمليتين ، مثل $(S, *, \circ)$ فإننا نجد شروطاً معينة تحقق على النظامين $(S, *)$ و $(S, \circ)$ المشتقين من النظام الأساسي وهما نظامان ذا عملية واحدة ، وبالتالي يتكوّن لدينا نوع آخر من الأنظمة الرياضية .

تعريف (١-٣)

النظام الرياضي $(S, *, \circ)$ يسمى (حلقة) إذا تحققت الشروط التالية :

- ١ - $(S, *)$ زمرة تبديلية
- ٢ - العملية $\circ$ تجميعية على S .
- ٣ - العملية $\circ$ تتوزع على العملية $*$.

مثال (١-٧)

بيّن أن النظام الرياضي $(\mathbb{Z}, +, \times)$ حلقة ، حيث $+$ ، $\times$ هما عمليتا الجمع والضرب المعرفتان على مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$.

الحل :

- نعلم أن النظام $(\mathbb{Z}, +)$ زمرة تبديلية .
 - العملية $\times$ تجميعية على $\mathbb{Z}$.
 - عملية الضرب توزيعية على عملية الجمع .
- وبحسب التعريف (١-٣) ، فإن $(\mathbb{Z}, +, \times)$ حلقة .

تدريب ٦-١

بيّن أن :

- ١ - كلاً من النظامين $(\mathbb{Z}, +, \sim)$ ، $(\mathbb{Z}, +, \times)$ حلقة .
- ٢ - النظام $(\mathbb{Z}, +, \times, *)$ ليس حلقة ، وضح السبب .

$$(s_1, v_1) \circ (s_2, v_2) = (s_1 s_2, v_1 v_2) \cdot$$

بين أن $(s, *, \circ)$ حلقة .

الحل :

من تعريف العمليتين $*$ ، $\circ$ نجد أنهما مغلقتان على s . [تحقق من ذلك] .

■ ١ العملية $*$ تجميعية على s لأنه مهما كانت (s_1, v_1) ، (s_2, v_2) ، $(s_3, v_3) \in s$ فإن :

$$(s_1, v_1) * [(s_2, v_2) * (s_3, v_3)] \cdot$$

$$= (s_1, v_1) * (s_2 s_3, v_2 v_3) =$$

$$= (s_1 (s_2 s_3), v_1 (v_2 v_3)) =$$

$$= ((s_1 s_2) s_3, (v_1 v_2) v_3) \text{ لأن العملية + تبديلية على ح .}$$

$$= [(s_1, v_1) * (s_2, v_2)] * (s_3, v_3) \cdot$$

■ ٢ يوجد عنصر محايد بالنسبة للعملية $*$ هو $(0, 0)$ ، ذلك لأن لكل $(s, v) \in s$ ، فإن

$$(s, v) * (0, 0) = (s + 0, v + 0) = (s, v) \cdot$$

■ ٣ لكل عنصر $(s, v) \in s$ نظير بالنسبة للعملية $*$ هو العنصر $(-s, -v)$ لأن :

$$(s, v) * (-s, -v) = (s - s, v - v) =$$

$$= (0, 0) \cdot$$

■ ٤ إن العملية $*$ تبديلية على s لأن العملية + تبديلية على ح ، وبذلك نرى أن $(s, *)$ زمرة تبديلية .

■ ٥ العملية $\circ$ تجميعية على s لأن : مهما كانت (s_1, v_1) ، (s_2, v_2) ، $(s_3, v_3) \in s$ فإن :

$$(s_1, v_1) \circ [(s_2, v_2) \circ (s_3, v_3)] \cdot$$

$$= (s_1, v_1) \circ (s_2 s_3, v_2 v_3) =$$

$$= (s_1 s_2 s_3, v_1 v_2 v_3) =$$

$$= (s_1 (s_2 s_3), v_1 (v_2 v_3)) =$$

$$= [(s_1, v_1) \circ (s_2, v_2)] \circ (s_3, v_3) \cdot$$

■ ٦ العملية $\circ$ تتوزع على العملية $*$ ، لأن : مهما كانت (s_1, v_1) ،

$$(s_2, v_2) \in s \text{ فإن :}$$

$$[(s_1, v_1) * (s_2, v_2)] \circ (s_3, v_3) \cdot$$

$$= (s_1 s_2, v_1 v_2) \circ (s_3, v_3) =$$

$$= (s_1 (s_2 s_3), v_1 (v_2 v_3)) =$$

$$= (s_1 s_2 s_3, v_1 v_2 v_3) =$$

$$= (s_1 (s_2 s_3), v_1 (v_2 v_3)) * (s_3, v_3) =$$

$$= [(s_1, v_1) \circ (s_2, v_2)] * (s_3, v_3) \cdot$$

مما سبق نستنتج أن $(s, *, \circ)$ حلقة .

بيّن أن الحلقة (س، *، ٠) المعرفة في المثال (١ - ٨) تبديلية ذات عنصر محايد. أوجده.

الخصائص الأساسية للحلقة :

إذا كانت (س، *، ٠) حلقة فذلك يقتضي أن تكون (س، *) زمرة وبالتالي فإن جميع خصائص الزمرة تتحقق في الحلقة بالنسبة للعملية *.
وهناك أيضاً خواص أساسية أخرى للحلقة تعتمد على العمليتين *، ٠ معاً، سنبرهن فيما يلي بعضاً منها :

خاصية (١) :

في أية حلقة (س، *، ٠) : $١ \circ ١ = ١$ و $١ \circ ١ = ١$ و $١ \circ ١ = ١$ ، حيث و هو العنصر المحايد بالنسبة للعملية * .

البرهان :

بما أن و هو العنصر المحايد بالنسبة للعملية * فإن :

$$١ \circ ١ = ١$$

$$\Leftarrow ١ \circ ١ = ١ \circ (١ \circ ١) = (١ \circ ١) \circ ١ \quad (\text{لأن } ٠ \text{ تتوزع على } *)$$

$$\text{أي أن: } ١ \circ ١ = ١ \circ (١ \circ ١) = (١ \circ ١) \circ ١ \quad (١) \dots\dots$$

من ناحية أخرى، بما أن $١ \circ ١ = ١$ ، إذن يوجد $(١ \circ ١) \circ ١ = ١$ ؛ بحيث

$$١ \circ (١ \circ ١) = ١ \circ ١$$

$$[١ \circ (١ \circ ١)] \circ ١ = ١ \circ (١ \circ ١) \quad (\text{من } (١))$$

$$[١ \circ (١ \circ ١)] \circ ١ = ١ \circ (١ \circ ١) \quad (\text{لأن } * \text{ تجميعية})$$

$$١ \circ (١ \circ ١) = ١ \circ ١ \quad (\text{من خاصية النظير})$$

$$١ \circ ١ = ١ \circ ١ \quad \text{أي أن: } ١ \circ ١ = ١$$

وبطريقة مشابهة ممكن إثبات أن : $١ \circ ١ = ١$

خاصية (٢) :

في أية حلقة (س، *، ٠) ولكل ا، ب، ج $١ \circ ١ = ١$ يتحقق ما يلي :

$$١ \circ ١ = ١ \circ (١ \circ ١) = (١ \circ ١) \circ ١ \quad \blacksquare ١$$

$$١ \circ ١ = ١ \circ ١ \quad \blacksquare ٢$$

$$١ \circ (١ \circ ١) = (١ \circ ١) \circ ١ \quad \blacksquare ٣$$

$$(١ \circ ١) \circ ١ = ١ \circ (١ \circ ١) \quad \blacksquare ٤$$

البرهان :

(١) بما أن (س، *، ٠) حلقة فإن (س، *) زمرة تبديلية

وعليه فإن : $\forall a \in S$ يوجد $a \in S$ ؛ بحيث $a = 1 * a$ ؛ حيث 0 هو العنصر المحايد بالنسبة لـ $*$.

$$\Leftarrow 0 \circ (1 * a) = 0 \circ a$$

$$\Leftarrow 0 = (1 \circ a) * (0 \circ a) = (0 \circ a) * (1 \circ a) \quad (\text{لأن } * \text{ تبديلية})$$

بمعنى أن العنصر $(0 \circ a)$ هو نظير العنصر $(1 \circ a)$ بالنسبة للعملية $*$.

$$إذن (0 \circ a) = (1 \circ a)$$

وبأسلوب مشابه يمكن إثبات أن $(0 \circ a) = (1 \circ a)$ وعليه يكون : $0 \circ a = (1 \circ a) = 0 \circ a$.

■ ٢ من (١) باستبدال b بـ b' واستخدام الخاصية $(b') = b$ ينتج المطلوب مباشرة .

$$\blacksquare ٣ (b * c) \circ a = (b \circ a) * (c \circ a) \quad [(b * c) \circ a] = [b \circ a] * [c \circ a]$$

$$= [b \circ a] * [c \circ a] = (b \circ a) * (c \circ a) \quad .$$

$$\text{أي أن } (b \circ a) * (c \circ a) = (b \circ a) * (c \circ a)$$

$$\Leftarrow (b \circ a) * (c \circ a) = (b \circ a) * (c \circ a) * (c \circ a) * (b \circ a)$$

$$\Leftarrow (b \circ a) * (c \circ a) = (b \circ a) * (c \circ a) * (c \circ a) * (b \circ a)$$

$$\therefore (b \circ a) * (c \circ a) = (b \circ a) * (c \circ a) .$$

(٤) تبرهن بالأسلوب نفسه .

إن ما برهنناه من خصائص للحلقة إضافة إلى خصائص الزمرة ، يسمح لنا بالقول إن العمليات في الحلقة $(S, +, \cdot, 0, 1)$ تجرى (من الناحية الصورية) كما تجرى في الأنظمة العددية المألوفة $(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$ ، $(\mathbb{Q}, +, \cdot, 0, 1)$ ، لذلك نسمي العنصر المحايد بالنسبة للعملية الأولى $*$ العنصر الصفري ، وأي عنصر من S غير العنصر المحايد بالنسبة للعملية $*$ يسمى العنصر غير الصفري .

إن الحلقة $(S, +, \cdot, 0, 1)$ بصورتها العامة هي تعميم لحلقة الأعداد الصحيحة $(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$ ، فالخصائص السابقة جميعها للحلقة هي بالضرورة متحققة في حلقة الأعداد الصحيحة ، لكن العكس ليس بالضرورة صحيحاً . فمثلاً في الحلقة $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot, 0, 1)$ إذا وجد عدداً حاصل ضربهما مساوياً للصفر ، فإن أحد العددين على الأقل يجب أن يكون مساوياً للصفر ، هذه الخاصية ليست بالضرورة صحيحة في أي حلقة $(S, +, \cdot, 0, 1)$ ، ففي الحلقة المعرفة في المثال (١-٨) نجد على سبيل المثال أن : $(0, 1) \cdot (1, 0) = (0, 0)$ ، في حين أن : $(0, 1) \neq (0, 0)$ وأن $(1, 0) \neq (0, 0)$. أي أن هناك على الأقل عنصرين غير صفريين حاصل ضربهما هو العنصر الصفري .

تعريف (١-٦)

يقال إن الحلقة $(S, +, \cdot, 0, 1)$ تحوي قاسماً للصفر إذا وجد عنصران $a, b \in S$ ، بحيث $a \neq 0$ ، $b \neq 0$ ، $a \cdot b = 0$ ؛ حيث 0 هو العنصر المحايد بالنسبة للعملية $*$ ، ويسمى كل من a, b قاسماً للصفر .

تعريف (١-٧)

يقال للحلقة التبادلية (س، *، ٠) بأنها حلقة تامة إذا كانت لا تحوي قواسم للصفر، أي إذا كان $٥١ = ب = و \iff ١ = و$ ، أو $ب = و$ ، $١٧ = ب \implies س = ٠$.

مثال (١-٩)

بيّن أن الحلقة (س، +، ٠) حلقة تامة، وأن الحلقة (ص، +، ٠) ليست تامة.

الحل:

جدول النظامين (س، +، ٠)، (ص، +، ٠) هما الجدولان (١-٣)، (١-٤) على الترتيب:

٣	٢	١	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠
٣	٢	١	٠	١
٢	٠	٢	٠	٢
١	٢	٣	٠	٣

جدول (١-٤)

٢	١	٠	٠
٠	٠	٠	٠
٢	١	٠	١
١	٢	٠	٢

جدول (١-٣)

ويلاحظ من جدول (١-٣) أن العنصر المحايد بالنسبة للعملية + وهو الصفر لا ينتج إلا عن ضرب عنصرين أحدهما الصفر نفسه، وبحسب التعريفين (١-٦)، (١-٧)، فإن الحلقة (ص، +، ٠) حلقة تامة بينما نلاحظ من جدول (١-٤) أن $٢ \oplus ٢ = ٠$ وهذا يعني أن الحلقة (س، +، ٠) تحوي قاسماً للصفر، وبالتالي فهي ليست تامة.

تمارين ومسائل (١-٢)

[١] لتكن (س، *، ٠) حلقة، بيّن أيّاً من العبارات الآتية صائبة وأيها خاطئة:

أ) النظام (س، ×) زمرة أبيلية.

ب) النظام (س، ٠) زمرة.

ج) كل عنصر من س له نظير بالنسبة للعملية ٠.

د) للمعادلة $١ * س = ب$ حلٌّ وحيدٌ في س؟

[٢] لتكن (س، *) زمرة أبيلية والعمليتان ٠، Δ على س معرفتان على النحو التالي:

$١ \oplus ب = و$ ، $١٧ = ب \implies س$ (حيث والعنصر المحايد بالنسبة للعملية *).

$١ \Delta ب = و$ ، $١٧ = ب \implies س$.

فأثبت أن :

أ) $(س، *، \circ)$ حلقة .

ب) $(س، *، \Delta)$ ليست حلقة .

[٣] لتكن $\circ، *$ عمليتين معرفتين على $ص$ على النحو التالي :

$$ا * ب = ا + ب - ١$$

$$ا \circ ب = ا + ب - ا ب \quad \forall ا، ب \in ص$$

برهن أن : $(ص، *، \circ)$ حلقة تبديلية أحادية .

[٤] ليكن النظام $(س، *، \circ)$ حلقة ، حيث $س = \{ا، ب، ج، د\}$.

الجدول (١ - ٥) يعرف العملية $*$ على $س$ أكمل (١ - ٦) الذي يعرف العملية $\circ$ على $س$.

$\circ$	ا	ب	ج	د
ا	ا	ا	ا	ا
ب	ب	ب		
ج	ج			ا
د	د	ب	ج	

جدول (١ - ٦)

س	ج	ب	ا	*
س	ج	ب	ا	ا
ج	س	ا	ب	ب
ب	ا	س	ج	ج
ا	ب	ج	س	س

جدول (١ - ٥)

[٥] لتكن $(س، +، \times)$ حلقة . نعرف عليها عملية جديدة Δ كما يلي :

$$ا \Delta ب = (ا \times ب) + (ب \times ا) \quad \forall ا، ب \in س$$

برهن أن : $(س، +، \Delta)$ حلقة تبديلية .

[٦] لتكن $(ص، \oplus، \odot)$ حلقة تبديلية .

أ) بين أن الحلقة $(ص، \oplus، \odot)$ ليست تامة .

ب) أوجد مجموعة حل المعادلة : $٢ \odot س \oplus ٤ = ٠$ في هذه الحلقة .

[٧] برهن : أنه إذا كانت $(س، *، \circ)$ حلقة تامة فإن قانوني الحذف يتحققان بالنسبة للعملية $\circ$. أي أن :

$$ا \circ ب = ا \circ ج \iff ب = ج$$

$$ب \circ ا = ج \circ ا \iff ب = ج$$

الحقل

١ : ٣

تعرفت في البند السابق مفهوم الحلقة كمثال للنظام الرياضي ذي العمليتين (س، *، ○). ولاحظت أن تعريف الحلقة لم يستوف شروطاً معينة هي موضوع هذا البند .

تعريف (٨-١)

يسمى النظام (س، *، ○) حقلاً إذا كان النظام حلقة تبديلية واحدية ، ويوجد لكل عنصر غير صفري نظير ضربي .

تدريب ٨-١

تحقق من أن كلا من النظامين (س، +، ×)، (س، +، ∨) حقلا بينما النظام (س، +، ×) ليس حقلاً. لاحظ أن التعريف (٨-١) للحقل يعتمد على تعريف الحلقة ، لذلك سنعطي تعريفاً آخر يكافئ التعريف (٨-١) ، لكنه أكثر تفصيلاً كما يلي :

تعريف (٩-١)

- يسمى النظام الرياضي (س، *، ○) حقلاً إذا تحققت فيه الشروط الآتية :
- ١ - النظام الرياضي (س، *، ○) زمرة تبديلية .
 - ٢ - النظام الرياضي (س، *، ○) زمرة تبديلية ، حيث $s^{-1} = s^*$ / {و} .
 - ٣ - العملية ○ تتوزع على العملية * .

مثال (١٠-١)

لتكن (س، +، ○) حلقة تبديلية أحادية (عنصرها المحايد ١)، بين أن (س، +، ○) حقل .

الحل :

بما أن (س، +، ○) حلقة تبديلية وواحدية ، وبحسب تعريف (٨-١) ، نحتاج فقط لإثبات أن لكل من ١، ٢ (العناصر غير الصفريّة في س) نظيراً بالنسبة للعملية ○، لذلك نمثل العملية ○ المعرفة على

○	١	٢
١	١	٢
٢	٢	١

جدول (٧-١)

س* في الجدول التالي :

يتضح من الجدول (٧-١) أن نظير ١ هو ١ نفسه ، نظير ٢ هو ٢ نفسه .

مثال (١ - ١١)

بيّن أن (ص ، + ،) ليس حقلاً .

الحل :

نبحث عن مدى توفر شروط التعريف (١ - ٩) في النظام المعطى .

١ - (ص ، +) زمرة إبدالية . (مثال ١ - ٢) .

٢ - (ص ، *) ليس زمرة ، لأن : $2 \odot 2 = 0 \neq 2$. أي أن العملية $\odot$ ليست مغلقة في ص .
إذا (ص ، + ،) ليس حقلاً .

الخصائص الأساسية في الحقل :

إنّ كون الحقل هو حلقة ، فإنّ كل خصائص الحلقة التي بينها سابقاً هي أيضاً خصائص للحقل .
هناك خصائص يتمتع بها الحقل ناتجة عن أنه كون (س ، * ،) حقلاً يقتضي أن يكون النظام (س ، *) زمرة ، وفيما يلي نبرهن أهم تلك الخواص .

١ ■ كل حقل هو حلقة تامة : أي أنه إذا كان (س ، * ،) حقلاً فإن :

$$a \odot b = 0 \iff a = 0 \text{ أو } b = 0 ، \text{ أو } a \odot b = 0 ، \text{ أو } b \odot a = 0 .$$

البرهان :

نفرض $a \odot b = 0$ ، بحيث $a \neq 0$ ، $b \neq 0$.

ونفرض أيضاً $a \neq 0$ ، علينا أن نثبت أن $b = 0$.

بما أن $a \neq 0$ ، فإن له نظيراً بالنسبة للعملية $\odot$ ، أي أن $a^{-1} \odot a = 1$.

$$\therefore a \odot b = 0$$

$$\therefore a^{-1} \odot (a \odot b) = a^{-1} \odot 0$$

$$\iff a^{-1} \odot (a \odot b) = 0 \text{ لماذا ؟}$$

$$\iff a^{-1} \odot (a \odot b) = 0 \text{ (حيث } a^{-1} \odot a = 1 \text{)}$$

$$\iff a^{-1} \odot (a \odot b) = 0$$

وهذا ما يثبت أن (س ، * ،) حلقة تامة .

إن عكس الخاصية (١) ليس صحيحاً ، فمثلاً الحلقة (ص ، + ،) حلقة تامة ، مع ذلك فإن (ص ، + ،) ليس حقلاً لأنه لا يوجد لأي عدد صحيح نظير ضربي في ص باستثناء العددين ١ ، -١ .

٢ ■ في أي حقل (س ، * ،) يكون للمعادلة : $(a \odot x) \odot b = 0$ حل وحيد هو

$$x = 0 \text{ (حيث } a \odot b \neq 0 \text{ ، } a \neq 0 \text{ ، } b \neq 0 \text{)} .$$

البرهان :

$$(a \odot x) \odot b = 0$$

$$\iff (a \odot x) \odot b = 0 \text{ [لأن (س ، *) زمرة تبديلية]} .$$

← $s = 1 \circ (ج * ب)$ لأن $(س^* ، \circ)$ زمرة تبديلية

، $1 \neq 0$.

وهذا ما يثبت أن : $1 \circ (ج * ب)$ حل للمعادلة المعطاة .

وحيث إن نظير أي عنصر في الزمرة وحيد ، فإن كل من $ب$ ، 1 وحيد وبالتالي ، فإن $1 \circ (ج * ب)$

حل وحيد للمعادلة $(س \circ 1) * ب = ج$.

مثال (١-١٢)

حل المعادلة $(س \circ 2) * 1 = 2$ في كل من الحقلين الآتين :

أ) $(ح ، + ، \times)$.

ب) $(ص_3 ، \oplus ، \odot)$.

الحل :

أ) المعادلة $(س \circ 2) * 1 = 2$ تكافئ المعادلة $2 = 1 + س$ في الحقل $(ح ، + ، \times)$ ، وبحسب

الخاصية (٢) يكون المعادلة حل وحيد هو : $س = 2^{-1} = (1 - 2)^{-1} = (1 - 1)^{-1} = 1^{-1} = \frac{1}{1-2} = \frac{1}{-1} = -1$

أي أن $س = -1$.

ب) المعادلة المعطاة تكافئ المعادلة $س \odot 2 = 1 \oplus 2$ في الحقل $(ص_3 ، \oplus ، \odot)$ ، وبحسب الخاصية (٢)

يكون للمعادلة حل وحيد هو :

$س = 2^{-1} \odot (1 \oplus 2)$ [لأن $2 = 1$ في $(ص_3 ، \oplus)$]

$س = 2^{-1} \odot (2 \oplus 2) = 2^{-1} \odot 1$ (لماذا ؟)

$س = 2 \odot 1$ [لأن 2 نظير نفسه في $(ص_3 ، \odot)$]

$س = 2$

أي أن $س = 2$.

تمارين ومسائل (١-٣)

[١] بيّن مع التعليل صواب أو خطأ كلٍّ من العبارات الآتية :

أ) كل حقل هو حلقة تامة . ب) كل حلقة تامة هي حقل .

ج) إذا كان النظام $(س ، * ، \circ)$ حقلاً ، فإنه يكون لكل عنصر في النظام $(س ، * ، \circ)$ نظير .

د) إذا كان النظام $(س ، * ، \circ)$ حلقة تبديلية واحدة فإن هذا النظام يكون حقلاً إذا كان لكل عنصر غير

صفرى فيه نظير ضربى .

[٢] ليكن (ص، ، ⊕ ، ⊙) حلقة واحدة عنصرها المحايد هو (١) :

أ (أثبت أن (ص، ، ⊕ ، ⊙) حقلاً .

ب (حل المعادلة ٣ ⊙ س ⊕ ١ = ٤ في هذا الحقل .

[٣] ليكن (ح ، * ، ×) حقلاً ، حيث × عملية الضرب ، والعملية * معرفة على ح كما يلي :

$$١ * ب = ١ + ب + ٢ ، ١ \nabla ب ، ب \in ح .$$

أ (عين العنصر المحايد بالنسبة للعملية * .

ب (عين صيغة لإيجاد نظير العنصر بالنسبة للعملية * .

ج (حل المعادلة (٣ × س) * ٤ = ٨ في هذا الحقل .

[٤] في الحقل (س ، * ، ⊙) ، أثبت أن للمعادلة س^٢ = س حلين ، هما العنصر المحايد بالنسبة للعملية *

والعنصر المحايد بالنسبة للعملية ⊙ . (حيث س^٢ = س ⊙ س) .

[٥] أعط مثلاً لكل من :

أ (حلقة تبديلية وليست تامة .

ب (حلقة تامة لكنها ليست حقلاً .

حقل الأعداد الحقيقية

١ : ٤

بعد أن تعرّف الحقل وبعض خصائصه الأساسية ، ستعرّف في هذا البند حقل الأعداد الحقيقية

(ح ، + ، ×)

حيث :

+ هي عملية الجمع على الأعداد .

× هي عملية الضرب على الأعداد

٠ هو العنصر المحايد الجمعي .

١ هو العنصر المحايد الضربي .

١- النظير الجمعي للعنصر ١ .

١٢ النظير الضربي للعنصر غير الصفري ١ .

ط ⊃ ص ⊃ ∅ ح .

فإن الحقل (ح ، + ، ×) يحوي كلاً من الأنظمة العددية التالية (ط ، + ، ×) ، (ص ، + ، ×) ،

(∅ ، + ، ×) .

ويتمتع حقل الأعداد الحقيقية (ح ، + ، ×) بكافة خواص الحقل التي تعرّفها بالإضافة إلى ذلك فإن حقل

الأعداد الحقيقية يتمتع بخواص خاصة قد لا تتحقق لحقل آخر بوجه عام ، وأهم تلك الخواص ما يلي :

■ ١ حقل الأعداد الحقيقية حقل مرتب . أي أنه إذا كان a, b ، $b \supseteq a$ ، فإن العلاقة $\supseteq$ المعرفة على H تتميز بالآتي :

$$٠. \quad a \supseteq a \quad \text{أي أن} \supseteq \text{علاقة انعكاسية}$$

$$٠. \quad (a \supseteq b \wedge b \supseteq a) \iff a = b \quad . \quad \text{أي أن} \supseteq \text{علاقة تخالفية} .$$

$$٠. \quad (a \supseteq b \wedge b \supseteq c) \iff a \supseteq c \quad . \quad \text{أي أن} \supseteq \text{علاقة متعدية} .$$

وتسمى العلاقة $\supseteq$ علاقة ترتيب .

لذلك نقول أن الحقل $(H, +, \cdot, X)$ حقل مرتب .

الخواص الآتية تنتج مباشرة من كون حقل الأعداد الحقيقية حقلاً مرتباً .

■ ٢ العلاقة $\supseteq$ علاقة ترتيب كلي على H . أي أن : $a \supseteq b$ ، $b \supseteq a$: أو $a \leq b$.

■ ٣ $a \supseteq b$ ، $b \supseteq c$: $a \supseteq c$ $\iff a + c \geq b + c$.

■ ٤ $a \supseteq b$ ، $b \supseteq c$: $a \supseteq c$ $\iff (a < 0 \wedge c < 0)$ $\iff a \geq c$.

■ ٥ $a \supseteq b$ ، $b \supseteq c$: $a \supseteq c$ $\iff (a > 0 \wedge c > 0)$ $\iff a \leq c$.

مثال (١-١٣)

أوجد مجموعة حل المتراجحة : $\frac{s^3 - 2}{4} \geq 0$ ، لكل $s \in H$.

الحل :

$$\frac{s^3 - 2}{4} \geq 0 \iff s^3 - 2 \geq 0 \quad (\text{خاصية ٤})$$

$$\iff s^3 \geq 2 \quad (\text{خاصية ٣})$$

$$\iff s \geq \sqrt[3]{2} \quad (\text{خاصية ٥})$$

∴ مجموعة الحل = $\{s : s \in H \wedge s \geq \sqrt[3]{2}\}$.

■ ٦ $a \supseteq b$ ، $b \supseteq c$: $a \supseteq c$ $\iff a \geq c$.

، $a \supseteq b$ ، $b \supseteq c$: $a \supseteq c$ $\iff a \leq c$.

البرهان :

$$(a \supseteq b \wedge b \supseteq c) \iff a \geq c \quad (\text{خاصية ٤})$$

$$(a \supseteq b \wedge b \supseteq c) \iff a \leq c \quad (\text{خاصية ٤})$$

$$(a \geq c) \wedge (a \leq c) \iff a = c$$

بهذا نكون قد برهننا أن :

$$a \supseteq b \iff a \geq b$$

تدريب (١ - ٩)

باستخدام الفكرة السابقة نفسها ، برهن أن :

$$٧ \text{ ، } ١ \geq b \Rightarrow \text{ح} : ١ \geq b \iff ٢ \leq ١ \text{ ب} .$$

$$٧ \text{ ■ } ١ \geq b \iff \frac{1}{b} \leq \frac{1}{١} \text{ ، لكل } ١ \text{ ، ب موجبان معاً أو سالبان معاً} .$$

$$١ \geq b \iff \frac{1}{b} \geq \frac{1}{١} \text{ ، إذا كانت } ١ \text{ ، ب مختلفتين الإشارة} .$$

مثال (١ - ١٤)

أوجد مجموعة حل المتراجحة الآتية، ومثل الحل على خط الأعداد : $\frac{4}{3+s} > ٢$ ، $s \neq ٣-$.

الحل :

إن الشرط $s \neq ٣-$ يقتضي أن $s < ٣-$ ، أو $s > ٣-$ وبالتالي سنحل المتراجحة المعطاة في الفترة $s < ٣-$ ، والفترة $s > ٣-$ كل على حدة ، وتكون مجموعة الحل هي اتحاد مجموعة الحل في الفترتين . أولاً - في الفترة $s < ٣-$ يكون $s + ٣ < ٠$ وبالتالي :

$$\frac{4}{3+s} > ٢ \iff \frac{4}{3+s} < \frac{3+s}{4} \quad (\text{خاصية ٧})$$

$$\iff ٢ < ٣+s$$

$$\iff s < ١-$$

فتكون مجموعة الحل في هذه الفترة $=] ١- , ٣- [$ ، $] \infty , ٣- [$ ،

$$] \infty , ١- [= \text{ (١) } \text{—————}$$

ثانياً - في الفترة $s > ٣-$ يكون $s + ٣ > ٠$ ، وبالتالي

$$\frac{4}{3+s} > ٢ \iff \frac{4}{3+s} > \frac{3+s}{4}$$

$$\iff ٢ > ٣+s$$


$$\iff s > ١-$$

وتكون مجموعة الحل في هذه الفترة $=] ١- , \infty [$ ، $] ٣- , \infty [$ ، $] ٣- , \infty [$ ،

$$] ٣- , \infty [= \text{ (٢) } \text{—————}$$

من (١) ، (٢) نستنتج أن مجموعة الحل للمتراجحة المعطاة $=] ١- , \infty [\cup] ٣- , \infty [$ ، $] \infty , ١- [$

ويمكن تمثيل مجموعة الحل على خط الأعداد على النحو التالي :



تمارين ومسائل (١ - ٤)

[١] بفرض أن: س، ص، ع $\Rightarrow$ ح . بيّن صواب، أو خطأ العبارات التالية :

أ (س = ص $\iff$ س ع = ص ع .

ب (س > ص $\iff$ ع س > ع ص .

ج (ص $\neq$ ٠ $\iff$ ص ^٢ < ٠ .

د ($\frac{٢}{س} < ١ \iff$ س > ٢ .

[٢] استخدم خواص حقل الأعداد الحقيقية لحل المتراجحات التالية في ح :

أ (س + ٣ > ٤

ب (٦س < ١٢

ج ($\frac{س}{٢-} \leq ٧$

د ($١- \leq ٤ + \frac{س-}{٥}$

هـ (٥س - ٦س ≤ ٦ - ٦

و (٧ - س ≥ ٣

ز ($\frac{س}{٥} > ٣$

ح ($\frac{١}{س-٣} > ٤$ ، س $\neq$ ٣ .

[٣] أوجد مجموعة الحل لكلٍّ من أزواج المتراجحات الآتية في ح ، ومثّل الحل على خط الأعداد :

أ (٢س > ٩ أو ٣س ≤ ٨

ب (٤س < ٢- أو ٥ < ٢ + س

ج ($\frac{س}{٢} + ١ \geq ٧$ أو س - ١١ < ٧

د (٢س - ٢ > ٣ أو $\frac{٣س}{٢} + ١ < ٢$

هـ (٦س - ١ ≤ ٢ أو ٢س + $\frac{١}{٢} > \frac{١}{٢}$.

الدوال الحقيقية

٢ : ١

مراجعة (أنواع التطبيقات ، والتطبيق العكسي) :

درست أن التطبيق $f: S \rightarrow T$ يعيّن لكل $s \in S$ عنصراً وحيداً $f(s) \in T$. تسمى f صورة العنصر s ، وفق التطبيق f ، والتي يرمز لها بالرمز $f(s)$.
ويلاحظ أن التطبيق يتعين بثلاثة مكونات هي المجال ، المجال المقابل وقاعدة التطبيق ، كما أنه يمثل بأزواج مرتبة أو جدولياً أو بمخططات سهمية أو بيانية .

الدالة الحقيقية:

تذكر بعض أنواع التطبيقات :

ليكن التطبيق $f: S \rightarrow T$:

- ١ - إذا كان كل عنصر من عناصر المجال المقابل هو صورة لعنصر واحد على الأقل من عناصر المجال فإن التطبيق يسمى تطبيقاً غامراً ، أي $\forall s \in S \exists f(s) \in T$ بحيث $f(s) \in T$.
- ٢ - إذا كان كل عنصر من عناصر المجال المقابل هو صورة لعنصر واحد على الأكثر من عناصر المجال ، يسمى التطبيق تطبيقاً متبايناً ، أي إذا كان $f(s_1) = f(s_2)$ لكل $s_1, s_2 \in S$ فإن $s_1 = s_2$ أو إذا كان $s_1 \neq s_2$ $f(s_1) \neq f(s_2)$.
- ٣ - إذا كان التطبيق غامراً ومتبايناً في آن واحد ، فإنه يسمى تقابلاً .
- ٤ - يكون للتطبيق $f: S \rightarrow T$ تطبيق عكسي $f^{-1}: T \rightarrow S$ إذا كان f تقابلاً .

مثال (٢ - ١)

ليكن $f: S \rightarrow T$ ح $\Leftarrow$ ح تطبيقاً معرفاً بالقاعدة : $f(s) = 2s - 7$ أثبت أن للتطبيق f تطبيقاً عكسياً f^{-1} ، ثم أوجد قاعدته .

الحل : نثبت أولاً أن f تقابل .

■ لإثبات أن f متباين :

$$\begin{aligned} \text{نفرض أن } f(s_1) &= f(s_2) \Leftrightarrow 2s_1 - 7 = 2s_2 - 7 \\ &\Leftrightarrow 2s_1 = 2s_2 \\ &\Leftrightarrow s_1 = s_2 \\ \therefore f(s_1) &= f(s_2) \Leftrightarrow s_1 = s_2 \text{ ، فالتطبيق متباين .} \end{aligned}$$

■ ٢ لإثبات أن ت غامر : نحل المعادلة $ص = ٢س - ٧$ ، وإيجاد $س$ بدلالة $ص$.

$$ص = ٢س - ٧ \iff ٧ + ص = ٢س \iff س = \frac{٧ + ص}{٢} .$$

واضح أن المعادلة $س = \frac{٧ + ص}{٢}$ لها حل في مجموعة الأعداد الحقيقية $ص \in \mathbb{V}$.
 ∴ ت غامر .

وبما أن ت متباين ، وغامر فهو تقابل .

$$\text{إذن له تطبيق عكسي } ت^{-١} ، وقاعدته : ت^{-١}(س) = \frac{٧ + س}{٢} .$$

التطبيق ت : $س \longleftarrow ص$ مجاله $س$ ومجاله المقابل $ص$ وعندما تكون $س \in \mathcal{H}$ ، $ص \in \mathcal{H}$ حيث $\mathcal{H}$ مجموعة الأعداد الحقيقية يسمّى هذا التطبيق **دالة حقيقية** وإينما وردت كلمة دالة نقصد بها دالة حقيقية ، ويرمز لها بأحد الحروف ت ، د ، م ، هـ ، ... وهكذا .

تعريف (٢-١)

الدالة الحقيقية هي تطبيق مجاله ومجاله المقابل مجموعتين جزئيتين من مجموعة الأعداد الحقيقية .

فمثلاً : ت(س) = س + ١ ، حيث ت : $\mathcal{H} \longleftarrow \mathcal{H}$ ، دالة حقيقية .

د(س) = س^٢ ، حيث د : $\mathcal{H} \longleftarrow \mathcal{H}^+$ ، دالة حقيقية .

ه(س) = س^٢ - س - ٦ ، حيث هـ : $\mathcal{H} \longleftarrow [-٢ ، ٢]$ ، دالة حقيقية .

أما التطبيق م : $\{١ ، ب ، ج\} \longleftarrow \mathcal{H}$ ، حيث ١ ، ب ، ج حروف هجائية ، ليست دالة حقيقية لأن مجاله $\{١ ، ب ، ج\} \not\subset \mathcal{H}$.

ملحوظة : كثيراً ما يهمل ذكر المجال والمجال المقابل في الدالة الحقيقية ونكتفي بذكر قاعدتها .

مجموعة تعريف الدالة ومداهما :

التطبيق الذي قاعدته ت(س) = س + ١ ، ب $\mathbb{V}$ ، ب $\in \mathcal{H}$ هو دالة $\mathcal{H} \longleftarrow \mathcal{H}$ ؛ لأننا نحصل على صورة العنصر س بضربه في العدد ١ أولاً ، ثم نضيف الناتج إلى العدد ب . ويلاحظ أنه يمكن إجراء عمليتي الضرب والجمع الداخلتين في قاعدة هذه الدالة لكل $س \in \mathcal{H}$ ، لذا يكون مجال هذه الدالة مجموعة الأعداد الحقيقية كلها ، وهذا ما يسمي مجموعة تعريف هذه الدالة .

تعريف (٢-٢)

مجموعة تعريف الدالة هي أوسع مجموعة جزئية من $\mathcal{H}$ تحقق عناصرها العمليات الداخلة في تركيب قاعدة هذه الدالة .

بناءً على التعريف السابق لمجموعة التعريف؛ فإنها تكون هي مجال الدالة الحقيقية ، أما مدى الدالة هو مجموعة صور عناصر مجموعة التعريف .

تعريف (٢ - ٣)

مدى الدالة هو مجموعة صور عناصر مجموعة التعريف التي تنتمي إلى المجال المقابل .
أي مدى الدالة = $\{ص \mid ص \in د(س) : ص = د(س) \forall س \in س\}$

مثال (٢ - ٢)

أوجد مجموعة تعريف كل من :

$$أ) د(س) = س^3 + ٥ ، ب) ه(س) = \frac{س + ٢}{س^2 - ٩} .$$

الحل :

أ) مجموعة تعريف الدالة $د(س) = س^3 + ٥$ هي مجموعة قيم $س$ الحقيقية التي تجعل $س^3 + ٥$ عدداً حقيقياً .
∴ مجموعة تعريف الدالة (م . ت) = ح

مجموعة تعريف أي دالة حدودية هي ح .

$$ب) ه(س) = \frac{س + ٢}{س^2 - ٩} .$$

هذه الدالة هكسرية، وهنا لا يمكن إجراء العمليات الداخلة في تركيب هذه القاعدة عندما يكون المقام يساوي صفراً ، حيث إن القسمة على صفر غير معرّفة في مجموعة الأعداد الحقيقية (ح) ؛ لذا يكون مجموعة تعريفها ح ماعداً مجموعة أصفار المقام . ولإيجاد أصفار المقام .

$$\begin{aligned} \text{نفرض المقام } ٠ &= س^2 - ٩ \iff ٠ = (س - ٣)(س + ٣) \\ \text{أما } ٠ &= س - ٣ \iff س = ٣ \quad \text{أو} \quad ٠ = س + ٣ \iff س = -٣ \end{aligned}$$

∴ م . ت = ح / $\{٣ ، -٣\}$.

وبشكل عام مجموعة تعريف الدالة الكسرية هي ح / $\{أصفار المقام\}$.

مثال (٢ - ٣)

أوجد مجموعة تعريف الدوال التالية :


$$أ) د(س) = \sqrt{س^2 + ٣س - ١٠} .$$

$$ب) ه(س) = \left\{ \begin{array}{l} س + ٤ ، س > ٠ \\ س - ١ ، س < ٠ \end{array} \right.$$

الحل :

أ (د(س) = $\sqrt{s^2 + 3s - 10}$ يكتب تحت المقام (١) مجموعة تعريف الدالة الجذرية هي كل الأعداد الحقيقية التي تجعل ما تحت الجذر عدداً موجباً.

$$\begin{aligned} \therefore s^2 + 3s - 10 \geq 0 & \iff (s-2)(s+5) \geq 0 \\ \text{عندما } (s-2)(s+5) = 0 & \iff s=2 \text{ أو } s=-5 \\ \text{ويمكن تمثيل ذلك على خط الأعداد كما في الشكل (١-٢)} \end{aligned}$$



لتحديد إشارة المقدار (س-٢)(س+٥) = ٠

∞ -	-5	2	∞
-	-	+	+
-	+	+	+
+	-	+	+

إشارة (س-٢) إشارة (س+٥) إشارة [(س-٢)(س+٥)]

يلاحظ أن معامل س^٢ موجب فإشارة المقدار تكون سالبة في الفترة [-٥ ، ٢] أي ما بين الجذرين
 $\therefore s^2 + 3s - 10 \geq 0$ لكل $s \in \mathbb{R} \setminus]-5, 2[$
 م . ت = $]-\infty, -5[\cup]2, \infty[$ / ح = $]-5, 2[$

∴ مجموعة تعريف الدالة الجذرية هي كل الأعداد الحقيقية التي تجعل ما تحت الجذر عدداً موجباً.

وتلاحظ إنه إذا كانت الدالة من الدرجة الثانية ولها جذران مختلفان فلتحديد إشارتها نميز حالتين :

١ - معامل س^٢ موجب فالدالة موجبة خارج الجذرين .

٢ - معامل س^٢ سالب فالدالة موجبة بين الجذرين .

$$\text{ب) هـ(س) = } \begin{cases} s+4, & s > 0 \\ s-1, & s < 0 \end{cases}$$

يلاحظ أن هذه الدالة معرّفة بأكثر من قاعدة :

الأولى س + ٤ عند س > ٠ ،

والثانية س - ١ عندما س < ٠

ولكن غير معرفة عند س = ٠ .

إذن م . ت الدالة هـ = ح / { ٠ } .

تدريب (٢ - ١)

أوجد مجموعة تعريف الدالة $\sqrt{3s^2 + 2s - 2}$

مثال (٢ - ٤)

أوجد مجموعة تعريف الدالتين التاليتين:

$$\text{أ (د (س) = } \sqrt{\frac{s}{5 - 4s}} \quad , \quad \text{ب (د (س) = } \sqrt{\frac{s}{15 - 2s - 2s^2}}$$

الحل :

$$\text{أ (د (س) = } \sqrt{\frac{s}{5 - 4s}} \quad \text{الدالة كسرية.}$$

يلاحظ أن دالة البسط هي كثيرة حدود، ∴ م . ت البسط = ح .

المقام دالة جذرية مجموعة تعريفها ما تحت الجذر $0 \leq$ أي أن:

$$0 \leq 5 - 4s \iff 0 \leq s \leq \frac{5}{4} \quad \text{∴ م . ت المقام} =]\infty, \frac{5}{4}]$$

ولكي تكون الدالة الكسرية معرفة يجب أن يكون المقام $\neq 0$

$$\text{لذلك نضع } \sqrt{5 - 4s} = 0 \iff 5 - 4s = 0 \iff s = \frac{5}{4} \iff s = \frac{5}{4}$$

$$\text{∴ م . ت الدالة الكسرية} = \text{م . ت البسط} \cap \text{م . ت المقام} / \{\text{أصفار المقام}\}$$

$$=]\infty, \frac{5}{4}] \cap]\infty, \frac{5}{4}] = \{ \frac{5}{4} \} /]\infty, \frac{5}{4}]$$

$$\text{ب (د (س) = } \sqrt{\frac{s}{15 - 2s - 2s^2}}$$

يلاحظ أن البسط دالة جذرية مجموعة تعريفها $]0, \infty]$ والمقام دالة كثيرة حدود مجموعة تعريفها ح .ولإيجاد أصفار المقام نضع $15 - 2s - 2s^2 = 0$.

$$\iff (s + 3)(s - 5) = 0 \iff s = -3 \text{ أو } s = 5$$

مجموعة تعريف د

$$= (\text{مجموعة تعريف البسط} \cap \text{مجموعة تعريف المقام}) / \{\text{أصفار المقام}\} .$$

$$=]0, \infty[\cap]\infty, 5[/ \{5, -3\} .$$

$$=]0, \infty[\setminus \{-3\} \text{ حيث }]\infty, 5[\neq \{5\}$$

مثال (٢-٥)

أوجد مجموعة تعريف الدالة التالية :

$$D(s) = \frac{1}{\sqrt{2s-1}} - \sqrt{1-s^2}.$$

الحل :

$$D(s) = \frac{1}{\sqrt{2s-1}} - \sqrt{1-s^2}.$$

نعتبر د فرق دالتين : الأولى $\frac{1}{\sqrt{2s-1}}$ مجموعة تعريفها $[\frac{1}{2}, \infty)$

والثانية $\sqrt{1-s^2}$ مجموعة تعريفها $[-1, 1]$

إذن $M \cap D = (M \cap \text{الأولى}) \cap (M \cap \text{الثانية})$

$$[\frac{1}{2}, \infty) \cap [-1, 1] = [\frac{1}{2}, 1]$$

تعريف (٢-٤)

مدى الدالة هو مجموع صور عناصر مجموعة التعريف «المجال»، وهو مجموعة جزئية من المجال المقابل.

ولإيجاد مدى الدالة نتبع طريقة إيجاد الصورة العكسية (أي إيجاد s بدلالة v).

مثال (٢-٦)

أوجد مدى الدوال التالية :

$$أ) D(s) = 2s - 5 \quad ؛ \quad ب) D(s) = \frac{s+1}{s-2} \quad ؛ \quad ج) D(s) = s^2 - 3.$$

الحل :

أ) $D(s) = 2s - 5$ ، مجموعة تعريفها $\mathbb{R}$.

$$نضع $v = 2s - 5 \iff s = \frac{v+5}{2}$.$$

يلاحظ $\forall v \in \mathbb{R} \exists s = \frac{v+5}{2}$ يمكن إيجاد قيمة s .

$\therefore$ المدى $= \mathbb{R}$.

ب (د(س) = $\frac{1+s}{2-s}$ مجموعة تعريفها ح / { ٢ } .

$$\text{نضع } \frac{1+s}{2-s} = \text{ص} .$$

$$\Leftarrow \text{ص} (س - ٢) = ١ + \text{ص} \quad \dots \text{لماذا؟}$$

$$\Leftarrow \text{ص} - \text{ص} ٢ = ١ + \text{ص}$$

$$\Leftarrow \text{ص} - \text{ص} = ١ + \text{ص} ٢$$

$$\Leftarrow \text{ص} (١ - \text{ص}) = ١ + \text{ص} ٢$$

$$\Leftarrow \text{ص} = \frac{١ + \text{ص} ٢}{١ - \text{ص}} .$$

يلاحظ أنه يمكن إيجاد قيم ص المرتبطة بكل قيمة لـ س $\in$ ح / { ٢ } ، وهي التي يمكن إجراء العمليات الداخلية في هذه العلاقة ماعدا عند ص = ١ .

∴ المدى = ح / { ١ } .

جـ (د(س) = $\frac{٣-s^2}{٣}$ ، مجموعة تعريفها ح .

$$\text{نضع } \frac{٣-s^2}{٣} = \text{ص} \Leftarrow \text{ص} ٣ = ٣ - \text{ص} ٣$$

$$\Leftarrow \text{ص} = \frac{٣ - \text{ص} ٣}{٣}$$

$$\therefore \text{ص} ٣ + \text{ص} ٣ \leq ٣ \Leftarrow \text{ص} \leq ٣ -$$

∴ المدى = $[-٣, \infty]$.

مثال (٢ - ٧)

أوجد مدى الدوال التالية :

$$\text{أ (د(س) = } \frac{س}{٢ + \text{ص} ٢} \quad , \quad \text{ب (د(س) = } \sqrt{٣ - \text{ص} ٢ - \text{ص} ٣}$$

الحل :

$$\text{أ (د(س) = } \frac{س}{٢ + \text{ص} ٢} \quad , \quad \text{مجموعة تعريفها ح .}$$

$$\text{ص} = \frac{س}{٢ + \text{ص} ٢} \Leftarrow \text{ص} (٢ + \text{ص} ٢) = س$$

$$\Leftarrow \text{ص} ٢ - \text{ص} ٢ + ٢ = ٠ .$$

يلاحظ أن في هذه الدالة يتعذر جعل s بدلالة v ، لإيجاد المدى نكوّن المعادلة من الدرجة الثانية ذات متغير واحد ولكي يكون لهذه المعادلة حل في $\mathbb{R}$ يجب أن نستخدم طريقة المميز فيكون المميز $(\Delta) = b^2 - 4ac \geq 0$.
لذا نبحث عن قيم v التي من أجلها يمكن إيجاد قيم s .

$$\text{من المعادلة } v^2 - s^2 + 2s - 3 = 0 .$$

$$1 = v^2 , \quad b = -1 , \quad c = 2 - 3 = -1 .$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1 - 4(-1) = 5$$

$$= (1 - 2)(-1) = 1$$

$$. \quad 1 - 2v^2 = 0$$

$$\text{وبما أن } \Delta = 5 \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 1 - 2v^2 \geq 0$$

$$. \quad 1 \geq 2v^2 \Leftrightarrow$$

$$. \quad \frac{1}{2} \geq v^2 \Leftrightarrow$$

$$. \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \geq |v| \Leftrightarrow$$

$$. \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \geq v \geq \frac{-1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow$$

$$. \quad \text{المدى} = \left[\frac{-1}{\sqrt{2}} , \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$$

$$(b) \quad D(s) = \sqrt{s^2 - 2s + 3} \quad \text{مجموعة تعريفها } [-3, 1] ,$$

$$\text{نضع } v = \sqrt{s^2 - 2s + 3} , \text{ وبالتالي يكون } v \geq 0$$

$$\Leftrightarrow v^2 = s^2 - 2s + 3 \Leftrightarrow s^2 - 2s + 3 - v^2 = 0$$

$$. \quad 1 = v^2 , \quad b = -2 , \quad c = 3 - v^2$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 4(3 - v^2) = 4v^2 - 8$$

$$= 4v^2 - 8 + 4 = 4v^2 - 4$$

$$. \quad 4v^2 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow v^2 \geq 1$$

$$\Delta = 4v^2 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow v^2 \geq 1$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq v^2$$

$$\Leftrightarrow v \geq 1$$

$$\Leftrightarrow |v| \geq 1$$

$$\Leftrightarrow v \geq 1 \text{ أو } v \leq -1$$

$$\therefore \text{المدى} = [-1, 1]$$

مثال (٢ - ٨)

أوجد مدى الدوال التالية :

أ (د(س) = $\sqrt{2-s}$ ،

ب (د(س) = $\frac{s^2}{1+s^2}$.

ج(د(س) = $s^2 + s^4 + 3$.

الحل :

أ (د(س) = $\sqrt{2-s}$

∴ م . ت د(س) = $[-2, \infty)$

لإيجاد المدى يمكن بناء الدالة حسب مجموعة تعريفها.

أي $s \leq 2$

$0 \leq \sqrt{2-s} \iff 0 \leq 2-s$

$0 \leq s \iff 0 \leq s$

$0 \leq s^2 \iff 0 \leq s^2$

∴ المدى = $[0, \infty)$

ب (د(س) = $\frac{s^2}{1+s^2}$ م . ت = ح (لماذا؟)

نقوم بالقسمة المطوّلة ، لأن درجة البسط = درجة المقام

د(س) = $1 - \frac{1}{1+s^2}$.

ومن مجموعة التعريف يتم البناء كما يلي :

لماذا؟ $-\infty < s < \infty$

$0 \leq s^2 < \infty$

$1 \leq 1+s^2 < \infty$ (إضافة ١ إلى أطراف المتراجحة) .

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 \hline
 1+s^2 \overline{) s^2} \\
 \underline{s^2 +} \\
 1 -
 \end{array}$$

$$\left[0 = \frac{1}{\infty} \right] \quad \frac{1}{\infty} < \frac{1}{1+s^2} \leq \frac{1}{1}$$

$$0 < \frac{1}{1+s^2} \leq 1$$

$$\left[\text{بالضرب في } 1 - \right] \quad 0 > \frac{1-s}{1+s^2} \geq 1-s$$

$$\left[\text{بإضافة } 1 \text{ إلى أطراف المتراجحة} \right] \quad 1 > \frac{1}{1+s^2} - 1 \geq 1-s$$

$$1 > 0 \Leftarrow$$

$$\text{المدى} = [0, 1]$$

(ج) د(س) = $s^2 + s^4 + s^3$ م . ت د = ح ، ولإيجاد المدى تستخدم طريقة المميز.

$$0 = s^2 + s^4 + s^3 \Leftarrow s^2 + s^4 + s^3 = 0$$

$$1 = 1, \quad 4 = 4, \quad 3 = 3 \Rightarrow s^2 + s^4 + s^3 = 0$$

$$\Delta = 16 - 4(3 - s) = 0$$

$$0 \leq s^2 + 4 \Leftarrow$$

$$0 \leq s + 1 \Leftarrow$$

$$1 - s \Leftarrow$$

$$\text{المدى} = [1 - \infty, \infty]$$

مثال (٢ - ٩)

أوجد مجموعة تعريف ومدى الدالة التالية :

$$f(s) = \sqrt{s^2 - 9}$$

$$\left. \begin{array}{l} s^2 > 0, \\ s \geq 0, \\ s < 1 \end{array} \right\} = f(s)$$

الحل :

$$f(s) = \sqrt{s^2 - 9} \quad \text{لإيجاد م . ت للدالة د(س) = } \sqrt{s^2 - 9}$$

$$\text{بما أن } s^2 - 9 \geq 0 \Leftarrow s^2 - 9 \leq -9$$

$$\Leftrightarrow s^2 \geq 9 \Leftrightarrow |s| \geq 3$$

$$\Leftrightarrow -3 \leq s \leq 3$$

$$\therefore \text{م. ت} = [-3, 3]$$

ولإيجاد المدى نبني الدالة من مجموعة التعريف حيث

$$-3 \leq s \leq 3 \Leftrightarrow 0 \leq s^2 \leq 9$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq -s^2 \leq -9 \quad (\text{بالضرب في } -1)$$

$$9 \leq -s^2 \leq 0 \quad (\text{إضافة } 9)$$

$$3 \geq \sqrt{-s^2 - 9} \geq 0$$

$$\therefore \text{المدى} = [0, 3] \quad 0 \leq v \leq 3$$

$$\left. \begin{array}{l} s^2 > 0, \\ 0 \leq s \leq 1, \\ s < 1, \end{array} \right\} = \text{د(س)} = \left. \begin{array}{l} s^2 \\ s \\ \frac{1}{s} \end{array} \right\}$$

$$\text{م. ت} = \text{د(س)} = \infty$$

$$0 < s^2 = v < \infty \Leftrightarrow 0 < v < \infty \Leftrightarrow v \in]0, \infty[$$

$$0 \leq s \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq v \leq 1 \Leftrightarrow v \in [0, 1]$$

$$s < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{s} = v > 1 \Leftrightarrow v \in]1, \infty[$$

$$\therefore \text{المدى} = [0, \infty[= [0, 1] \cup]1, \infty[$$

تمارين ومسائل (٢-١)

أولاً - أوجد مجموعة تعريف كل من الدوال التالية :

$$[1] \text{ د(س)} = 2s^2 + 5s - 2$$

$$[2] \text{ د(س)} = \frac{s+2}{s^2-81}$$

$$[3] \text{ د(س)} = \sqrt{1-2s}$$

$$[4] \text{ د(س)} = \sqrt{s^2-4}$$

$$[5] \text{ د(س)} = \frac{1}{\sqrt{s^2-2s+6}}$$

$$[6] \text{ د(س)} = \frac{s}{\sqrt{1-2s^2}}$$

$$[7] \text{ د(س)} = \frac{s}{s^2-2s+6}$$

$$[8] \text{ د(س)} = \sqrt{\frac{11}{s+2}}$$

$$\cdot \frac{1-s^2}{1-s} = (s) \text{ د } [10]$$

$$\cdot \frac{\sqrt{2+s}}{5-s} = (s) \text{ د } [12]$$

$$1 - \sqrt{3-s} = (s) \text{ د } [14]$$

$$\cdot \sqrt{1-s} + \sqrt{s} = (s) \text{ د } [9]$$

$$\cdot \frac{5}{\sqrt{1-s}-3} = (s) \text{ د } [11]$$

$$\cdot \sqrt{2-s} \sqrt{s} = (s) \text{ د } [13]$$

$$\cdot 3 = (s) \text{ د } [15]$$

$$\cdot \left. \begin{array}{l} s \leq 1 \\ s > 2 \end{array} \right\} = (s) \text{ د } [16]$$

$$\cdot \left. \begin{array}{l} s \leq 2 \\ s > 1 \end{array} \right\} = (s) \text{ د } [17]$$

[18] إذا كانت $t = s^2 + 1$ ، $h = s^2 - 16$ عيّن مجموعة تعريف كل من :

$$\cdot \begin{array}{l} \text{أ) } \frac{h(s)}{t(s)} \\ \text{ب) } \frac{\sqrt{h(s)}}{\sqrt{t(s)}} \\ \text{هـ) } \sqrt{\frac{t(s)}{h(s)}} \end{array}$$

ثانياً - أوجد مجموعة تعريف ومدى الدوال التالية :

$$\cdot \frac{5}{s^2+4} = (s) \text{ د } [20]$$

$$\cdot |9+s| = (s) \text{ د } [22]$$

$$\cdot \sqrt{5-s^2} = (s) \text{ د } [24]$$

$$\cdot 7 + \sqrt{s-1} = (s) \text{ د } [26]$$

$$\cdot \sqrt{4+s^2+4} = (s) \text{ د } [28]$$

$$\cdot \frac{s}{1-s^2} = (s) \text{ د } [30]$$

$$\cdot \frac{5+s^2}{6+s} = (s) \text{ د } [32]$$

$$\cdot 9+s^2 = (s) \text{ د } [34]$$

$$\cdot \frac{s}{1-s} = (s) \text{ د } [19]$$

$$\cdot \sqrt{2-s^2-64} = (s) \text{ د } [21]$$

$$\cdot \frac{1}{2+s} = (s) \text{ د } [23]$$

$$\cdot 5 + s^2 - 6 + s = (s) \text{ د } [25]$$

$$\cdot 3 - s^2 + 2s = (s) \text{ د } [27]$$

$$\cdot \sqrt{3-s^2-2} = (s) \text{ د } [29]$$

$$\cdot \frac{1-s^2}{(2+s)(1-s)} = (s) \text{ د } [31]$$

$$\cdot \left. \begin{array}{l} s+1 \text{ عندما } s \leq 0 \\ s-2 \text{ عندما } s > 0 \end{array} \right\} = (s) \text{ د } [33]$$

$$\cdot 3 - s^2 = (s) \text{ د } [35]$$

بعض أنواع الدوال وتمثيلها


٢ : ٢

أولاً: دالة المقياس :

$$\left. \begin{array}{l} s \leq 0 \\ s \geq 0 \end{array} \right\} = |s|$$

تذكر أن $|s|$ هي القيمة المطلقة للعدد الحقيقي s ، $\sqrt{s^2} = |s|$ ،

تدريب (٢ - ٢)

أوجد $|101|$ ، $|\frac{2}{3}|$ ، $|-4|$.

شكل (٢ - ٢)

تعريف (٢ - ٥)

دالة المقياس $|s|$ تسمى d ،
 $\left. \begin{array}{l} s \leq 0 \\ s \geq 0 \end{array} \right\} = |s| = d(s)$ إذا كانت s إذا كانت s .

مثال (١٠ - ٢)

أعد تعريف الدالة : $d(s) = |s + 3|$ على فترات عديدة ؛ ثم مثلها بيانياً ، وحدد مجموعة تعريفها ومداهما .


الحل :

من تعريف دالة المقياس :

$$\left. \begin{array}{l} s + 3 \leq 0 \\ s + 3 \geq 0 \end{array} \right\} = |s + 3| = d(s)$$

$$\left. \begin{array}{l} s + 3 \leq -3 \\ s + 3 \geq -3 \end{array} \right\} = |s + 3| \Leftrightarrow$$

ولتمثيل هذه الدالة نكوّن جدولين: أحدهما للدالة $d(s) = s + 3$ عندما $s \leq -3$ والآخر للدالة $d(s) = -s - 3$ عندما $s \geq -3$ كما يلي :



$$س > 3 -$$

٦-	٥-	٤-	س
٣	٢	١	د(س)

$$س \leq 3 -$$

٠	١-	٢-	س
٣	٢	١	د(س)

يلاحظ أن مجموعة تعريفها ح .

$$٠ \leq |3 + س| = د(س)$$

$$\therefore ص \leq ٠$$

$$المدى =] ٠ , \infty]$$

وباستخدام طريقة البناء:

$$\infty > س > \infty -$$

$$\infty > 3 + س > \infty -$$

$$\infty > |3 + س| > ٠$$

$$\infty > ص > \infty -$$

مثال (٢-١١)

أعد تعريف الدوال التالية وعيّن مجموعة تعريفها ومدaha .

$$هـ(س) = 3 + |5 - س^2|$$

الحل:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{5}{2} \leq س , \quad 3 + (5 - س^2) \\ \frac{5}{2} > س , \quad 3 + (5 - س^2) - \end{array} \right\} = 3 + |5 - س^2| = هـ(س)$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{5}{2} \leq س , \quad 2 - س^2 \\ \frac{5}{2} > س , \quad 8 - س^2 \end{array} \right\} =$$

يلاحظ أن مجموعة التعريف هـ = ح

$$٠ \leq |5 - س^2| : \text{ لإيجاد المدى}$$

$$3 \leq 3 + |5 - س^2|$$

$$هـ(س) \leq 3$$

$$المدى =] 3 , \infty]$$

تدريب (٢ - ٣)

أعد تعريف الدالة $D(s) = |s^2 - 9|$ ، ثم أوجد مجموعة تعريفها ومداها.

مثال (١٢ - ٢)

أوجد مجموعة الحل للمعادلة الآتية :

$$|s^2 + 4s - 4| = 0$$

الحل :

$$\left. \begin{array}{l} s^2 + 4s - 4 \leq 0 \\ s^2 + 4s - 4 \geq 0 \end{array} \right\} \text{ بما أن } |s^2 + 4s - 4| = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} s^2 + 4s - 4 \leq 0 \\ s^2 + 4s - 4 \geq 0 \end{array} \right\} \text{ إذن } |s^2 + 4s - 4| = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} s^3 \leq 0 \\ s^3 \geq 0 \end{array} \right\} =$$

$$\text{عندما } s^3 = 0 \iff s = 0 \in]-\infty, 2[$$

$$\text{وعندما } s^3 = 8 \iff s = 2 \in [2, +\infty)$$

$$\therefore \text{ مجموعة الحل } = \{0, 2\}$$

ثانياً : دالة الصحيح :

تدريب (٢ - ٤)

لتكن $[s] = \text{جزء صحيح لـ } s$ حيث $s \geq 0$ ، فإن n هي أكبر عدد صحيح أصغر أو يساوي s .

أوجد $[4]$ ، $[2, 5]$ ، $[-5, 1]$. $[\frac{3}{2}]$ ؛ ماذا تلاحظ ؟

تلاحظ أنه إذا ارتبط $s \leftarrow [s]$ ، فإننا نحصل على دالة تسمى دالة صحيح s .

تعريف (٢-٦)

الدالة $D: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ، والتي قاعدتها $D(s) = [s]$ تسمى دالة الصحيح s ؛ حيث $[s]$ هو أكبر عدد صحيح أصغر من أو يساوي s .

وبصيغة أخرى :


إذا كان $s \in [n, n+1)$ ، حيث $n \in \mathbb{Z}$ ، فإن $D(s) = [s] = n$.

مثال (٢-١٣)

مثل بيانياً الدالة : $D(s) = [s]$.

الحل :

استناداً إلى تعريف دالة الصحيح $D(s) = [s]$ ، فإنه يمكن كتابتها على النحو التالي :



ملاحظات :

$$1. [s] \leq s < [s] + 1$$

$$2. [s + t] = [s] + [t] \quad \forall s, t \in \mathbb{R} \text{ ، } s \in \mathbb{Z} \text{ ، } t \in \mathbb{R} .$$

$$3. \text{ الدالة } D(s) = [s] \text{ ليست زوجية ولا فردية .}$$

$$4. \text{ على كل فترة } [n, n+1) \text{ ، من المجال } (ح) \text{ تكون الدالة ثابتة وتساوي } n .$$

مثال (٢ - ١٤)

اكتب الفترة العددية التي ينتمي إليها s في كل من :

$$\text{أ) } (s] =]6- \text{ ، } (b) [s + 7] = 7 \text{ ، } (ج) \frac{3}{4} = \frac{[s - 4]}{[s - 2]}$$

الحل :

$$\text{أ) من التعريف } [s] = 6- \iff 6- \geq s > 6- + 1$$

$$\iff 6- \geq s > 5-$$

$$\therefore s \in]5- , 6-]$$

$$\text{ب) } [s + 7] = 7 \iff 7 \geq s + 7 > 8$$

$$\iff 0 \geq s > -1$$

$$\therefore s \in]-1 , 0]$$

(ج)

$$\frac{3}{4} = \frac{[s - 4]}{[s - 2]} \iff \frac{3}{4} = \frac{[s - 4]}{[s - 2]}$$

$$4([s - 4]) = 3([s - 2])$$

$$4[s - 4] = 3[s - 2]$$

$$4[s - 16] = 3[s - 16]$$

$$10 = [s]$$

$$11 \geq s > 10$$

$$\therefore \text{مجموعة الحل} =]10 , 11]$$

مثال (٢ - ١٥)

أوجد مجموعة تعريف الدالة : $d(s) = \frac{s}{[s]}$.

الحل :

$d(s) = \frac{s}{[s]}$ دالة كسرية ولكي تكون معرفة $[s] \neq 0$ ، ولكي نجد أصفار المقام

$$\text{نضع } [s] = 0 \iff s \in]0 , 1]$$

$$\therefore \text{م . ت . للدالة } d(s) = \frac{s}{[s]} \text{ هي }]0 , 1]$$

بعض خواص الدوال وتمثيلها

تتنوع الدوال الحقيقية كثيراً وفقاً لبعض خواصها أو سماتها .. وفي هذا البند تتعرّف على بعض أنواع الدوال الهامة من خلال خواصها وكيفية تمثيلها في المستوى الديكارتي .

أولاً : الدوال الزوجية والفردية :

تدريب (٢ - ٥)

لتكن : (١) $D(s) = s^2 + 4$. أوجد : $D(1)$ ، $-D(1)$ ، $D(-1)$.
 (٢) $H(s) = s^3 + 3s$. أوجد : $H(3)$ ، $-H(3)$ ، $H(-3)$.
 ستلاحظ أن $D(1) = D(-1)$ ، ومثل هذه الدالة تسمى دالة زوجية ، وأن $H(3) = -H(-3)$ ، ومثل هذه الدالة تسمى دالة فردية .

تعريف (٢ - ٧)


لتكن D دالة معرفة على المجموعة $\mathbb{R}$ $\supset \mathbb{C}$:
 تسمى D دالة زوجية إذا كان $D(s) = D(-s)$ ، $\forall s \in \mathbb{R}$.
 وتسمى D دالة فردية إذا كان $D(s) = -D(-s)$ ، $\forall s \in \mathbb{R}$.

مثال (٢ - ١٦)

بيّن نوع الدوال التالية من حيث كونها زوجية أو فردية ثم
 مثّل كلّاً منها بيانياً ؛ ومن الرسم أوجد مجموعة تعريفها ومداها .
 أ) $D(s) = s^2 - 4$.
 ب) $D(s) = s^3$.
 ج) $D(s) = s^3 - s^2$.

الحل :

أ) $D(s) = s^2 - 4$ واستناداً للتعريف .
 $D(-s) = (-s)^2 - 4 = s^2 - 4 = D(s)$.



شكل (٦ - ٢)

$d(-s) = d(s)$ ، فالدالة زوجية

ولتمثيل هذه الدالة نكوّن الجدول التالي :

٣	٢	١	٠	١-	٢-	٣-	س
٥	٠	٣-	٤-	٣-	٠	٥	$d(s)$

ومن الرسم شكل (٦-٢) م . ت . ح =

والمدى $= [-4, \infty)$ ، والدالة الزوجية متماثلة

حول محور الصادات .

ب ($d(s) = s^2$) .

$d(-s) = (-s)^2 = s^2$.

$= s^2$.

$= -d(s)$. ∴ الدالة فردية ،

ولتمثيل هذه الدالة نكوّن الجدول التالي :

...	٢	١	٠	١-	٢-	...	س
...	٨	١	٠	١-	٨-	...	$d(s)$

ومن الرسم شكل (٧-٢) م . ت . ح = ، والمدى = ح ،

والدالة الفردية متماثلة حول نقطة الأصل .

ج ($d(s) = s^3 - s^2$) .

$d(-s) = (-s)^3 - (-s)^2 = -s^3 - s^2$.

$= s^3 + s^2$.

يلاحظ أن $d(-s) \neq d(s)$ ،

وكذلك $d(-s) \neq -d(s)$.

مثل هذه الدالة لا زوجية ولا فردية .


ويمكن تمثيل ذلك بعد تكوين الجدول التالي :

...	٤	٣	٢	١	٠	١-	٢-	...	س
...	٤	٠	٢-	٢-	٠	٤	١٠	...	$d(s)$

ومن الرسم شكل (٨-٢) م . ت . ح =

والمدى $= [-2, \infty)$ ، والدالة الزوجية متماثلة

حول محور الصادات .



شكل (٧ - ٢)

مثال (٢ - ١٧)

بيّن نوع الدوال التالية من حيث كونها زوجية أو فردية:

أ) $هـ(س) = س - جاس$.

ب) $د(س) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{س} - \frac{1}{س} & , س > 0 \\ \frac{1}{س} & , س < 0 \end{array} \right\}$

الحل :

أ) $هـ(س) = س - جاس$

$هـ(-س) = (-س) - جاس = -جاس - س$

$= -[س + جاس(-س)]$

$= -[س - جاس] = جاس - س = هـ(س)$

$\therefore هـ(س)$ فالدالة هـ فردية .

ب) $د(س) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{س} - \frac{1}{س} & , س > 0 \\ \frac{1}{س} & , س < 0 \end{array} \right\}$

الدالة معرفة بقاعدتين وغير معرفة عند الصفر

$\therefore م . ت = ح / \{0\}$.

د) $د(س) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{س} - \frac{1}{س} & , س > 0 \\ \frac{1}{س} & , س < 0 \end{array} \right\}$


$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{س} & , س < 0 \\ \frac{1}{س} - \frac{1}{س} & , س > 0 \end{array} \right\} =$

بعد تبديل كتابة القاعدتين

$\therefore$ الدالة زوجية .

تلاحظ أن الدالة التي على صورة $د(س) = س^3$ ، حيث $د$ عدد زوجي تكون دالة زوجية ، وهي متماثلة حول محور الصادات ، وعندما يكون $د$ عدداً فردياً تكون هذه الدالة فردية ، وهي متماثلة حول نقطة الأصل

$(0, 0)$.



شكل (٢ - ٨)

ثانياً: الدالة الدورية :

تدريب (٢ - ٦)

إذا كانت $d(s) = [s - s]$ ، فأوجد $d(s + 1)$ ماذا تلاحظ ؟
مثل هذه الدالة تسمى دالة دورية ، ودورها العدد ١ .

تعريف (٢ - ٨)

- الدالة d المعرفة على $\mathbb{R}$ هي دالة دورية :
- إذا وجد عدد m ، $0 < m$ ، وكان $s \in \mathbb{R}$ و
 - $d(s) = d(s + m)$.
 - m أصغر عدد موجب يحقق ما سبق [ويسمى m دور الدالة] .

مثال (٢ - ١٨)

بين أيّاً من الدوال التالية دورية وعيّن دورها .

أ ($d(s) = [s + \frac{1}{2}]$) . ب ($d(s) = s - [s - \frac{1}{2}]$)

الحل :

أ (من التعريف $d(s + m) = [s + m + \frac{1}{2}]$ ولكي يكون $d(s + m) = d(s)$)

$\therefore [s + m + \frac{1}{2}] = [s + \frac{1}{2}]$ ، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان $m = 0$.

$\therefore$ الدالة غير دورية لعدم توفر الشرط أن $0 < m$.

ب ($d(s + m) = s + m - [s + m - \frac{1}{2}]$)

ولكي يكون $d(s + m) = d(s)$

$\Leftrightarrow s + m - [s + m - \frac{1}{2}] = s - [s - \frac{1}{2}]$.

$\Leftrightarrow m - [s + m - \frac{1}{2}] = -[s - \frac{1}{2}]$.

$\Leftrightarrow m + [s - \frac{1}{2}] = [s - \frac{1}{2}]$.

نأخذ $s = 0$ نجد أن : $[d] = m$ ، m عدد صحيح ، وأصغر عدد صحيح موجب هو العدد ١

$\therefore$ الدالة دورية ودورها ١ .

مثال (٢ - ١٩)


- مثّل الدالة : د(س) = جاس ، بيانياً ؛ ومن الرسم :
 أ (أوجد مجموعة تعريفها ومداهها .
 ب) بيّن أنها دورية ودورها π .

الحل :

أ (الدالة د(س) = جاس تسمّى دالة مثلثية ولتمثيلها أولاً نقوم بتكوين الجدول التالي :

س	٠	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
جاس	١	٠	-١	٠	١

والآن يمكننا أن نقوم بتمثيلها كما في الشكل (٢ - ٩)



شكل (٢ - ٩)

يلاحظ من الرسم : م . ت = ح .
 المدى = $[-1, 1]$.

ب (والدالة د(س) = جاس دورية ودورها π .
 ولإثبات ذلك :

∴ جا(س + 2π) = جاس ∴ صه .

وأصغر عدد يحقق جا(س + م) = جاس هو 2π . (بأخذك = ١)

∴ الدالة دورية ودورها 2π . ويمكن ملاحظة ذلك على الرسم .

جـ) باعتبار د(س) = جاس متماثلة حول نقطة الأصل فهي دالة فردية .

تدريب (٢ - ٧)

١ (بيّن أن الدالة د(س) = جتا س دورية ، وأوجد دورها مبيناً ذلك بالرسم .

٢ (بيّن أن الدالة د(س) = ظا س دورية ، ودورها π .

تمارين ومسائل (٢-٢)

أولاً: أعد تعريف كل من الدوال التالية وعيّن مداها :

- [١٤] د(س) = $|٢س - ٧|$. [١٥] د(س) = $|س + ٢| - ٤$.
 [١٦] د(س) = $|١ - \frac{١}{٢}س|$. [١٧] د(س) = $|٤س - ١٦|$.
 [١٨] د(س) = $|١ - ٢س - ٣ + ٢س|$.

ثانياً : أوجد مجموعة تعريف ومدى كل من الدوال التالية :

- [١٩] د(س) = $[١١ + س]$. [٢٠] د(س) = $[\frac{١}{٢}س + ١]$.

ثالثاً: أوجد مجموعة الحل للمعادلات التالية :

- [٢١] $|س + ٤| + ٢س = ٥$. [٢٢] $٣\sqrt{٢س} - ٢|س| = ١ - ٠$.
 [٢٣] $|س + ١| - ٥ = ٠$. [٢٤] $٥ - ٢س = |س| + ٦ = ٠$.
 [٢٥] $[١ - ٣س] = -٥$. [٢٦] $٢ - = [\frac{١}{س}]$.
 [٢٧] $[س] - س = ٠$. [٢٨] $\frac{١}{٢} = \frac{[١ - س]}{[٣ - س]}$.

رابعاً: بيّن نوع الدوال التالية من حيث كونها زوجية أو فردية على مجموعة تعريفها :

- [١] د(س) = $٣س - ٤س^٣$.
 [٢] د(س) = $س^٤ - ٥س^٢ + ١$.
 [٣] د(س) = $\frac{٢ + ٣س}{٣ - ٢س}$.
 [٤] د(س) = $٢س - جا ٣س$.
 [٥] د(س) = $\frac{س^٢ + جتا ٢س}{١ + س^٤}$.

$$[6] \text{ د(س) } = \left\{ \begin{array}{l} \text{س}^2, \text{ س} < 0 \\ \text{س}^2 - 2, \text{ س} > 0 \end{array} \right.$$

$$[7] \text{ د(س) } = \text{س}^2 \text{ جتاس}.$$

$$[8] \text{ د(س) } = \left(\frac{\text{س}+1}{\text{س}-1} \right)^3 + \left(\frac{\text{س}-1}{\text{س}+1} \right)^3.$$





$$[9] \text{ د(س) } = \frac{\text{س}}{\sqrt{\text{س}^2 + |\text{س}|}}.$$



$$[10] \text{ د(س) } = \text{س}^3 \sqrt{\frac{|\text{س}| - 1}{|\text{س}| + 1}}, \text{ س} \in [-1, 1].$$

$$[11] \text{ د(س) } = \frac{\text{ظا}^3 \text{س}}{\text{س} + \text{جا س}}.$$

$$[12] \text{ د(س) } = \left\{ \begin{array}{l} \text{س} + 5, \text{ س} \in [-5, -2] \\ 3, \text{ س} \in [-2, 2] \\ \text{س} - 5, \text{ س} \in [2, 5] \end{array} \right.$$

[13] بيّن نوع الدوال المرسومة التالية من حيث كونها زوجية أو فردية .





خامساً : مثلّ الدوال التالية بيانياً . ومن الرسم أوجد المدى ومجموعة التعريف وبين أيّها زوجية وأيّها فردية .

[٢٩] د(س) = $s^2 - 2s$ ، $s \in [-1, 3]$.

[٣٠] د(س) = $\begin{cases} s^2 & , s > 1 \\ s^3 & , s \leq 1 \end{cases}$.

[٣١] د(س) = $|1 - s^3|$ ، $-1 \leq s < 2$.

[٣٢] د(س) = $[s - 4]$ ، $3 \leq s < 5$.

[٣٣] د(س) = $\sqrt{s - 4}$.

[٣٤] د(س) = $|-s - 11|$.

[٣٥] د(س) = $(s - 2)^2$.

[٣٦] د(س) = $|s - 4| + |s + 1| + 5$.

[٣٧] د(س) = $\begin{cases} s - 3 & , s \leq 0 \\ -[s - 3] & , -4 > s > -3 \end{cases}$.



[٣٨] د(س) = جتا ٢ س .

[٣٩] مثلّ الدالة : د(س) = جتاس ، ثم بين أنها دورية وعيّن دورها .


أطوار الدوال

٢ : ٣


تأمل في الشكلين (٢-١١٠) ، (٢-١٠٠) ، ماذا تلاحظ ؟



في الشكل (٢-١١٠) تلاحظ أن صورة الدالة د(س) والتي تكون مدى الدالة د مرتبة ترتيباً تصاعدياً مثل ترتيب عناصر المجال ، أي أن قيمة الدالة تتزايد بزيادة قيمة س ، نسمي مثل هذه الدالة دالة تزايدية . وفي الشكل (٢-١٠٠) تلاحظ أن عناصر د(س) مرتبة ترتيباً تنازلياً معاكس لترتيب عناصر س ، أي أن قيمة الدالة تتناقص بزيادة قيمة س ، نسمي مثل هذه الدالة دالة تناقصية .



شكل (٢-١١)



شكل (٢-١٢)

تعريف (٢-٩)

لتكن د : $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{H}$ حيث $\mathcal{C} \supset \mathcal{H}$ ، يقال للدالة د :

١ ■ تزايدية إذا كان $\forall س١, س٢ \in \mathcal{C}, س١ < س٢ \Rightarrow د(س١) < د(س٢)$.

٢ ■ تناقصية إذا كان $\forall س١, س٢ \in \mathcal{C}, س١ < س٢ \Rightarrow د(س١) > د(س٢)$.

نسمي تزايد وتناقص الدالة : أطوار الدالة .

مثال (٢ - ٢٠)

ابحث اطراد الدوال التالية :

أ (د(س) = ٣ + ٢س ، ب (د(س) = ٢ - س ، ج (د(س) = ٥ .

الحل :

أ) نفرض أن : $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$ ، $s_2 > s_1$.

$$\Leftrightarrow 2s_2 > 2s_1$$

$$\Leftrightarrow 3 + 2s_2 > 3 + 2s_1$$

$$\Leftrightarrow d(s_2) > d(s_1)$$

من التعريف : بما أن $s_2 > s_1 \Leftrightarrow d(s_2) > d(s_1)$ ، فالدالة تزايدية .

ب) نفرض أن $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$ ، $s_2 > s_1$.

$$\Leftrightarrow s_2 - 1 < s_1 - 1$$

$$\Leftrightarrow s_2 - 2 < s_1 - 2$$

$$\Leftrightarrow d(s_2) < d(s_1)$$

من التعريف : بما أن $s_2 > s_1 \Leftrightarrow d(s_2) < d(s_1)$ فالدالة تناقصية .

ج (د(س) = ٥ ، دالة ثابتة ؛ فهي دالة لا تزايدية ولا تناقصية .

مثال (٢ - ٢١)

ابحث اطراد الدوال التالية ومثلها بيانياً :

أ (ه(س) = $\frac{1}{s}$ ، ب (م(س) = $|s - 7|$.


الحل :

أ (ه(س) = $\frac{1}{s}$

نفرض $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$ ، $s_2 > s_1$ ، $\frac{1}{s_2} < \frac{1}{s_1} \Leftrightarrow d(s_2) < d(s_1)$.
الدالة ه تناقصية .

ويمكن تمثيل هذه الدالة بعد تكوين الجدول التالي :

س	٢	١	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	١-	٢-
د(س)	$\frac{1}{2}$	١	٢	٣	٣-	٢-	١-	$\frac{1}{2}$



شكل (٢ - ١٣)

نلاحظ أن الدالة $y = \frac{1}{x}$ هي (س) تناقصية على $\mathbb{R}^+$ ، وتناقصية على $\mathbb{R}^-$ ولكنها ليست تناقصية على اتحادها $\mathbb{R}$

ب) $f(x) = |x - 7|$.
يعاد تعريف الدالة :

$$f(x) = |x - 7| = \begin{cases} x - 7 & \text{if } x \geq 7 \\ 7 - x & \text{if } x < 7 \end{cases}$$

لدراسة اطراف الدالة :

١. لكل $x_1, x_2 \in [7, \infty[$

$$x_1 > x_2 \iff x_1 - 7 > x_2 - 7$$

$$\iff f(x_1) > f(x_2) \text{ فالدالة تزايدية في الفترة } [7, \infty[$$


٢. لكل $x_1, x_2 \in]-\infty, 7]$

$$x_1 > x_2 \iff x_1 - 7 < x_2 - 7$$

$$\iff 7 - x_1 < 7 - x_2$$


$$\iff f(x_1) < f(x_2) \text{ فالدالة تناقصية في الفترة }]-\infty, 7]$$

$x > 7$			$x \leq 7$			
٤	٥	٦	٧	٨	٩	س
٣	٢	١	٠	١	٢	د(س)



شكل (٢ - ١٤)

القيمة العظمى والقيمة الصغرى لدالة :



تأمل الشكل (٢ - ١٥) إنه يمثل دالة على الفترة $[ل، م]$ ح تلاحظ أن ج أخذت قيمة عظمى ، ولكن ليست أعلى قيمة، فنسمي ج قيمة عظمى نسبية (محلية) .

أمّا النقطة ا أخذت قيمة أعلى من أي نقطة للدالة فنسمي ا قيمة عظمى مطلقة . أي أن :
 $\forall س \in [ل، م]$ النقطة ا لها قيمة أعلى من أي نقطة (س، د(س)) للدالة .


بالمثل النقطة ب أخذت قيمة صغرى ولكنها ليست أصغر قيمة لهذه الدالة، فتسمى ب قيمة صغرى نسبية «محلية»؛ والنقطة و أخذت قيمة أصغر منها وأصغر من أي نقطة للدالة فتسمي و قيمة صغرى مطلقة ، أي $\forall س \in [ل، م]$ النقطة و لها قيمة أصغر من أي نقطة (س، د(س)) للدالة .

تعريف (٢ - ١٠)


إذا كانت ه دالة معرفة على و $ح \supset و$.

- ١ ■ نقول إن لهذه الدالة قيمة عظمى مطلقة عند ب فيما إذا كان $\forall س \in و، ه(س) \leq ه(ب)$.
- ٢ ■ نقول إن للدالة ه قيمة عظمى نسبية عند ج فيما إذا أمكن إيجاد عددين ا ، ب بحيث يكون $[ا، ب] \supset و، ا > ج > ب$ ويتحقق ما يلي :
 $\forall س \in [ا، ب]$ ، $ه(س) \geq ه(ج)$.
- ٣ ■ نقول إن للدالة قيمة صغرى مطلقة عند و فيما إذا كان $\forall س \in و، ه(س) \leq ه(و)$.
- ٤ ■ نقول إن للدالة ه قيمة صغرى نسبية عند و فيما إذا أمكن إيجاد عددين ا ، ب بحيث يكون $[ا، ب] \supset و، ا > و > ب$ ويتحقق ما يلي :
 $\forall س \in [ا، ب]$ ، $ه(س) \leq ه(و)$.


بين اطراد الدوال المرسومة في الأشكال [٢ - ١٦ (ج - ١)] ، ثم أوجد القيم العظمى والصغرى (المطلقة والنسبية) إن وجدت لكل منها :



شكل (٢ - ١٦ ج)



شكل (٢ - ١٦ ب)



شكل (٢ - ١٦ أ)

الحل :

١ ■ يلاحظ في الشكل (٢ - ١٦ أ) أن الدالة تزايدية في الفترة $[0, 3]$ وتناقصية على الفترة $[3, 7]$ ، وأن ٤ قيمة عظمى مطلقة للدالة .

٢ ■ يلاحظ في الشكل (٢ - ١٦ ب) أن الدالة تزايدية على الفترة $[-\infty, 4]$ وتناقصية على الفترة $[4, 6]$ وتزايدية على الفترة $[6, \infty]$. وأن ٥ قيمة عظمى نسبية ، وأنه لا يوجد لهذه الدالة قيمة عظمى مطلقة لأنها تسعى نحو $+\infty$ كذلك أن ٢ قيمة صغرى نسبية وأنه لا يوجد لهذه الدالة قيمة صغرى مطلقة لأنها تسعى نحو $-\infty$.

٣ ■ يلاحظ في الشكل (٢ - ١٦ ج) أن الدالة تناقصية في الفترة $[-\infty, 2]$ وتزايدية في الفترة $[2, \infty]$. وأن ١ قيمة صغرى مطلقة للدالة .

الدالة المحدودة :

بعض الدوال قد يكون مداها محصوراً بين عددين من المجال المقابل ، تسمى مثل هذه الدوال دوالاً محدودة كما أن بعضها يكون محدوداً من أعلى أو من أسفل .

تعريف (٢ - ١١)

نقول إن الدالة f المعرفة على $D \subset \mathbb{R}$:

١ ■ محدودة من أعلى إذا وجد عدد حقيقي L بحيث $f(x) \leq L$ ، $\forall x \in D$ ، ويسمى العدد L حداً علوياً للدالة f .

٢ ■ محدودة من أسفل إذا وجد عدد حقيقي K بحيث $f(x) \geq K$ ، $\forall x \in D$ ، ويسمى العدد K حداً سفلياً للدالة f .

٣ ■ محدودة إذا كانت f محدودة من أعلى من أسفل ، أي يوجد عددين حقيقيين K, L ، بحيث يكون $(K \leq f(x) \leq L)$ ، $\forall x \in D$.

مثال (٢ - ٢٣)

أثبت أن : أ) د(س) = $\sqrt{s}$ محدودة من أسفل . ب) د(س) = $\frac{s^2}{s^2 + 2}$ محدودة .

الحل :

أ) د معرفة بشرط $s \geq 0$.
 ∴ م . ت للدالة د = $[0, \infty]$ والمدى = $[0, \infty]$
 ∴ د(س) = $s \leq 0$ ، $\forall s \in [0, \infty]$ = و .
 من مجموعة التعريف نجد أن : $0 \leq s < \infty$
 ∴ $0 \leq \sqrt{s} < \infty$.
 ∴ $0 \leq s < \infty$.
 وبالتالي فإن الدالة محددة من أسفل وليست محددة من أعلى .

ب) م . ت للدالة د(س) = $\frac{s^2}{s^2 + 2}$ هي ح .
 ∴ $\forall s \in \mathbb{R} \Rightarrow 0 \leq s^2 < s^2 + 2 \dots$ لماذا ؟

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \frac{s^2}{s^2 + 2} &\geq \frac{s^2}{s^2 + 2} > \frac{s^2}{s^2 + 2} \\ \Leftrightarrow 0 &\leq \frac{s^2}{s^2 + 2} < 1 . \\ \therefore \text{الدالة محدودة ، ومداهها } [0, 1] \end{aligned}$$

مثال (٢ - ٢٥)

أثبت أن الدالة : د(س) = $s^2 - 4s + 7$ محدودة في $[-1, 2]$ ثم عيّن حديّها الأعلى والأدنى .

الحل :

$$\begin{aligned} \text{د(س)} &= s^2 - 4s + 7 \\ \Leftrightarrow \text{د(س)} &= (s^2 - 4s + 4) - 4 + 7 = (s - 2)^2 + 3 \\ \text{د(س)} &= (s - 2)^2 + 3 \\ \text{من مجموعة التعريف} \quad -1 &\leq s \leq 2 \quad \Leftrightarrow \quad -3 \leq s - 2 \leq 0 \\ \Leftrightarrow 9 &\geq (s - 2)^2 \geq 0 \\ \Leftrightarrow 12 &\geq 3 + (s - 2)^2 \geq 3 \end{aligned}$$

تمارين ومسائل (٢-٣)

[١] ادرس اطراد الدوال التالية :

■ ١ د (س) = $١ - س^٣$

■ ٢ د (س) = $١ - س^٢$

■ ٣ د (س) = $٢س - ٤$

■ ٤ د (س) = $٥ - س^٤ - س^٢$

■ ٥ د (س) = $\sqrt{١ + س^٢}$


■ ٦ د (س) = $\sqrt{\frac{١}{١ + س^٣}}$

■ ٧ د (س) = $|٣ - س|$


■ ٨ د (س) = $٢(٢ - س)$

■ ٩ د (س) = $\left. \begin{array}{l} ٥ - س^٢, \quad س \leq ٢ \\ س - ٢, \quad س > ٢ \end{array} \right\}$


[٢] ابحث اطراد الدوال المرسومة التالية ، ثم أوجد مجموعة تعريفها ومداهما :




شكل (٢-١٧ ج)




شكل (٢-١٧ ب)




شكل (٢-١٧ أ)



شكل (٢-١٧ و)



شكل (٢-١٧ هـ)



شكل (٢-١٧ د)

[٣] مثلّ الدوال التالية ، ومن الرسم أوجد المدى ، وابحث اطراد كل منها :

١ ■ د (س) = س^٢ - ٢س - ٣ .

٢ ■ د (س) = ٦س - س^٢ - ٥ .

٣ ■ د (س) = (س + ١) - ٢ .

٤ ■ د (س) = ٣ - (س - ٢) .

٥ ■ د (س) = ٢ + س | س | .

٦ ■ د (س) = ٤ - (س + ٢) .

٧ ■ د (س) = $\left. \begin{array}{l} -\frac{1}{2} \text{ س} , \text{ س} \leq ٠ \\ \frac{1}{2} \text{ س} , \text{ س} > ٠ \end{array} \right\}$

[٤] اثبت أن الدوال التالية محدودة وأوجد مداها :

١ ■ د (س) = س^٢ - ١ .

٢ ■ د (س) = س^٢ + ٥س - ٣ .

٣ ■ د (س) = $\frac{١}{٢ + س}$.

٤ ■ د (س) = $\frac{٣}{١ + ٢س}$.

٥ ■ د (س) = $\frac{١ + ٢س}{١ + ٣س}$.

٦ ■ د (س) = $\frac{١}{٢ + جاس}$.

٧ ■ د (س) = $\frac{٩}{٢ + ٣س}$.

المتتاليات

٣ : ١

المتتالية هي مجموعة من العناصر موضوعة في ترتيب متتال ، فمثلاً أشهر العام الميلادي هي : يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، ... ، ديسمبر ... إلخ .

ويمكن وضعها بالصورة :

$$\{ (١ ، يناير) ، (٢ ، فبراير) ، (٣ ، مارس) ، (٤ ، أبريل) ، ... ، (١٢ ، ديسمبر) \} .$$

ويسمى هذا الوضع ببيان المتتالية . فإذا أخذنا (٤ ، أبريل) فمعنى ذلك أن الشهر الرابع من التقويم الميلادي هو أبريل . أي أن المتتالية هي دالة مجالها مجموعة الأعداد الطبيعية (ط*) .
لتكن ح دالة معرفة كالتالي :

$$ح(١) = \frac{1}{1} ، ح(٢) = \frac{1}{2} ، ... ، ح(١٢) = \frac{1}{12} ، ...$$

نلاحظ أن : ح (ط) دالة حقيقية مجالها مجموعة الأعداد الطبيعية (ط*) وأن :

$$ح(١) = ١ ، ح(٢) = \frac{1}{2} ، ح(٣) = \frac{1}{3} ، ح(٤) = \frac{1}{4} ، ... إلخ$$

ويمكن كتابة هذه الدالة بصورة مجموعة من الأزواج المرتبة :

$$\{ (١ ، ١) ، (٢ ، \frac{1}{2}) ، (٣ ، \frac{1}{3}) ، (٤ ، \frac{1}{4}) ، ... \} ، ولأن مجال الدالة هو ط* ، فإنه يمكن$$

كتابة مداها مرتباً على الصورة : ح (١) ، ح (٢) ، ح (٣) ، ح (٤) ، ... إلخ . أي أن مدى الدالة هو :

$$١ ، \frac{1}{4} ، \frac{1}{3} ، \frac{1}{2} ، ... إلخ ، وهي متتالية غير منتهية .$$

ولتكن لدينا الدالة : ح(١) = ١ ، ح(٢) = ٢ ، ح(٣) = ٣ ، ... ، ح(١٣) = ١٣ ، ...

إنها مجموعة من الأزواج المرتبة على الصورة : { (١ ، ١) ، (٢ ، ٢) ، (٣ ، ٣) ، (٤ ، ٤) ، (٥ ، ٥) ، (٦ ، ٦) ، (٧ ، ٧) ، (٨ ، ٨) ، (٩ ، ٩) ، (١٠ ، ١٠) ، (١١ ، ١١) ، (١٢ ، ١٢) ، (١٣ ، ١٣) } ،

وأن مدى هذه الدالة هو مجموعة أعداد يمكن ترتيبها على النحو : ١٣ ، ١١ ، ٩ ، ٧ ، ٥ ، ٣ ، ١ ، ...

ويسمى الترتيب أعلاه متتالية منتهية ، لأن مجال هذه الدالة مجموعة جزئية منتهية من ط* على المجموعة

$$\{ ١ ، ٢ ، ٣ ، ... \} .$$

تعريف (٣-١)

المتتالية هي دالة حقيقية مجالها ط* أو مجموعة جزئية منها على الشكل { ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ... ، م }

مثال (٣ - ١)

بين أيًا من الدوال الآتية تمثل متتالية :

أ (ح) $(\mathcal{D}) = 1 - \frac{2}{3}$ ، $\mathcal{D} \ni \mathcal{P}^*$.

ب (هـ) $(\mathcal{D}) = \frac{2}{1+\mathcal{D}}$ ، $\mathcal{D} \ni \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

ج (ت) $(\mathcal{D}) = \mathcal{D}$ ، $\mathcal{D} \ni \mathcal{H}$.

الحل :

أ (ح) $(\mathcal{D})$ متتالية لأن مجال الدالة مجموعة الأعداد الطبيعية $(\mathcal{P}^*)$.

ب (هـ) $(\mathcal{D})$ متتالية لأن مجال الدالة مجموعة جزئية من $\mathcal{P}^*$.

ج (ت) $(\mathcal{D})$ ليست متتالية لأن مجال الدالة ليست $\mathcal{P}^*$.

مثال (٣ - ٢)

اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتاليات الآتية :

أ (ك) $(\mathcal{D}) = 2\mathcal{D}$ ، $\mathcal{D} \ni \mathcal{P}^*$.

ب (هـ) $(\mathcal{D}) = \frac{\mathcal{D}(1-\mathcal{D})}{\mathcal{D}}$ ، $\mathcal{D} \ni \mathcal{P}^*$.

الحل :

أ (ك) $(1) = 1$ ، $(2) = 2$ ، $(3) = 9$ ، $(4) = 16$ إذن الحدود الأربعة الأولى من ك $(\mathcal{D})$ هي :

$1, 2, 9, 16$

ب (هـ) $(1) = 1 - 1 = 0$ ، $(2) = \frac{1}{2}$ ، $(3) = -\frac{1}{3}$ ، $(4) = \frac{1}{4}$ إذن الحدود الأربعة

الأولى من هـ $(\mathcal{D})$ هي : $0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}$

الحد العام للمتتالية :

تأمل المتتالية : $1, 2, 9, 16, 25, \dots$ نجد أن :

ح $(1) = 1 = 1^2$ ، ح $(2) = 4 = 2^2$.

ح $(3) = 9 = 3^2$ ، ح $(4) = 16 = 4^2$ ، وهكذا ...

فالحد الذي ترتيبه $\mathcal{D}$ (الحد النوني) هو ح $(\mathcal{D}) = \mathcal{D}^2$ ،

ويطلق عادة على الحد النوني للمتتالية بالحد العام. وسنرمز له بالرمز ح $\mathcal{D}$. أي أن : ح $(\mathcal{D}) = \mathcal{D}^2$ ،

وسنكتب ح $\mathcal{D}$ بدلاً من ح (1) ، ح $\mathcal{D}$ بدلاً من ح (2) ... وهكذا .

ونستخدم الرمز $\langle \text{ح}_3 \rangle$ لنعني المتتالية التي حدها العام ح_3 حيث د رتبة الحد، ونكتب المتتالية على الشكل: $\langle \text{ح}_1, \text{ح}_2, \text{ح}_3, \dots, \text{ح}_3, \dots \rangle$.
وإذا عرفنا قاعدة الحد العام للمتتالية نستطيع كتابة المتتالية بالتعويض عن د بـ 1، 2، 3،

مثال (3-3)

اكتب الحدود الخمسة الأولى للمتتاليات التي الحد العام لكل منها :

$$\begin{aligned} \text{أ) } & \langle \frac{3(1-)}{1-2^2} \rangle \quad , \quad \text{ب) } \langle \frac{1}{2^{\sqrt{}}} + 1 \rangle \\ \text{ج) } & \langle \text{جا} \frac{\pi 3}{2} \rangle . \end{aligned}$$

الحل :

$$\begin{aligned} \text{أ) ح}_3 &= \frac{3(1-)}{1-2^2} \\ \text{نجد أن: } 1- &= \frac{(1-)}{1-2} = \text{ح}_1 , \quad 1- = \frac{(1-)}{1-4} = \text{ح}_2 , \quad \frac{1}{3} = \frac{(1-)}{1-8} = \text{ح}_3 . \\ \frac{1-}{5} &= \frac{(1-)}{1-6} = \text{ح}_2 , \quad \frac{1-}{9} = \frac{(1-)}{1-10} = \text{ح}_3 . \\ \text{إذن المتتالية هي : } & \langle 1- , \frac{1}{3} , \frac{1}{5} , \frac{1}{7} , \frac{1}{9} , \dots \rangle \\ \text{ب) ح}_1 &= \frac{1}{1} + 1 = 2 , \quad \text{ح}_2 = \frac{1}{2^{\sqrt{}}} + 1 = 1,71 \approx \\ \text{ح}_3 &= \frac{1}{3^{\sqrt{}}} + 1 = 1,58 \approx , \quad \text{ح}_4 = \frac{1}{4^{\sqrt{}}} + 1 = 1,50 \approx , \\ \text{ح}_5 &= \frac{1}{5^{\sqrt{}}} + 1 = 1,45 \approx . \end{aligned}$$

إذن المتتالية هي $\langle 2, 1,71, 1,58, 1,50, 1,45, \dots \rangle$.

$$\begin{aligned} \text{ج) ح}_1 &= \frac{\pi}{2} \text{ جا} = 1 , \quad \text{ح}_2 = \pi \text{ جا} = 0 , \\ \text{ح}_3 &= \frac{\pi 3}{2} \text{ جا} = 1- , \quad \text{ح}_4 = \pi 2 \text{ جا} = 0 . \end{aligned}$$

$$ج. = \frac{\pi}{2} \text{ جا } 1 = \dots$$

إذن المتتالية هي $\langle 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots \rangle$.

ملاحظة: بعض المتتاليات ليس لديها حد عام، فمثلاً متتالية الأعداد الأولية لا يُعرف لها حد عام حتى الآن.

$$\text{لتكن } ح_0 \text{ متتالية حدها الأول } ح_0 = 1, \text{ } ح_1 = ح_0 - 1, \text{ } ح_2 = ح_1 - 1, \dots, 2 \leq$$

إذن :

$$ح_2 = ح_1 - 1 = 2 - 1 = 1$$

$$ح_3 = ح_2 - 1 = 1 - 1 = 0$$

$$ح_4 = ح_3 - 1 = 0 - 1 = -1$$

نلاحظ أن بعض المتتاليات نحصل عليها بتوليد كل حد من الحد الذي يسبقه .

تدريب (٣ - ١)

اكتب الحدود الستة الأولى والحد النوني للمتتالية المعرفة كالاتي :

$$ح_1 = 3, \text{ } ح_{n+1} = 2 ح_n, \text{ } م \leq 1.$$

بعض أنواع المتتاليات :

المتتالية التزايدية، والمتتالية التناقصية :

تأمل المتتالية : $\langle 5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots \rangle$

$$\text{نجد أن : } 5 > -1 \text{ أي أن } ح_1 > ح_0$$

$$\text{و } -1 > 3 \text{ أي أن } ح_2 > ح_1$$

$$\text{و } 3 > 7 \text{ أي أن } ح_3 > ح_2$$

... وهكذا .

نلاحظ أن كل حد من حدود المتتالية أصغر من الحد الذي يليه مباشرة، وتسمى مثل هذه الدالة دالة تزايدية .

تعريف (٣ - ٢)

تسمى المتتالية $\langle ح_n \rangle$ تزايدية إذا كان $ح_n > ح_{n+1}$ لكل n في مجال المتتالية .

أما في المتتالية :

$$\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots \rangle$$

نجد أن :

$$\frac{1}{2} < \frac{1}{3} \quad \text{أي أن } 2 < 3$$

$$\text{و } \frac{1}{3} < \frac{1}{4} \quad \text{أي أن } 3 < 4 \dots \text{ وهكذا.}$$

أي أن كل حد من حدود المتتالية أكبر من الحد الذي يليه مباشرة، وتسمى مثل هذه الدالة دالة تناقصية.

تعريف (٣-٣)

تسمى المتتالية $\langle x_n \rangle$ تناقصية إذا كان $x_n > x_{n+1}$ لكل n في مجال المتتالية.

مثال (٣-٤)

بين أيًا من المتتاليات التالية تزايدية و أيًا منها تناقصية :

$$\text{أ) } \langle 1 + 2^n \rangle \quad \text{ب) } \langle \frac{1}{1 + 2^n} \rangle$$

$$\text{ج) } \langle (-1)^n (3^n) \rangle$$

الحل :

$$\text{أ) } 1 + 2^n = x_n \quad \text{ب) } 1 + 2^n = x_n \quad \text{نجد أن: } x_n = 1 + 2^n = 1 + 2^{n-1} + 2^{n-1} = 2 + 2^{n-1}$$

وحيث أن :

$$1 + 2^n > 2 + 2^{n-1} \quad \text{لكل } n \in \mathbb{N}^*$$

المتتالية $\langle 1 + 2^n \rangle$ تزايدية .

$$\text{ب) } \frac{1}{1 + 2^n} = x_n \quad \text{ج) } \frac{1}{1 + 2^n} = x_n \quad \text{نجد أن: } x_n = \frac{1}{1 + 2^n} = \frac{1}{1 + 2^{n-1} + 2^{n-1}} = \frac{1}{2 + 2^{n-1}}$$

وحيث إن :

$$\frac{1}{1 + 2^n} < \frac{1}{2 + 2^{n-1}} \quad \text{لكل } n \in \mathbb{N}^*$$

$$\therefore \text{ المتتالية } \langle \frac{1}{1 + 2^n} \rangle \text{ تناقصية .}$$

$$\text{ج) } (-1)^n (3^n) = x_n \quad \text{نجد أن:}$$

نجد أن :

$$x_1 = -3, \quad x_2 = 6, \quad x_3 = -9, \quad x_4 = 12, \dots$$

نلاحظ من حدود المتتالية أن المتتالية لا تزايدية ولا تناقصية

المتتالية الثابتة :

هي متتالية جميع حدودها متساوية ، فمثلاً : إذا كان $ح_ج = ١$ ؛ حيث ١ عدد حقيقي فإن المتتالية $\langle ح_ج \rangle$ هي : $\langle ١ ، ١ ، ١ ، \dots \rangle$ ، وقد تكون المتتالية الثابتة منتهية وقد تكون غير منتهية .

التمثيل البياني للمتتالية :

تعرف أن المتتالية دالة مجالها مجموعة الأعداد الطبيعية (ط*) ، أو مجموعة جزئية منها على الصورة $\{ ١ ، ٢ ، ٣ ، \dots ، م \}$ ، وبذلك فإنه بالإمكان تمثيل المتتالية بيانياً على المستوى الديكارتي .

(وذلك من خلال تمثيل الدالة $ح_ج = ح(ج)$ ، $ج \in ط^*$) ، يتم تمثيل المتتالية من خلال تمثيل الأزواج المرتبة بنقاط منفصلة في المستوى الديكارتي على النحو التالي :

$$\dots ، (١ ، ح_١) ، (٢ ، ح_٢) ، (٣ ، ح_٣) ، \dots ، (ج ، ح_ج) ، \dots$$


مثال (٣ - ٥)

ارسم بيان المتتالية $\langle ح_ج \rangle$ ؛ حيث :

$$ح_ج = ٥ - ج^٣ ، ج \in \{ ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ \} .$$

الحل :

$ح_١ = ٢ -$ ، $ح_٢ = ١$ ، $ح_٣ = ٤$ ، $ح_٤ = ٧$ ، $ح_٥ = ١٠$ ، ويتمثيل الأزواج المرتبة : $(١ ، ٢ -)$ ، $(٢ ، ١)$ ، $(٣ ، ٤)$ ، $(٤ ، ٧)$ ، $(٥ ، ١٠)$ بنقاط في المستوى الديكارتي نحصل على بيان المتتالية [انظر الشكل (٣ - ١)] .



تمارين ومسائل (٣-١)

[١] بين أيًا من الدوال التالية تمثل متتالية ، اذكر السبب :

- أ () ح $(\varphi) = 2^{\varphi}$ ، $\varphi \ni \sqrt{\varphi}$.
 ب () ح $(\varphi) = \varphi^2 - \varphi^3$ ، $\varphi \ni \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
 ج () ح $(\varphi) = \frac{3}{\varphi^2}$ ، $\varphi \ni \sqrt{\varphi}$.
 د () ح $(\varphi) = \sqrt{\varphi + 3}$ ، $\varphi \ni \sqrt{\varphi}$.
 هـ () ح $(\varphi) = \frac{1}{\varphi^2(1+\varphi)}$ ، $\varphi \ni \sqrt{\varphi}$.

[٢] اكتب كلاً من المتتاليات التالية مكثفياً بحدودها الخمسة الأولى :

- أ () $\langle \sqrt{\varphi} \rangle$ حيث $\sqrt{\varphi} = 2^{\varphi} - \varphi^2$.
 ب () $\langle \sqrt{\varphi} \rangle$ حيث $\sqrt{\varphi} = (1-\varphi)^{1+\varphi}$.
 ج () $\langle \sqrt{\varphi} \rangle$ حيث $\sqrt{\varphi} = (1-\varphi)^3(1+\varphi^2)$.
 د () $\langle \frac{1-\varphi^3}{\varphi^4 + \varphi^5} \rangle$

هـ () $\langle \frac{\varphi}{\varphi^2} \rangle$

[٣] اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتاليات التي حدها العام معطى ، ثم أوجد الحد العاشر :

- أ () د $(\varphi) = \frac{\varphi^2}{1+\varphi^2}$ ، ب () د $(\varphi) = \frac{2}{\varphi} - 1$ ،
 ج () د $(\varphi) = \frac{\pi}{2}$ جتا ، د () د $(\varphi) = \frac{3}{(1+\varphi)\varphi}$ ،
 هـ () د $(\varphi) = \frac{2}{\varphi}$.

[٤] أوجد الحدين العاشر والرابع والخمسون للمتتاليات الآتية :

- أ () $\langle \frac{\varphi}{1+\varphi} \rangle$ ، ب () $\langle 12 \rangle$ ، ج () $\langle (1-\varphi)^3(2+\varphi^3) \rangle$.

[٥] اكتب الحدود الخمسة الأولى لكل متتالية مما يأتي ثم مثلها بيانياً .

- أ () $\langle 1 + \varphi^2 \rangle$ ، ب () $\langle 1 - \varphi^2 \rangle$ ،
 ج () $\langle (1-\varphi)^3 \rangle$ ، د () $\langle \frac{1}{(1+\varphi)\varphi} \rangle$ ،
 هـ () $\langle 2 - \varphi^2 \rangle$.

[٦] اكتب الستة الحدود الأولى للمتتالية المعطاة بالصيغ الآتية حيث $2 \leq n$:

أ ($1 = a_1$ ، $a_n = 3a_{n-1} - 1$ ، $2 \leq n$)

ب ($1 = a_1$ ، $a_n = 1 + \frac{1}{a_{n-1}}$ ، $2 \leq n$)

ج ($a_1 = 2, 24$ ، $a_n = 1, 2 + a_{n-1}$ ، $2 \leq n$)

د ($\frac{1}{3} = a_1$ ، $a_n = \frac{1}{2} + a_{n-1}$ ، $2 \leq n$)

هـ ($3, 34 = a_1$ ، $a_n = 2, 2 + a_{n-1}$ ، $2 \leq n$)

[٧] اكتب الحد العام لكل متتالية من المتتاليات الآتية :

أ ($\langle 1, 3, 5, 7, \dots \rangle$)

ب ($\langle (1 \times 2), (2 \times 3), (3 \times 4), (4 \times 5), \dots \rangle$)

ج ($\langle 1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots \rangle$)

د ($\langle 1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots \rangle$)

هـ ($\langle \frac{1}{2}, \text{صفر} , -\frac{1}{2}, 1, \dots \rangle$)

و ($\langle 1, 1 + d, 1 + 2d, 1 + 3d, \dots \rangle$)

[٨] حدّد أيًا من المتتاليات الآتية تزايدية، وأيًّا منها تناقصية أو غير ذلك :

أ ($\langle 1 + \frac{1}{n} \rangle$) ، ب ($\langle (3+)^n \rangle$) ،

ج ($\langle (\frac{1}{n})^3 \rangle$) ، د ($\langle \pi^n \rangle$) ،

٩) اكتب الحدود الستة الأولى للمتتالية المعطاة بالصيغة:

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ، حيث $1 = a_1$ ، $2 = a_2$ ،

[١٠] اكتب الحدود الخمسة الأولى من المتتالية الآتية، ثم مثّلها بيانياً . $\langle a_n \rangle$ ، حيث :

$$a_n = \begin{cases} (1-n)^3 & \text{إذا كان } n \text{ عدداً فردياً} \\ 2-n & \text{إذا كان } n \text{ عدداً زوجياً} \end{cases}$$

[١١] اكتب حدود المتسلسلة . ثم احسب المجموع :

أ ($\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$) ، ب ($\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n})$) ،

ج ($\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + 2^n}$) ، د ($\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^2}{2}$)

$$(هـ) \quad \frac{9}{1=ك} \quad \frac{1}{2=ك} , \quad (و) \quad \frac{7}{1=د} \quad \frac{2}{1+د}$$

[١٢] أ) احسب $\frac{4}{1=م} (٢م + م٢)$ و $\frac{4}{1=م} م٢ + \frac{4}{1=م} م٢$. هل هما متساويان ؟

ب) هل $\frac{2}{1=مر} مر٢$ يساوي $\frac{2}{1=مر} مر٢$ ؟

ج) احسب $\frac{2}{1=م} م٢$ ، $\frac{4}{1=م} م٢$ ، $\frac{2}{1=م} م٢$ ك

(إرشاد : $\frac{5}{1=د} = ١ + ١ + ١ + ١ + ١ = ٥ = ١ \times ٥$) .

المتتالية الحسابية

٣ : ٢

كثيراً ما نصادف متتاليات من الأعداد مرتبة بنمط معين ، وهذا النمط معطى حسب قاعدة ما .
فمثلاً :

بدأ موظف عمله براتب شهري قدره ٧٥٠٠ ريال، وكانت زيادته السنوية ١٠٠٠ ريال، فكم يكون راتبه الشهري في بداية كل سنة من السنوات العشر الأولى ؟
هل حصلت على النتيجة التالية :

٧٥٠٠ ، ٨٥٠٠ ، ٩٥٠٠ ، ١٠٥٠٠ ، ١١٥٠٠ ، ١٢٥٠٠ ، ١٣٥٠٠ ، ١٤٥٠٠ ، ١٥٥٠٠ ، ١٦٥٠٠

هذه متتالية من نوع خاص ، حيث نلاحظ أن الفرق بين كل حد والحد السابق له مباشرة يساوي مقداراً ثابتاً، وهو (١٠٠٠) . والمتتالية الممثلة بالقاعدة : $ح + ١ - ح =$ مقداراً ثابتاً .

تسمى متتالية حسابية (عددية)، ويسمى الفرق بين كل حدين متتاليين أساس المتتالية، ويرمز له عادة بالرمز

د .

تعريف (٣-٤)

تسمى المتتالية $\langle ح \rangle$ متتالية حسابية إذا كان : $ح + ١ - ح = د$ ، ٧ في مجال المتتالية ؛
حيث د مقدار ثابت ، ويسمى د أساس المتتالية .

مثال (٣-٦)

أ) المتتالية : $\langle ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ... ، ٢٠٠٠ ، ... \rangle$

متتالية حسابية أساسها ٢ وذلك لأن : $٢ = ٤ - ٢ = ٦ - ٤ = ٨ - ٦ = ... = ٢$

لاحظ أن : $ح_٢ = ٢٠٠٠$ ، $ح_١ = ١٩٩٨$ ، $(١ + ٢) = ٣$

∴ $ح_١ + ح_٢ = ٣٩٩٨ = ٢٠٠٠ + ١٩٩٨ = (٢٠٠٠ + ١٩٩٨) - ٢ = ٣٩٩٦$ الأساس $٧٩٩٨ \Rightarrow ط^*$.

ب) المتتالية : $\langle ٧ ، ٤ ، ١ ، -٢ ، -٥ ، -٨ ، ... ، -١٠٠٠٠ ، ... \rangle$

متتالية حسابية؛ لأن أساسها ٣- وذلك لأن $٣- = ٤ - ٧ = ١ - ٤ = -٢ - ١ = -٥ - ٨ = ... = ٣-$

كما أن : $ح_٣ = -١٠٠٠٠$ ، $ح_١ = -٩٩٩٧$ ، $(١ + ٣) = ٤$ ، $١ - ٣ = -٢$

وأن : $ح_١ + ح_٣ = -١٩٩٩٧ = -١٠٠٠٠ - ٩٩٩٧ = ٣ - ١٠٠٠٠ = ٣ - ٩٩٩٧ = -٩٩٩٤$ الأساس $٧٩٩٨ \Rightarrow ط^*$

ج) المتتالية : $\langle (١-)^{١٠٠٠} \rangle$ ليست متتالية حسابية لأن :

$\langle (١-)^{١٠٠٠} \rangle = \langle ١ ، -١ ، ١ ، -١ ، ... \rangle$

$ح_٢ - ح_١ = -٢$ بينما $ح_٣ - ح_٢ = ٢$

الحد العام للمتتالية الحسابية :

إذا كانت $\langle ح_٢ \rangle$ متتالية حسابية أساسها د فإن :

$$ح_٢ = ح_١ + د$$

$$∴ ح_٣ = ح_٢ + د = ح_١ + ٢د$$

ومنه :

$$ح_٢ = ح_١ + د$$

$$ح_٣ = ح_٢ + د = ح_١ + ٢د$$

$$ح_٤ = ح_٣ + د = ح_١ + ٣د$$

... وهكذا .

تعريف (٣-٥)

إذا كانت $\langle ح_٢ \rangle$ متتالية حسابية أساسها د ؛ فإن : $ح_٢ = ح_١ + د(١-)$ ، د رتبة الحد .

وهذه العلاقة تتضمن أربعة متغيرات يمكن معرفة أحدها إذا علمت قيم المتغيرات الثلاثة الأخرى .

ومن العلاقة السابقة يمكن أن نستنتج الصورة العامة للمتتالية الحسابية وهي :

$$\langle ح_١ ، ح_٢ ، ح_٣ ، ... ، ح_٢ + د ، ح_١ + ٢د ، ... ، ح_١ + د(١-) \rangle$$

مثال (٣ - ٧)

اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتاليات الحسابية الآتية :

أ (حدّها الأول ٤,٥ وأساسها ٢,٥ .

ب (حدّها الأول $\frac{7}{2}$ وأساسها ٢ - .

الحل :

أ (ح_١ = ٤,٥ ، د = ٢,٥

$$\text{ح}_2 = ٤,٥ + ٢,٥ = ٧$$

$$\text{ح}_3 = ٧ + ٢,٥ \times ٢ = ٩,٥$$

$$\text{ح}_4 = ٩,٥ + ٢,٥ \times ٣ = ١٢$$

∴ الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الحسابية هي : ٤,٥ ، ٧ ، ٩,٥ ، ١٢

ب (ح_١ = $\frac{7}{2}$ ، د = ٢ -

$$\text{ح}_2 = \frac{7}{2} + (٢ -) = ٢ - \frac{7}{2} = \frac{٣}{٢}$$

$$\text{ح}_3 = \frac{7}{2} + (٢ -)٢ = ٤ - \frac{7}{2} = \frac{١}{٢}$$

$$\text{ح}_4 = \frac{7}{2} + (٢ -)٣ = ٦ - \frac{7}{2} = \frac{٥}{٢}$$

∴ الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الحسابية هي : $\frac{7}{2}$ ، $\frac{٣}{٢}$ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٥}{٢}$.

مثال (٣ - ٨)

متتالية حسابية حدّها الأول ٧ ، وأساسها ٥ ، أوجد كلا من : ح_{١٠} ، ح_{٨٣} .

الحل :

$$\because \text{ح}_٥ = ٧ + (١ -)٥ = ٥ ، \text{ح}_٧ = ٧$$

$$\because \text{ح}_{١٠} = ٧ + (١٠ - ١) \times ٥ = ٥٢$$

$$\text{ح}_{٨٣} = ٧ + (٨٣ - ١) \times ٥ = ٤١٧$$

مثال (٣ - ٩)

أوجد $ح_١٢$ من المتتالية الحسابية التي فيها $ح_٣ = -٥$ ، $ح_٦ = ١٦$.

الحل :

$$ح_٣ = ح_١ + ٢د (١ - ٢) = -٥$$

نجد أن :

$$ح_٣ = ح_١ + ٢د = -٥ \dots\dots (١)$$

$$و ح_٦ = ح_١ + ٥د = ١٦ \dots\dots (٢)$$

بطرح (١) من (٢) نحصل على :

$$٢١ = ٣د \quad \therefore د = \frac{٢١}{٣}$$

ولإيجاد $ح_١٢$ نعوض عن $د = \frac{٢١}{٣}$ في (١) نحصل على :

$$ح_٣ = -٥ = ح_١ + ٢ \times \frac{٢١}{٣}$$

$$أي أن : ح_١ = -٥ - ١٤ = -١٩$$

$$\therefore ح_١٢ = ح_١ + ١١د = -١٩ + ١١ \times \frac{٢١}{٣} = ٥٨$$

$$\therefore ح_١٢ = ٥٨$$

مثال (٣ - ١٠)

في المتتالية الحسابية $\langle ٤٢ ، ٣٩ ، ٣٦ ، \dots \rangle$ أوجد رتبة الحد الذي قيمته -٦ .

الحل :

المعلوم هنا $ح_٣ = -٦$ ، والمطلوب إيجاد $د$ وفي المتتالية نجد أن :

$$ح_٣ = -٦ = ح_١ + ٢د = ٤٢ - ٣٩ = ٣$$

$$\therefore ح_١ = -٦ - ٣ = -٩$$

$$\therefore -٦ = ح_٣ = ح_١ + ٢د = -٩ + ٢د$$

$$\therefore -٦ = -٩ + ٢د \quad \therefore ٣ = ٢د$$

$$\therefore د = \frac{٣}{٢}$$

$$\therefore د = \frac{٣}{٢}$$

أي أن الحد الذي قيمته (-٦) هو الحد السابع عشر .

مثال (٣- ١١)

أوجد رتبة أول حد سالب في المتتالية $\langle \dots, 12, 15, 18, 21 \rangle$

الحل :

نلاحظ أن المتتالية الحسابية تناقصية لأن أساسها سالب . أي أن : $3 = d$
تكون قيمة الحد السالب أصغر من صفر ولإيجاد أول حد سالب نوجد أولاً الحد الذي قيمته صفر .
نضع $ح_d = 0$ صفرًا في قانون الحد العام ومنه نوجد $د$.

$$\therefore ح_d = ح_1 + (1-d) \cdot د \quad , \quad 21 = ح_1 \quad , \quad 3 = d$$

$$\therefore \text{ صفر } = 21 + (1-d)(3-d)$$

$$\text{ صفر } = 21 - 3 + 3د + د$$

$$\therefore 8 = د$$

إذن يوجد حد قيمته صفر هو $ح_8$

وآخر حد موجب هو $ح_7$

إذن أول حد سالب هو $ح_9$

ملاحظة : إذا نتج أن $د \notin \mathbb{N}^*$ ، مثلاً $د = \frac{1}{2}$ ، فإنه لا يوجد حد قيمته صفر
في هذه الحالة ويكون آخر حد موجب هو $ح_1$ ، وأول حد سالب هو $ح_2$

حل آخر :

$$ح_d > 0$$

$$0 > 21 + (1-d)(3-d)$$

$$7 < (1-d)$$

$$8 < د$$

أول حد سالب هو $ح_9$

تدريب (٣- ٢)

أوجد رتبة أول حد موجب في المتتالية $\langle \dots, 4-, 6-, 8- \rangle$

مثال (٣- ١٢)

أوجد المتتالية الحسابية التي مجموع حديها الخامس والثامن ينقص عن أربعة أمثال الحد الثالث فيها بمقدار ١ ،
ومجموع حدودها الثلاثة الأولى يساوي ٢٤ .

الحل :

$$\therefore ح_d = ح_1 + (1-d) \cdot د$$

$$\begin{aligned}
 1 &= (ح_1 + ح_2) - ح_3 \\
 1 &= (د + ح_1 + د + ح_2) - (د + ح_1) \\
 1 &= د - ح_2 \quad (1) \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

كذلك:

$$\begin{aligned}
 24 &= ح_1 + ح_2 + ح_3 \\
 24 &= (د + ح_1) + (د + ح_2) + ح_3 \\
 24 &= د + ح_3 \quad (2) \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

وبجمع المعادلتين (1)، (2) نحصل على:

$$\begin{aligned}
 25 &= ح_1 + ح_2 \\
 5 &= ح_1 \quad (3) \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

وبالتعويض عن $ح_1 = 5$ في (2)

$$24 = د + 3 \times 5$$

$$9 = د = 15 - 24 = 3$$

$$\leftarrow د = 3$$

∴ المتتالية الحسابية هي : $\langle 5, 8, 11, \dots \rangle$

مثال (٣-١٣)

اشترت فاطمة ماكينة خياطة بمبلغ ٣٨٩٩٥ ريالاً، مع مرور الوقت وبالإستهلاك يقل سعر ماكينة الخياطة بمقدار ١٩٥٠ ريالاً سنوياً، فما قيمة ماكينة الخياطة في بداية السنة الحادية عشرة .

الحل :

$$\begin{aligned}
 ح_1 &= د + (1 - 11) \times 1950 \\
 38995 &= د + (1 - 11) \times 1950 \\
 38995 &= د + 10 \times 1950 \\
 38995 &= د + 19500 \\
 19495 &= د \quad \text{ريالاً}
 \end{aligned}$$

مثال (٣-١٤)

قاعة محاضرات فيها ٢٥ صفاً من المقاعد . فإذا كان الصف الأول يتسع لـ ٢٠ مقعداً، وكل صف يتسع لمقعدين أكثر من الصف الذي يسبقه فكم عدد المقاعد التي يتسع لها الصف الأخير ؟

الحل :

نفرض أن $ح د =$ عدد المقاعد في الصف الذي ترتيبه $د$.
 $\therefore < ح د >$ متتالية حسابية منتهية حدودها : $ح_1 = 20$ ، $د = 2$
 $\therefore ح د = ح_1 + (د - 1) \times د$ ، $د \in \mathbb{N}^*$ ، $د \geq 25$
 $\therefore ح_2 = 20 + (2 - 1) \times 2 = 22$
 $20 + 22 = 42$
 $20 + 42 = 62$ مقعداً

بعض خواص المتتالية الحسابية :

■ ١ لتكن $< ح_1 ، ح_2 ، ح_3 ، ح_4 ، \dots >$ متتالية حسابية أساسها $د$ ، $ك$ قيمة ثابتة؛ فإن :

(أ) $< ح_1 \pm ك ، ح_2 \pm ك ، ح_3 \pm ك ، \dots >$ هي متتالية حسابية لها نفس الأساس $د$.

(ب) $< ح_1 ، ح_2 ، ح_3 ، \dots >$ و $< \frac{ح_1}{ك} ، \frac{ح_2}{ك} ، \frac{ح_3}{ك} ، \dots >$ هما أيضاً متتاليتان حسابيتان أساسهما $ك$ ، $\frac{د}{ك}$ على الترتيب حيث $ك$ قيمة ثابتة لا تساوي الصفر .

■ ٢ إذا كان $< ح_1 ، ح_2 ، ح_3 ، \dots ، ح_م ، \dots ، ح_ن ، \dots ، ح_{ن-1} ، ح_ن >$ متتالية حسابية أساسها $د$ ، وفرضنا أن عدد الحدود التي قبل $ح_م$ هي $ك$ ، وأن عدد الحدود التي تلي $ح_ن$ هي $ك$ أيضاً فيكون :

$$ح_م = ح_1 + ك د \quad (١) \dots\dots\dots$$

$$ح_د = ح_ن + ك د \quad (٢) \dots\dots\dots$$

ومن العلاقتين (١) ، (٢) نجد أن :

$$ح_م - ح_د = ح_1 - ح_ن$$

$$أو \quad ح_م + ح_د = ح_1 + ح_ن = \text{الحد الأول} + \text{الحد الأخير}$$

أي أن :

مجموع كل حدين متساويي البعد عن الحد الأول و الحد الأخير من متتالية حسابية منتهية هو ثابت ويساوي مجموع الحدين الأول والأخير .

■ ٣ لتكن $< ح_1 ، ح_2 ، ح_3 ، \dots ، ح_د >$ متتالية حسابية فإن :

$$\begin{aligned} {}_2C - {}_1C &= {}_3C - {}_2C \text{ ومنها نجد أن} \\ {}_2C + {}_1C &= {}_3C \end{aligned}$$

$$\therefore {}_3C = \frac{{}_2C + {}_1C}{2} \text{ وكذلك}$$

$${}_4C = \frac{{}_3C + {}_2C}{2}, \dots \text{ وهكذا.}$$

أي أن كل حد في متتالية حسابية وسط حسابي بين حدين مجاورين له ما عدا الحدين الأول والأخير .
والحدود الواقعة بين الحد الأول والحد الأخير تسمى الأوساط الحسابية بينهما .

مثال (٣ - ١٥)

أوجد سبعة أوساط حسابية بين ١٠ ، ٣٤

الحل :

إذا أدخلنا سبعة أوساط حسابية بين ١٠ ، ٣٤ فنحصل على متتالية حسابية .

$$\text{حدها الأول } {}_1C = 10$$

$$\text{عدد حدودها } د = 2 + 7 = 9$$

$$\text{حدها التاسع } {}_9C = 34$$

وحيث إن :

$${}_9C = {}_1C + د(1 - 9) \iff {}_9C = {}_1C + د(-8)$$

$$\iff {}_9C - {}_1C = -8د$$

$$\therefore 34 - 10 = -8د \iff 24 = -8د$$

وتكون الأوساط الحسابية هي : ١٣ ، ١٦ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٣١ .

مجموع د من الحدود الأولى في المتتالية الحسابية :

لتكن $\langle {}_1C, {}_2C, \dots, {}_دC \rangle$ متتالية حسابية أساسها د، ولنرمز لمجموع د من الحدود الأولى بالرمز

$$م_د = \sum_{r=1}^د {}_rC$$

أي أن :

$$م_د = {}_1C + {}_2C + \dots + {}_دC \dots\dots\dots (١)$$

يسمى المجموع في (١) متسلسلة حسابية منتهية حدها الأول ${}_1C$ وحدها النوني ${}_دC$

وإذا رتبنا الحدود بشكل معاكس فإن المجموع لا يتغير. أي أن :

$$\text{مج}_3 = \text{ح}_3 + \text{ح}_{3-1} + \text{ح}_2 + \text{ح}_1 + \dots + \text{ح}_2 + \text{ح}_1 + \text{ح}_0 \quad (2) \dots\dots\dots$$

بجمع (١)، (٢) نحصل على :

$$2 \text{ مج}_3 = (\text{ح}_3 + \text{ح}_2) + (\text{ح}_2 + \text{ح}_{3-1}) + \dots + (\text{ح}_2 + \text{ح}_1) + (\text{ح}_1 + \text{ح}_0) \quad [\text{من الخاصية ٢}]$$

وكل مقدار موضوع بين قوسين يساوي (ح_٣ + ح_١) وعددها ٥ .

$$\therefore 2 \text{ مج}_3 = 5 (\text{ح}_3 + \text{ح}_1)$$

$$\therefore \text{مج}_3 = \frac{5}{2} (\text{ح}_3 + \text{ح}_1) ,$$

$$\therefore \text{ح}_3 = \text{ح}_2 + (1 - 5) \text{ د}$$

$$\therefore \text{مج}_3 = \frac{5}{2} [\text{ح}_2 + (1 - 5) \text{ د}]$$

مثال (٣-١٦)

أوجد المتتالية الحسابية التي عدد حدودها ٦ ، وحدها الأخير ٢٧ ، ومجموعها ١٠٢ .

الحل :

$$\text{د} = 6 , \text{ح}_6 = 27 , \text{مج}_6 = 102$$

$$\therefore \text{مج}_6 = \frac{5}{2} (\text{ح}_6 + \text{ح}_1)$$

$$\therefore 102 = \frac{6}{2} (\text{ح}_6 + \text{ح}_1)$$

$$81 + \text{ح}_1 = 102$$

$$\therefore 21 = 81 - 102 = \text{ح}_1$$

$$\therefore \text{ح}_1 = 7$$

لإيجاد أساسها نستخدم القانون :

$$\text{ح}_6 = \text{ح}_1 + (6 - 1) \text{ د}$$

$$27 = 7 + (6 - 1) \text{ د}$$

$$20 = 6 \text{ د}$$

$$20 = 6 \text{ د} \Rightarrow \text{د} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$$

$$\therefore \text{د} = \frac{10}{3}$$

إذن المتتالية الحسابية المطلوبة هي : $\langle 7, 11, 15, 19, 23, 27 \rangle$

مثال (٣-١٧)

أوجد مجموع المتتالية الحسابية التي حدها الأول ٥ وأساسها ٣ وحدها الأخير ٤١ .

الحل :

$$ح_١ = ٥ ، د = ٣ ، ح_٥ = ٤١$$

نحتاج أولاً لمعرفة عدد الحدود .

$$\therefore ح_٥ = ح_١ + (٥ - ١) د$$

$$٤١ = ٥ + ٣ \times (٥ - ١)$$

$$٤١ = ٥ + ٣ - ١٢$$

$$٤١ = ٣ + ٢$$

$$٣ = ٤١ - ٢$$

$$٣ = \frac{٣٩}{١٣} = د$$

$$\therefore ١٣ = د$$

$$\therefore مج_٥ = \frac{٥ + ح_١}{٢} (٥ + ١) = مج_١٣ = \frac{١٣}{٢} (٤١ + ٥) = ٢٩٩ .$$

مثال (٣-١٨)

إذا كان مجموع د حداً من متتالية معطاة بالعلاقة :

$$مج_٥ = ٢ - د . \text{ بيّن نوع المتتالية وأوجد حدها العام .}$$

الحل :

$$\therefore مج_٥ = ٢ - د$$

$$\therefore مج_١ = ١ - ١ \times ٢ = ١ = ح_١$$

$$مج_٢ = ٢ - ٢ \times ٢ = ٢ - ٤ = -٢ = ح_١ + ح_٢ = ٦$$

$$\therefore ح_٢ = ١ \quad \therefore ح_٣ = ٥$$

$$مج_٣ = ٣ - ٣ \times ٢ = ٣ - ٩ = -٦ = ح_١ + ح_٢ + ح_٣ = ١٥$$

$$\therefore ح_٣ = ٦ \quad \therefore ح_٤ = ٩ ، \dots$$

إذن المتتالية هي : $\langle ١ ، ٥ ، ٩ ، \dots \rangle$ وهي متتالية حسابية فيها $د = ٤$

$$\therefore ح_٤ = ح_١ + (٤ - ١) د$$

$$\therefore ح_٤ = ١ + ٤ \times (٤ - ١) = ١٣ = ٤ - ٤$$

$$\therefore الحد العام = ح_٤ = ٤ - ٣ .$$

مثال (٣ - ١٩)

خزان ماء سعته ١٣٥٠ جالوناً، فإذا تسرب منه في اليوم الأول ٢٠ جالوناً من الماء وكان ما يتسرب منه في كل يوم تال يزيد عن ما يتسرب في اليوم السابق له مباشرة بمقدار ٥ جالونات فبعد كم يوم يصبح الخزان فارغاً ؟

الحل :

كمية الماء المتسربة في اليوم الأول = ٢٠ جالوناً
كمية الماء المتسربة في اليوم الثاني = ٢٥ جالوناً
كمية الماء المتسربة في اليوم الثالث = ٣٠ جالوناً
... وهكذا

أي أن تسرب الماء يتم وفق المتتالية الحسابية : $\langle ٢٠, ٢٥, ٣٠, \dots, ٢٠ + ٥ \times (١ - ٥), \dots \rangle$
ولكي يكون الخزان فارغاً يجب أن يكون مجموع ما تسرب منه ١٣٥٠ جالوناً .
بما أن كمية الماء المتسربة من الخزان في ٥ يوماً هي :

$$\text{مجم} = \frac{٥}{٢} [٢ ح + ٥ (١ - ٥)]$$

$$\therefore \frac{٥}{٢} [٢ \times ٢٠ + ٥ (١ - ٥)] = ١٣٥٠$$

$$١٣٥٠ = \frac{٥}{٢} [٤٠ + ٥ (١ - ٥)]$$

$$٢٧٠٠ = ٥ [٤٠ + ٥ (١ - ٥)]$$

$$٢٧٠٠ = ٥ [٤٠ + ٥ (١ - ٥)]$$

$$٢٧٠٠ = ٥ [٤٠ + ٥ (١ - ٥)]$$

$$\therefore (٢٧ + ٥) (٢٠ - ٥) = ٠$$

$$\therefore ٢٧ - ٥ = ٠ ، \text{ وهذا مرفوض (لماذا ؟)}$$

$$\text{أو } ٢٠ = ٥$$

$\therefore$ يصبح الخزان فارغاً بعد ٢٠ يوماً .

مثال (٣ - ٢٠)

بدأ رجل حياته العملية سنة ١٩٨٨م بمرتب سنوي قدره ١٨٠٠٠٠ ريال واستمر يحصل على علاوة سنوية قدرها ٧٥٠٠ ريال حتى صار راتبه السنوي ٢٤٠٠٠٠ ريال ولم يتغير راتبه السنوي بعد ، إلى أن أمضى ١١ سنة في العمل . احسب مجموع المبالغ التي حصل عليها .

الحل :

المرتب يزداد مكوناً متتالية حسابية فيها :

$$ح_1 = 180000 ، د = 7500 ، ح_2 = 240000$$

$$\therefore ح_2 = ح_1 + د(1 - 1)$$

$$240000 = 180000 + 7500 \times (1 - 1)$$

$$60000 = 7500 \times 1 \Rightarrow 7500 = 60000$$

$$\therefore 9 = 1$$

$$\text{بما أن } مج_9 = \frac{1}{2} [ح_1 + ح_9]$$

$\therefore$ بعد 9 سنوات

$$مج_9 = \frac{9}{2} [180000 + 240000] = 1890000 \text{ ريال}$$

$\therefore$ الراتب 240000 ريال لم يتغير إلى أن أمضى الرجل 11 سنة

$\therefore$ الموظف يتقاضى نفس المرتب لمدة = 11 - 9 = 2 سنة

$$\therefore \text{مجموع ما يتقاضاه خلال سنتين} = 2 \times 240000 = 480000$$

$$\therefore \text{مجموع رواتبه التي حصل عليها} = 1890000 + 480000 = 2370000 \text{ ريال}$$

مثال (٣ - ٢١)

برهن أن المتسلسلة $مج_{1=1}^{15}$ (د - ١٤) هي متسلسلة حسابية ، ثم أوجد مجموعها .

الحل :

$$ح_1 = 14 - د$$

$$ح_2 = 13 - د ، ح_3 = 12 - د ، ح_4 = 11 - د ، ح_5 = 10 - د ، \dots \text{ وهكذا}$$

في المتتالية $\langle 13 - د ، 12 - د ، 11 - د ، \dots \rangle$

$$د = 12 - (13 - د) = 11 - (12 - د) = 10 - (11 - د) = 1$$

أي أن المتتالية التي حدها العام د - ١٤ هي متتالية حسابية حدها الأول $ح_1 = 13 - د$ ، وأساسها ١

$$\therefore مج_{1=1}^{15} = \frac{15}{2} [1 \times (1 - 15) + (13 - د) \times 2]$$

$$= \frac{15}{2} [14 + 26 - د] = 90 - \frac{15}{2} د$$

تمارين ومسائل (٣-٢)

[١] أوجد الحدود الستة الأولى للمتتاليات الحسابية التالية :

$$\begin{aligned} \text{أ) } & \text{ح}_1 = 2, \quad \text{د} = -\frac{1}{2}, \quad \text{ب) ح}_1 = 9, \quad \text{ح} = 5, \\ \text{ج) ح}_1 = 23, 2, \quad \text{د} = 6, 0, \quad \text{د} = -\frac{1}{2}, \quad \text{ح} = 15 \end{aligned}$$

[٢] أوجد ما يأتي :

- أ) الحدين الثالث عشر والعشرين للمتتالية الحسابية التي حدها الأول ١ وأساسها ٨ .
 ب) الحد الرابع من متتالية حسابية حدها العاشر ٢٥٠ وحدها السابع ٢١٧ .
 ج) الحد الخامس والحد الحادي والعشرين من المتتالية $\langle \dots, 6, 5, 7, 7, 5, \dots \rangle$ [٧] أوجد ما يأتي :
 د) رتبة الحد الذي قيمته ٧ من المتتالية : $\langle \dots, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \dots \rangle$
 هـ) الحد السابع من المتتالية $\langle \dots, (س + ص)^2, س^2 + ص^2, (س - ص)^2, \dots \rangle$

[٣] أوجد ما يأتي :

- أ) رتبة أول حد سالب من المتتالية $\langle \dots, 31, 33, 35, \dots \rangle$
 ب) الحد الذي ترتيبه الخامس عشر من النهاية من المتتالية $\langle \dots, 10, 7, 4, \dots, 100 \rangle$
 ج) قيمة d إذا كان الحد العام للمتتالية $\langle \dots, 19, 13, 7, \dots \rangle$ يساوي الحد العام من المتتالية $\langle \dots, 69, 73, 77, \dots \rangle$

[٤] أكمل الحدود الناقصة في المتتاليات الحسابية التالية :

$$\begin{aligned} \text{أ) } & \langle \dots, 9, \dots, 15, \dots \rangle \\ \text{ب) } & \langle \dots, 4, 5, \dots, 12, \dots, 19, 5 \rangle \end{aligned}$$

[٥] في المتتالية الحسابية $\langle 3, 1, \dots, \dots, 81, \dots, هـ \rangle$ إذا كانت $هـ = 14$. فأوجد قيمة كل من ١ ، هـ .

[٦] أوجد ما يلي :

$$\begin{aligned} \text{أ) } & \text{وسطين بين } 5, 26, 6, 34, \quad \text{ب) خمسة أوساط بين } 10, 40, \\ \text{ج) أربعة أوساط بين } 9, 41, \quad \text{د) ثلاثة أوساط بين } 8, 24, 2, 8, \end{aligned}$$

[٧] أوجد ما يأتي :

- أ (مجموع حدود المتتالية التي فيها $ح_١ = ٥$ ، $د = ٣$ وحدها الأخير $ح_٥٦ = ٥٦$.
 ب) المتتالية الحسابية التي فيها $ح_٢ = ٩$ ، وحدها الأخير $ح_٣٦ = ٣٦$ ، ومجموع حدودها ٢٣١ .

[٨] لتكن $\langle ح_١ \rangle = \langle ١ ، ٥ ، ٩ ، \dots \rangle$ (١)

متتالية حسابية و

$\langle ح_٢ \rangle = \langle -١٨ ، -١٠ ، -٢ ، \dots \rangle$ (٢)

متتالية حسابية فإذا كان $ح_١$ ينقص عن $ح_٢$ بمقدار ٥ فأوجد قيمة $د$ وأوجد : $ح_{٣-٥٤}$ في كل منها .

- [٩] أوجد الحد الرابع والعشرين من المتتالية الحسابية $\langle ٣ ، ٥ ، ٧ ، \dots \rangle$ وما رتبة الحد الذي قيمته -٣ من المتتالية الحسابية $\langle ٤٣ ، ٤١ ، ٣٩ ، \dots \rangle$ إذا علم أن مجموع $٢ د$ حداً من المتتالية الأولى يساوي مجموع $د$ حداً من المتتالية الثانية فما قيمة $د$ ؟

- [١٠] كم حداً يلزم أخذه من المتتالية $\langle -١٦ ، -١٥ ، -١٤ ، \dots \rangle$ ابتداء من الحد الأول ليكون مجموعها $= ١٠٠ -$ ؟

- [١١] أوجد المتتالية الحسابية التي مجموع العشرة الحدود الأولى منها يساوي ٢٥٠ ومجموع العشرة الحدود التالية لها يساوي ٤٥٠ .

- [١٢] برهن أن كلاً من المتسلسلتين التاليتين هي متسلسلة حسابية وأوجد مجموعها .

أ ($\sum_{ك=١}^{٢٠} \frac{٢٠}{١-ك}$) ، ب ($\sum_{د=١}^{١٧} \frac{١٧}{١+د}$) .

- [١٣] يبدأ شخص في قيادة دراجة هوائية من أعلى منحدر فيقطع في الثانية الأولى ٩٠ سم وفي كل ثانية بعد ذلك يقطع مسافة تزيد عن المسافة التي قطعها في الثانية السابقة لها مباشرة بمقدار ١٢٠ سم . فإذا وصل الشخص إلى نهاية المنحدر بعد ٢٠ ثانية . فما هو طول المنحدر بالمتر ؟

- [١٤] سقط جسم من السكون رأسياً في الفضاء فقطع في الثانية الأولى ١٦ قدماً ثم قطع ٣٢ قدماً زيادة في كل ثانية عن الثانية السابقة لها مباشرة فما هي المسافة التي يقطعها الجسم في ١١ ثانية ؟ وما هي المسافة المقطوعة في س من الثواني ؟

المتتالية الهندسية

٣ : ٢

المتتالية $\langle ١, ٤, ٧, ١٠, \dots \rangle$ هي متتالية حسابية حيث إن الفرق بين أي حدين متتاليين ثابت .
 بينما المتتالية : $\langle ١, ٢, ٤, ٨, ١٦, \dots \rangle$ ليست متتالية حسابية، حيث إن الفرق بين أي حدين متتاليين فيها ليس ثابتاً ولكن إذا دققنا النظر في حدود المتتالية نجد أن نسبة أي حد إلى الحد السابق له ثابتة ، فنسبة الحد الثاني إلى الأول $= ٢ : ١$ ونسبة الحد الثالث إلى الحد الثاني $= ٤ : ٢ = ٢ : ١$ ، وهكذا . تسمى مثل هذه المتتالية متتالية هندسية .

تعريف (٣-٦)

المتتالية $\langle ح_١, ح_٢, ح_٣, \dots \rangle$ تسمى متتالية هندسية إذا وجد عدد حقيقي $م \neq ٠$ بحيث يكون :

$$م = \frac{ح_{١+٢}}{ح_٢} = \dots = \frac{ح_٣}{ح_٢} \quad \text{حيث } ٢ \in \mathbb{N}^*$$

، ويسمى $م$ أساس المتتالية الهندسية.

مثال (٣-٢٢)

- أ) $\langle ١, ٣, ٩, ٢٧, ٨١, \dots \rangle$ متتالية هندسية لانهاية حدها الأول ١ ، وأساسها ٣ .
- ب) $\langle \frac{١}{٤}, \frac{١}{٨}, \frac{١}{١٦}, \frac{١}{٣٢}, \dots \rangle$ متتالية هندسية لانهاية حدها الأول $\frac{١}{٤}$ وأساسها $\frac{١}{٢}$.
- ج) $\langle ٤, \frac{٤}{١٠}, \frac{٤}{١٠٠}, \dots \rangle$ متتالية هندسية نهائية حدها الأول ٤ وأساسها $\frac{١}{١٠}$.
- د) $\langle \frac{١٠}{٣}, ١, ٠,٣, ٠,٠٩, ٠,٠٢٧, \dots \rangle$ متتالية هندسية حدها الأول $\frac{١٠}{٣}$ وأساسها ٠,٣ .

ملاحظة : المتتالية الهندسية ليس فيها حد يساوي الصفر .

تأمل المتتاليات التالية :

$$\langle \dots, \sqrt[٣]{٢}, \sqrt[٣]{٦}, \sqrt[٣]{١٨}, \dots \rangle$$

$$(ب) \langle -3, 0, 3, 6, \dots \rangle$$

$$(ج) \langle 8, 12, 16, 20, 23, \dots \rangle$$

$$(د) \langle 2, 4, 5, 10, \dots \rangle$$

$$(هـ) \langle (-1)^{n+1} \rangle, \quad \text{و } \exists \text{ ط}^* .$$

تجد أن: (أ)، (ج)، (هـ) متتاليات هندسية، أما (ب) متتالية حسابية، وأما (د) فليست حسابية ولا هندسية.

الحد العام للمتتالية الهندسية :

إذا كانت $\langle \text{ح}_n \rangle$ متتالية هندسية أساسها r فإن : $r = \frac{\text{ح}_{n+1}}{\text{ح}_n}$ لكل n في مجال المتتالية .
أي أن : $\text{ح}_{n+1} = r \cdot \text{ح}_n$ ، وبالتالي فإن :

$$\text{ح}_1 = r \cdot \text{ح}_0$$

$$\text{ح}_2 = r \cdot \text{ح}_1 = r^2 \cdot \text{ح}_0$$

$$\text{ح}_3 = r \cdot \text{ح}_2 = r^3 \cdot \text{ح}_0$$

وهكذا.....

تعريف (٣-٧)

إذا كانت $\langle \text{ح}_n \rangle$ متتالية هندسية أساسها r فإن $\text{ح}_n = r^{n-1} \cdot \text{ح}_1$ ، n رتبة الحد .

مثال (٣-٢٣)

اكتب المتتالية الهندسية التي حدها الأول ١ ، وأساسها ٢ ، ثم أوجد كلاً من ح_2 ، ح_3 .

الحل :

$$\text{ح}_1 = 1, \quad r = 2$$

$$\text{ح}_2 = 2, \quad \text{ح}_3 = 4, \quad \dots$$

المتتالية الهندسية هي : $\langle 1, 2, 4, \dots \rangle$

$$\therefore \text{ح}_n = r^{n-1} \cdot \text{ح}_1$$

$$\therefore \text{ح}_2 = r^{2-1} \cdot \text{ح}_1 = 2^1 \cdot 1 = 2$$

$$\text{ح}_3 = r^{3-1} \cdot \text{ح}_1 = 2^2 \cdot 1 = 4$$

مثال (٣-٢٤)

أوجد الحدين السابع والثاني عشر للمتتالية الهندسية : $\langle 12, 6, 3, \dots \rangle$

الحل :

$$\begin{aligned} \text{مر} &= \frac{6}{12} = \frac{1}{2} , & \text{ح} &= 12 \\ \text{ح} &= \text{مر}^{-1} \\ \text{ح} &= \frac{1}{\text{مر}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \\ \text{ح} &= \frac{1}{\text{مر}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \\ \text{ح} &= \frac{1}{\text{مر}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \end{aligned}$$

مثال (٣ - ٢٥)

< ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٦ ، ... > متتالية هندسية ، أوجد رتبة الحد الذي قيمته ٥٤ .

الحل :

$$\begin{aligned} \text{المعلوم قيمة ح} &= ٥٤ \text{ و المطلوب إيجاد } \\ \text{ح} &= \text{مر}^{-1} , & \text{ح} &= ٢ , & \text{مر} &= ٣ \\ \therefore ٥٤ &= \text{مر}^{-1} (٢) \end{aligned}$$

$$\text{مر}^{-1} (٢) = ٢٧$$

$$\frac{١-٣}{٢} = ٣$$

∴ الأساسين متساويان

$$\therefore \frac{١-٣}{٢} = ٣ \iff ١-٣ = ٦$$

$$\therefore ٧ = ٣$$

∴ ح = ٥٤ رتبة الحد المعني هي السابع .

مثال (٣ - ٢٦)

أوجد المتتالية الهندسية التي فيها ح = ٣ ، ح = ٨١ ، ثم أوجد الحد الثامن .

الحل :

$$\begin{aligned} \therefore \text{ح} &= ٣ & \therefore \text{ح} &= ٣ \\ \therefore \text{ح} &= ٨١ & \therefore \text{ح} &= ٨١ \end{aligned}$$

بقسمة (٢) على (١) نحصل على

$$٣ - = م٣ \iff ٣ - = ٢(٣ -) = ٢٧ - = م٣$$

$$\therefore ح١ - = \frac{1}{٣} \quad (من (١) بالتعويض عن م٣)$$

$$\therefore ح٢ = ١ ، \quad ح٣ - = ٣ ، \dots$$

إذن المتتالية الهندسية هي : $\langle \dots ، ٣ - ، ١ ، \frac{1}{٣} - \rangle$

$$ح٨ = ح١ م٧ = ح١ - = \frac{1}{٣} \times (٣ -) = ٧٢٩ .$$

مثال (٢٧ - ٣)

سقطت كرة رأسياً من ارتفاع معين ، فإذا كانت الكرة ترتد كل مرة عند الاصطدام بالأرض إلى أعلى ارتفاع قدره $\frac{٢}{٣}$ الارتفاع السابق له مباشرة، وكان الارتفاع الذي ارتدت إليه بعد الاصطدام الأول هو ٥ أقدام . فما الارتفاع الذي ترتد إليه الكرة بعد الصدمة السادسة ؟

الحل :

الارتفاع الذي ترتد إليه الكرة بعد الصدمة الأولى = ٥ أقدام

الارتفاع الذي ترتد إليه الكرة بعد الصدمة الثانية = $٥ \times \frac{٢}{٣}$ قدم

الارتفاع الذي ترتد إليه الكرة بعد الصدمة الثالثة = $٥ \times (\frac{٢}{٣})^٢$ قدم

الارتفاعات التي ترتد إليها الكرة تكون متتالية هندسية :

$$\langle ٥ ، ٥ \times (\frac{٢}{٣}) ، ٥ \times (\frac{٢}{٣})^٢ ، \dots \rangle$$

الارتفاع الذي ترتد إليه الكرة عقب الاصطدام السادس هو ح٦ في هذه المتتالية .

$$\therefore ح٦ = ح١ م٥ = (٣ -) \times (\frac{٢}{٣})^٥ = \frac{١٦٠}{٢٤٧} \approx ٠,٦٨٥ \text{ قدم}$$

بعض خواص المتتالية الهندسية :

١ ■ إذا كانت $\langle ح١ ، ح٢ ، ح٣ ، \dots ، ح٥ \rangle$ حدود متتالية هندسية فإنها تشكل تناسباً متسلسلاً ،

$$\text{أي أن : } \frac{ح٢}{ح١} = \frac{ح٣}{ح٢} = \dots = \frac{ح٥}{ح٤} = \text{الأساس (م)}$$

■ ٢ لتكن $\langle \text{ح}_١، \text{ح}_٢، \text{ح}_٣، \dots \rangle$ متتالية هندسية فإن $\langle \text{ك}_١، \text{ك}_٢، \text{ك}_٣، \text{ك}_٤، \dots \rangle$ و $\langle \frac{\text{ح}_١}{\text{ك}_١}، \frac{\text{ح}_٢}{\text{ك}_٢}، \frac{\text{ح}_٣}{\text{ك}_٣}، \dots \rangle$ حيث $\text{ك} \neq ٠$ تكونان متتاليتين هندسيتين

لهما نفس أساس المتتالية الأصلية .

■ ٣ إذا كانت $\langle \text{ح}_١، \text{ح}_٢، \text{ح}_٣، \dots \rangle$ متتالية هندسية أساسها م . ولتكن رتبة $\text{ح}_٣$ بالنسبة للحد $\text{ح}_١$ هي ك ورتبة الحد $\text{ح}_٣$ بالنسبة للحد $\text{ح}_١$ هي ك . ففي المتتالية الهندسية التي حدها الأول $\text{ح}_١$ وحدها الأخير $\text{ح}_٣$ نجد أن :

$$\text{ح}_٣ = \text{ح}_١ \cdot \text{م}^{١-\text{ك}} \quad (١)$$

وكذلك في المتتالية الهندسية التي حدها الأول $\text{ح}_١$ وحدها الأخير $\text{ح}_٣$ نجد أن :

$$\text{ح}_٣ = \text{ح}_١ \cdot \text{م}^{١-\text{ك}} \quad (٢)$$

وبقسمة العلاقتين (١) ، (٢) طرفاً على طرف نجد أن :

$$\frac{\text{ح}_٣}{\text{ح}_١} = \frac{\text{ح}_٣}{\text{ح}_١} \quad \text{أي أن :}$$

$$\text{ح}_٣ = \text{ح}_١ \cdot \text{م}^{١-\text{ك}} = \text{الحد الأول} \times \text{الحد الأخير} .$$

أي أن حاصل ضرب كل حدين متساويي البعد عن الحد الأول والأخير في متتالية هندسية ثابت ويساوي حاصل ضرب الحد الأول في الحد الأخير .

■ ٤ إذا كانت $\langle \text{م}، \text{ب}، \text{ج}، \text{د}، \dots، \text{و}، \text{ك}، \text{ل} \rangle$ متتالية هندسية أساسها م ، وعدد حدودها د فإن :

$$\frac{\text{ب}}{\text{م}} = \text{م}^{(١)} \dots \dots \dots ، \quad \frac{\text{ج}}{\text{ب}} = \text{م}^{(٢)} \dots \dots \dots$$

وبمقارنة (١) ، (٢) نجد أن

$$\frac{\text{ج}}{\text{ب}} = \frac{\text{ب}}{\text{م}} \Leftrightarrow \text{ب}^٢ = \text{م} \cdot \text{ج} \quad \text{أو} \quad \sqrt{\text{م} \cdot \text{ج}} = \text{ب}$$

وبالطريقة نفسها نجد أن : $\sqrt{\text{ب} \cdot \text{و}} = \text{ج}$ ومنه نستنتج أن كل حد في متتالية هندسية وسط هندسي بين مجاوريه (ما عدا الأول والأخير) ، والحدود الواقعة بين الحد الأول والأخير تسمى الأوساط الهندسية بينهما .

مثال (٣ - ٢٨)

متتالية هندسية حدها الخامس والسادس على التوالي هما ٨١ ، ٢٤٣ وحدها العاشر (الأخير) ١٩٦٨٣ أوجد أساس المتتالية وحدها الأول .

الحل :

$$\text{الأساس} = \text{م} = \frac{\text{ح}_١٠}{\text{ح}_٥} = \frac{٢٤٣}{٨١} = ٣$$

الحدان $\text{ح}_٥$ ، $\text{ح}_٦$ ، هما حدان متساويا البعد عن الطرفين ومنه :

$$\begin{aligned} \text{ح}_6 \times \text{ح}_1 &= \text{ح}_1 \times \text{ح}_6 \\ 19683 \times \text{ح}_1 &= 243 \times 81 \\ \therefore \text{ح}_1 &= \frac{243 \times 81}{19683} = 1 \end{aligned}$$

مثال (٣ - ٢٩)

أوجد وسطين هندسيين بين -7 ، $\frac{189}{8}$.

الحل :

بإدخال الوسطين الهندسيين نحصل على متتالية مكونة من أربعة حدود فيها $-7 = \text{ح}_1$ ، $\frac{189}{8} = \text{ح}_4$:

$$\text{ح}_2 = \text{ح}_1 \cdot \text{م}^1 \quad \therefore \text{ح}_3 = \text{ح}_1 \cdot \text{م}^2$$

$$\text{ح}_4 = \text{ح}_1 \cdot \text{م}^3 \quad \Leftarrow \frac{189}{8} = -7 \cdot \text{م}^3$$

$$\text{م}^3 = \frac{\frac{189}{8}}{-7} = -\frac{27}{8} \quad \Leftarrow \text{م}^3 = \left(\frac{3}{-2}\right)^3$$

$$\therefore \text{م} = -\frac{3}{2}$$

ويكون الوساطان الهندسيان هما :

$$(-7) \cdot \left(\frac{3}{-2}\right) = \frac{21}{2} ، (-7) \cdot \left(\frac{3}{-2}\right)^2 = -\frac{63}{4}$$

$$\text{أي : } \frac{21}{2} ، -\frac{63}{4} .$$

تدريب (٣ - ٣)

أكمل المتتالية الهندسية الآتية : $3 ، \dots ، \dots ، \dots ، \dots ، 729$.

مجموع د من الحدود الأولى في المتتالية الهندسية :

لتكن $\langle \text{ح}_1 ، \text{ح}_2 ، \text{ح}_3 ، \dots ، \text{ح}_d \rangle$ متتالية هندسية عدد حدودها « د » وأساسها م ، لنرمز إلى مجموع هذه الحدود بالرمز مج_د فنجد أن :

$$\text{مج}_d = \text{مج}_1 + \text{ح}_2 + \text{ح}_3 + \dots + \text{ح}_d = \text{ح}_1 + \text{ح}_2 + \text{ح}_3 + \dots + \text{ح}_d$$

ويسمى هذا المجموع متسلسلة هندسية حدّها الأول ح_1 ، وحدّها النوني ح_d ، ويمكن أن نكتب هذا

المجموع كما يلي :

$$(1) \dots\dots\dots \text{مجم}_3 = {}_1\text{ح} + {}_1\text{م} + {}_2\text{ح} + {}_2\text{م} + \dots + {}_{1-3}\text{ح} + {}_{1-3}\text{م}$$

بضرب طرفي العلاقة (١) في م نجد أن :

$$(2) \dots\dots\dots \text{مجم}_3 \text{م} = {}_1\text{ح} + {}_1\text{م} + {}_2\text{ح} + {}_2\text{م} + \dots + {}_{1-3}\text{ح} + {}_{1-3}\text{م}$$

إذا كانت $\text{م} = 1$ نطرح (١) من (٢) فنحصل على :

$$\text{مجم}_3 \text{م} - \text{مجم}_3 = {}_1\text{ح} - {}_{1-3}\text{ح}$$

$$\text{مجم}_3 (1 - \text{م}) = (1 - \text{م}) {}_1\text{ح}$$

$$(3) \dots\dots\dots \text{مجم}_3 = \frac{{}_1\text{ح} (1 - \text{م})}{1 - \text{م}} \quad \text{حيث } \text{م} \neq 1$$

وإذا كانت $\text{م} = 1$ فإن مجموع د حداً الأولى

$$\text{فإن: } \text{مجم}_3 = {}_1\text{ح} + {}_1\text{م} + {}_2\text{ح} + {}_2\text{م} + \dots + {}_{1-3}\text{ح} + {}_{1-3}\text{م} = \text{د} \text{ حداً } {}_1\text{ح}$$

وكذلك يمكن إيجاد مجم_3 بدلالة ${}_1\text{ح}$ ، ${}_1\text{م}$ كما يلي :

$$\therefore {}_1\text{ح} = {}_{1-3}\text{ح}$$

$$\therefore {}_1\text{م} = {}_{1-3}\text{م}$$

وبالتعويض في (٣) نجد أن :

$$(4) \dots\dots\dots \text{مجم}_3 = \frac{{}_1\text{ح} - {}_{1-3}\text{م}}{1 - \text{م}} \quad \text{حيث } \text{م} \neq 1$$

مما تقدم يتضح أن لقانون مجموع المتتالية الهندسية أربع صور مختلفة .

مثال (٣ - ٣٠)

أوجد مجموع العشرة الحدود الأولى لكل من المتتاليتين الهندسيتين :

$$(أ) < ٨ ، ٢٤ ، ٧٢ ، \dots > \quad ، \quad (ب) < \frac{٢٤٣}{٣٢} ، \frac{٨١-}{١٦} ، \frac{٢٧}{٨} ، \dots >$$

الحل :

$$(أ) \text{ م} = \frac{٢٤}{٨} = \frac{٧٢}{٢٤} = \dots = ٣$$

$$\therefore \text{مج } 3 = \frac{ح_1 (1 - r^3)}{1 - r} , \text{ حيث } r < 1$$

$$\therefore \text{مج } 1 = \frac{(1 - 0.49)8}{2} = \frac{(1 - 0.3)8}{1 - 3} = 236192 .$$

$$\frac{2}{3} - = \dots = \frac{\frac{27}{8}}{\frac{81-}{16}} = \frac{\frac{81-}{16}}{\frac{243}{32}} = r \text{ (ب)}$$

$$\therefore \text{مج } 3 = \frac{ح_1 (1 - r^3)}{1 - r} , \text{ حيث } r \neq 1$$

$$\therefore \text{مج } 1 = \frac{[1 - \frac{1.24}{0.49}] \frac{243}{32}}{\frac{5-}{3}} = \frac{[1 - 0.25(\frac{2}{3} -)] \frac{243}{32}}{(\frac{2}{3} - 1)}$$

$$[\frac{58.25-}{0.49}] \frac{243}{32} = \frac{[\frac{59.49 - 1.24}{0.49}] \frac{243}{32}}{\frac{5-}{3}} =$$

$$. \quad 4,5 \approx \frac{116.05}{2092} = \frac{116.05}{32 \times 81} = \frac{116.05 \times 729}{59.49 \times 32} =$$

مثال (٣١ - ٣)

متتالية هندسية مكوّنة من ٩ حدود، حدها الرابع $\frac{1}{4}$ وحدها السابع $\frac{1}{32}$. أوجد مجموع حدود المتتالية .

الحل :

$$\therefore ح_3 = ح_1 r^2$$

$$\therefore ح_4 = ح_1 r^3 = \frac{1}{4} \dots (١)$$

$$و ح_7 = ح_1 r^6 = \frac{1}{32} \dots (٢)$$

من (١) نجد أن: $ح_1 = \frac{1}{4r^3}$ وبالتعويض في (٢) عن $ح_1$

$$\therefore \frac{1}{32} = r^6 \cdot \frac{1}{4r^3}$$

$$\text{أي أن : } \text{مر}^3 = \frac{4}{32} = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$\text{مر} = \frac{1}{2}$ ، وبالتعويض عن قيمة مر في العلاقة (١) نجد أن :

$$\text{ح}^1 = \frac{8}{4} = \frac{1}{\frac{1}{8} \times 4} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^3 \times 4} = \text{ح}^1$$

$$\text{مج}^3 = \frac{(\text{ح}^1 - \text{مر}^3)}{1 - \text{مر}} \quad \text{حيث } \text{مر} \neq 1$$

$$\frac{\left[\frac{512-1}{512}\right] \times 2}{\frac{1}{2}} = \frac{\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^9\right] \times 2}{1 - \frac{1}{2}} = \text{مج}^9$$

$$\frac{511}{128} = \frac{511 \times 4}{512} =$$

مثال (٣ - ٣٢)

إذا كان مجموع حدود متتالية هندسية ٢٠٥٩ ، وحدها الأول ٦٤ وحدها الأخير ٧٢٩ ؛ فأوجد عدد حدود هذه المتتالية .

الحل :

$$\text{:: مج}^3 = \frac{\text{ح}^1 - \text{مر}^3}{1 - \text{مر}} \quad , \quad \text{مر} \neq 1$$

$$\therefore \frac{729 - \text{مر}^3}{1 - \text{مر}} = 2059$$

$$\therefore 729 - \text{مر}^3 = 2059 - \text{مر}$$

$$\therefore 1330 = \text{مر}^3 \quad \therefore \frac{3}{2} = \frac{1995}{1330} = \text{مر} \quad \therefore$$

$$\text{ح}^1 = \text{مر}^3$$

$$\therefore 729 = \left(\frac{3}{2}\right)^6 \times 64$$

$$\therefore \left(\frac{3}{2}\right)^6 = \frac{729}{64} = \text{مر}^6 \quad \therefore \left(\frac{3}{2}\right)^6 = \text{مر}^6$$

$$\therefore 6 = 1 - 5$$

$$\therefore 7 = 5$$

مثال (٣ - ٣٣)

برهن أن المتسلسلة : $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n$ هي متسلسلة هندسية وأوجد مجموعها .

الحل :

$$u_2 = 2, \quad u_3 = 4, \quad u_4 = 8, \quad \dots$$

$$\therefore r = \frac{u_3}{u_2} = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{لكل } n \in \mathbb{N}^*$$

$\therefore < u_n >$ متتالية هندسية أساسها ٢ ، وحدها الأول ٢

$\therefore 2 + 4 + 8 + \dots$ متسلسلة هندسية .

$$\text{أي أن : } \sum_{n=1}^{\infty} 2^n = 2 + 4 + 8 + \dots$$

$$= \frac{(1 - 2^n) \cdot 2}{1 - 2} = \frac{(1 - 2^n) \cdot 2}{1 - 2} = 2(2^n - 1) = 2^{n+1} - 2$$

مثال (٣ - ٣٤)

عددتان موجبان وسطهما الهندسي ٦ ووسطهما الحسابي ٧,٥ فما هما العددان ؟

الحل :

نفرض أن العددين هما s ، v .

$$\therefore \sqrt{sv} = 6$$

$$\text{أي أن } sv = 36 \quad (1)$$

$$\text{كذلك } \frac{s+v}{2} = 7,5$$

$$\text{أي أن } s+v = 15 \quad (2)$$

وبحل المعادلتين (١) ، (٢) نجد أن :

$$s^2 - 15s + 36 = 0 \iff (s-3)(s-12) = 0$$

$$\therefore s = 3 \quad \text{ومنها } v = 12 \quad \text{أو } s = 12 \quad \text{ومنها } v = 3$$

$\therefore$ العددان هما ٣ ، ١٢ .

تمارين ومسائل (٢-٣)

[١] اكتب الخمسة الحدود الأولى لكل من المتتاليات الهندسية التالية:

أ (حدها الأول ٣ وأساسها ٤ ، ب (حدها الأول ٨ وأساسها $\frac{1}{2}$ ،

[٢] بين نوع المتتاليات الآتية ، ثم أوجد الحد الخامس لكل منها

$$\langle \dots, {}^2(b-1)(b+1), ({}^2b-1), (b+1) \rangle \quad (f)$$

(ب) $\langle \dots, \varepsilon, \sqrt{2}, 2-, 2 \rangle$

$\langle \dots, 24, 4, 23, 8, 23, 2 \rangle$ (جـ)

$$\langle \dots, \gamma \frac{3}{4}, 0 \frac{1}{2}, 3 \frac{1}{4} \rangle \quad (2)$$

[۳] أوجد ما يأتي :

أ) الحدان الثامن والثاني عشر لمتتالية هندسية حدها الأول ٦٤ ، أساسها $\frac{1}{2}$.

(ب) المتتالية الهندسية التي مجموع حديها الأول والثاني يساوي ٧٢ ومجموع حديها الأول والرابع يساوي ٥٦ .

(ج) رتبة الحد الذي قيمته $\frac{1}{27}$ من المتتالية الهندسية : $\langle 3, \sqrt{3}, 1, \dots \rangle$

د) المتتالية الهندسية التي مجموع الثلاثة الحدود الأولى منها هو ٢٦ ومجموع الثلاثة الحدود التالية لها ٧٠٢ .

(هـ) المتتالية الهندسية التي حدها الأول ٩ وحدها السادس - ٢٨٨ .

(و) عدد حدود المتتالية الهندسية : $\langle 10, \dots, 160, 320 \rangle$

[٤] كَوْن المتتاليات الهندسية إذا علم منها ما يأتي :

$$\sqrt[2]{v} = \sqrt{\quad}, \quad \sqrt[3]{v} = \sqrt[3]{\quad}$$

ب) $12,8 = 1,28$ ، $0,025 = 0,25$

(ج) مجموع ثلاثة حدود متتالية منها يساوي ١٤ وحاصل ضربهما يساوي ٦٤ .

د) مجموع حديها الثاني والخامس ٥٨٨ ومجموع حديها الثاني والثالث ٨٤ .

[٥] أي حد من حدود المتتالية :

(أ) $\langle 2, 2, \sqrt{3}, 6, \dots \rangle$ يساوي ٥٤

(ب) $\langle \dots, 2, 4, 8 \rangle$ یساوي $\frac{1}{4}$

[٦] أوجد المتتالية الهندسية التي فيها :

$$20 = 17 \quad , \quad 32 = 17 (1)$$

(ب) ح_۲ = ۲ س ، ح_{۱۱} = ۱۰۲۴ س

[٧] أوجد المتتالية الهندسية التي حدها الثالث يزيد على حدها الثاني بمقدار ١٢ ، وحدها السادس يزيد على حدها الخامس بمقدار ٣٢٤ .

[٨] أوجد قيمة كل من s ، v في المتتالية الهندسية : $\langle ٥ ، s ، v ، ١٣٥ \rangle$

[٩] ثلاثة أعداد تكوّن متتالية هندسية مجموعها ١٩ وإذا أضيف إليها على الترتيب ٣ ، ٥ ، ٦ كُنت النواتج متتالية حسابية . أوجد هذه الأعداد .

[١٠] أوجد ما يلي :

أ (وسطين هندسيين بين ٨ ، ٦٤ .

ب) ثلاثة أوساط هندسية بين $\frac{2}{3}$ ، $\frac{32}{243}$.

[١١] عددان وسطهما الحسابي ٧٥ ، ووسطهما الهندسي ٦٠ أوجد هذين العددين .

[١٢] أوجد ما يأتي :

أ (وسطان هندسيان بين $(m - b)$ ، $(m^2 - b^2)$) .

ب) عددان وسطهما الهندسي يزيد على أحدهما بقدر ٨ ويقل عن الآخر بقدر ٢٤ .

[١٣] الوسط الهندسي بين s ، v هو ٨ والوسط الحسابي بين $\frac{1}{s}$ ، $\frac{1}{v}$ هو $\frac{5}{33}$ أوجد كلا من s ، v .

[١٤] متتالية هندسية حدها الأول ٢ وحدها الأخير ١٢٨ ، فإذا كان مجموع حدود هذه المتتالية يساوي ٢٥٤ ، فأوجد عدد حدودها .

[١٥] في المتتالية الهندسية ٠,١ ، -٠,٤ ، ١,٦ ، ... كم عدد الحدود الأولى التي مجموعها - ٨١,٩ .

[١٦] بيّن نوع المتتالية التي حدها العام هو $3^n(2)^n$ ، ثم أوجد مجموع الخمسة الحدود الأولى منها .

[١٧] لتكن $\langle (s-2) ، (s-1) ، (3s-5) \rangle$ متتالية هندسية ، فما قيمة s ؟

[١٨] إذا تضاعفت زراعة البكتيريا كل يوم ، فاحسب كم يكون عدد البكتيريا بعد عشرة أيام إذا كان عددها في اليوم الأول ٥٠٠ .

[١٩] خزان مياه فارغ صُبَّ فيه في اليوم الأول ٢٤٣ جالوناً من الماء ، ثم صُبَّ في كل يوم قدر ما صُبَّ في اليوم السابق له مرّةً وثلاث . أوجد سعة الخزان ، علماً بأنه امتلأ في مدة ٦ أيام تماماً .

[٢٠] أوجد ما يأتي :

أ ($\frac{6}{1=3}$) - ($\frac{1}{3}$) ، ب ($\frac{8}{1=3}$) - ($-\sqrt{3}$) .

الدالة الأسية

٤ : ١

تعرفت على الدالة العددية حيث يظهر متغيرها المستقل في أساساتها أما أسسها فتكون أعداداً (غير متغيرات) وفي هذه الوحدة سنتعرف على دوال أساساتها أعداد (غير متغيرات) ولكن تظهر متغيراتها المستقلة في أسسها .

تعريف (٤-١)

نسَمِّي الدالة : $ص = م^س$ ؛ حيث $م > ٠$ ، $م \neq ١$ ، $س \in ح$ دالة أُسِّيَّة .

فنجِد أن :

$$ص = م^٢ \text{ دالة أُسِّيَّة أساسها } (٢) ، \text{ وأُسُّها } (س) ،$$

$$ص = م^{١-س} \text{ دالة أُسِّيَّة أساسها } (٣) \text{ وأُسُّها } (س-١) ،$$

$$ص = م^{(\frac{1}{٢})} \text{ دالة أُسِّيَّة أساسها } (\frac{1}{٢}) \text{ وأُسُّها } (٥ س) ،$$

$$ص = م^{٥-س} \text{ دالة أُسِّيَّة حدُّها الأول } ٥ \text{ أساسه } (٥) \text{ وأُسُّه } (س) ، \text{ وحدُّها الثاني سالب بأساس } ٣ \text{ وأُسُّه } (١) .$$

تدريب (٤-١)

ميِّز الدوال الأُسِّيَّة فيما يأتي :

- ١ ■ $ص = ٢ + ٣ س$.
- ٢ ■ $د(س) = ٢ + ٣ س^٢$.
- ٣ ■ $د(س) = ٤ س$.
- ٤ ■ $د(س) = (\frac{1}{٢})^{١-س}$.
- ٥ ■ $ص = \frac{٢}{١-س}$.
- ٦ ■ $ص = ٣ س^٣ - ٢ س^٢ + س$.
- ٧ ■ $ص = (\frac{٤}{٣})^{س^٢}$.
- ٨ ■ $د(س) = ٢ - \frac{1}{٢} س$.

رسم بيان الدالة الأُسِّيَّة :

لرسم الدالة الأُسِّيَّة نتبع الخطوات التالية :


- ١ ■ نأخذ قيماً اختيارية للمتغير المستقل (س) .
- ٢ ■ نعوض بقيم المتغير المستقل في الدالة لنحصل على المتغير التابع ص أو د(س) .
- ٣ ■ نضع المعلومات الناتجة في جدول ، ثم نحدّد النقاط الناتجة في المستوى الإحداثي .
- ٤ ■ نصل بين النقاط الناتجة لينتج التمثيل البياني للدالة المعطاة .

مثال (٤ - ١)

ارسم بيان الدالة : $v = 3^s$.

الحل :

$v = 3^s$.




س	٣	٢	١	٠	١-	٢-	٣-
ص	٢٧	٩	٣	١	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{27}$

مثال (٤ - ٢)

ارسم بيان الدالة $v = (\frac{1}{3})^s$.

الحل :

$$v = (\frac{1}{3})^s \Leftrightarrow v = 3^{-s}$$



س	٣	٢	١	٠	١-	٢-	٣-
د(س)	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	١	٣	٩	٢٧

ملاحظات : تأمل بيان الدالتين السابقتين ماذا تلاحظ .

من الشكلين (٤ - ١) ، (٤ - ٢) نلاحظ أن :

١ ■ مجموعة تعريف الدالة الأسية $=] -\infty , \infty [$

٢ ■ مدى الدالة الأسية $=] 0 , \infty [$ ،

٣ ■ بيان الدالة الأسية $v = 3^s$ يمر بالنقطة (٠ ، ١) $\forall s \in \mathbb{R}$ ، $3^s \neq 1$

٤ ■ إذا كانت $1 < 3^s$ تكون الدالة الأسية $v = 3^s$ تزايدية وإذا كان $1 > 3^s$ تكون الدالة

الأسية $v = 3^s$ تناقصية .

٥ ■ بيان الدالة الأسية : $v = 3^{-s}$ هو انعكاس لبيان الدالة الأسية $v = (\frac{1}{3})^s$ على محور الصادات .

تمارين ومسائل (٤-١)

[١] لتكن د(س) = s^2 أثبت أن :

$$\text{أ) } د(س_1 + س_2) = د(س_1) \times د(س_2) \quad , \quad \text{ب) } د(س_1 - س_2) = \frac{د(س_1)}{د(س_2)}$$

$$\text{ج) } (د(س))^3 = د(د(س))$$

[٢] ارسـم بيان كل من الدوال التالية :

$$\text{أ) } ص = 2 - س^3 \quad , \quad \text{ب) } ص = 2 - س^3$$

$$\text{ج) } ص = \left(\frac{3}{2}\right)^س \quad , \quad \text{د) } ص = \left(\frac{3}{2}\right)^{-س}$$

$$\text{هـ) } ص = 3^س \quad , \quad \text{و) } ص = 9^س$$

$$\left. \begin{array}{l} 2 - س \geq ص \geq 0 \\ 2 > س > ص \end{array} \right\} = د(س)$$

اللوغاريتمات وخواصها

٤ : ٢

درسنا فيما سبق الدالة الأسية وسندرس في هذا البند الدالة اللوغاريتمية ، وقبل ذلك سوف نتعرّف على اللوغاريتم .

من دراستنا للأسس تعرفنا على الصورة الأسية : $س = ٢^ج$ حيث إن : العدد س = ٢ مرفوع للأس ج ومن هذه الصيغة نستطيع تعريف اللوغاريتم بالشكل التالي :

تعريف (٤-٢)

لوغاريتم أي عدد لأساس معلوم هو « الأس » الذي يرفع له الأساس المعلوم كي يعطينا العدد .

فنجـد أن :

$$٢٧ = ٣^٣ \Leftrightarrow \text{لوغاريتم } ٢٧ \text{ للأس } ٣ \text{ يساوي } ٣ \quad , \quad \text{وتكتب } ٣ = \log_٣ ٢٧$$

$$٨١ = ٣^٤ \Leftrightarrow \text{لوغاريتم } ٨١ \text{ للأس } ٣ \text{ يساوي } ٤ \quad , \quad \text{وتكتب } ٤ = \log_٣ ٨١$$

$$\text{أو } س = ٢^ج \Leftrightarrow \text{لوغاريتم } س \text{ للأس } ٢ \text{ يساوي } ج \quad , \quad \text{وتكتب } ج = \log_٢ س$$

هذه العبارات توضح أن لوغاريتم تعني (أس) أي أن اللوغاريتم هو اسم آخر للأس ، ونرمز للوغاريتم بالرمز (لو) ونعبّر عن الأس بالصورة اللوغاريتمية كما يلي :

$$\text{الأس} = \text{لو} \text{ العدد} = \log_{\text{الأساس}}$$

مثال (٤ - ٣)

اكتب ما يأتي بالصيغة اللوغاريتمية :

- (١) $9 = 2^3$ (٢) $1000 = 3^{10}$ (٣) $10^{-2} = 0,01$ (٤) $81 = 3^{-4}$ (٥) $\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2}$.

الحل :

- (١) $9 = 2^3$ $\Leftrightarrow$ لو $9 = 2^3$ (٢) $1000 = 3^{10}$ $\Leftrightarrow$ لو $1000 = 3^{10}$ (٣) $10^{-2} = 0,01$ $\Leftrightarrow$ لو $10^{-2} = 0,01$ (٤) $81 = 3^{-4}$ $\Leftrightarrow$ لو $81 = 3^{-4}$ (٥) $\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2}$ $\Leftrightarrow$ لو $\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2}$.

مثال (٤ - ٤)

أوجد قيمة كل مما يأتي :

١. لو $(\sqrt[5]{5})^7$ ٢. لو $(\sqrt[5]{5})^7$ ٣. لو $\frac{1}{81}$ ٤. لو 343 ٥. لو $\sqrt[7]{7}$ ٦. لو $\frac{1}{1000}$

الحل :

- (١) لو $(\sqrt[5]{5})^7 = \frac{7}{5}$ (٢) لو $(\sqrt[5]{5})^7 = 7$ (٣) لو $\frac{1}{81} = -4$ (٤) لو $343 = 7$ (٥) لو $\sqrt[7]{7} = \frac{12}{5}$ (٦) لو $\frac{1}{1000} = 3$

مثال (٥ - ٤)

حل المعادلات التالية :

- أ (لو $س = 4$) ب (لو $(س^2 - 4) = 3$) ج (لو $\frac{1}{16} = 2 - س$) د (لو $س^2 = 4$) هـ (لو $(س^2 - 2س + 5) = 3$)

الحل :

$$\frac{1}{16} = s \iff s^{-2} = s \iff s = 0$$

$$\begin{aligned} ١٢ = \text{س}٢ &\iff ٨ + ٤ = \text{س}٢ &\iff ٣٢ = ٤ - \text{س}٢ &\iff ٣ = \text{لو}٢(٤ - \text{س}٢) \\ & & & \iff \text{س}٦ = . \end{aligned}$$

$$(\text{ج}) \quad \frac{1}{\rho_s} = \frac{1}{\rho_{-}} \Leftrightarrow \frac{1}{\rho_s} = \frac{1}{\rho_{-}} \Leftrightarrow \rho_{-} = \rho_s \Leftarrow \rho_{-} = \rho_s$$

$$. \quad 9 = s \iff {}^2 9 = {}^2 s \iff {}^2 ({}^2 3) = {}^2 s \iff {}^4 3 = {}^2 s \iff \text{د) } \varepsilon = {}^2 s_3$$

$$٢ = ٥ + ٢ - ٢ \Leftrightarrow ٣ = (٥ + ٢ - ٢) \text{ لو } ٢$$

$$٠ = (١ + س) (٣ - س) \iff ٠ = ٣ - س^٢ - س^٢ \iff ٨ = ٥ + س^٢ - س^٢$$

←= س - ۳ = ۰ ومنها س = ۳

أو $s + 1 = 0$ ومنها $s = -1$

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \{-1, 3\}$$

خواص اللوغاريتمات :

فيما يلي قوانين اللوغاريتمات والتي ستساعدنا في حل التمارين والمسائل :

$A \neq B$ ، $j \in \mathbb{Z}^+$ ، $j \neq 1$: فأن :

■ ١ لو ١ = ٠ لأن ج' = ١

۲ ■ لوج = ۱ لأن جا = ج

۳. **لو ج م = م**

■ ٤. لو^١ = م لو^٢

■ ٥. لو (١ × ب) = لو ١ + لو ب

$$\blacksquare ٦ \quad \text{لو} \frac{1}{5} = \text{لو} ١ - \text{لو} ٤$$

۷. $\frac{1}{\text{لو جـ}} = \text{لوب جـ}$

لنبرهن القانونين الخامس والسادس ، ونترك البقية كتدريبات

القانون الخامس : لو $(\text{ب} \times \text{أ}) = \text{لو} \text{أ} + \text{لو} \text{ب}$

البرهان : نضع لو $\text{أ} = \text{س}$ $\Leftarrow \text{لو} \text{أ} = \text{س} \Leftarrow \text{لو} \text{أ} = \text{س}$ (١)

، لو $\text{ب} = \text{ص}$ $\Leftarrow \text{لو} \text{ب} = \text{ص} \Leftarrow \text{لو} \text{ب} = \text{ص}$ (٢)

من (١)، (٢) $\Leftarrow \text{لو} (\text{ب} \times \text{أ}) = \text{لو} \text{أ} + \text{لو} \text{ب} = \text{س} + \text{ص}$

$\Leftarrow \text{لو} (\text{ب} \times \text{أ}) = \text{س} + \text{ص}$

$\Leftarrow \text{لو} (\text{ب} \times \text{أ}) = \text{س} + \text{ص}$ وبالتعويض عن س ، ص من (١)، (٢)

$\Leftarrow \text{لو} (\text{ب} \times \text{أ}) = \text{لو} \text{أ} + \text{لو} \text{ب}$.

القانون السادس : لو $\frac{\text{أ}}{\text{ب}} = \text{لو} \text{أ} - \text{لو} \text{ب}$

البرهان : نضع لو $\text{أ} = \text{س}$ $\Leftarrow \text{لو} \text{أ} = \text{س} \Leftarrow \text{لو} \text{أ} = \text{س}$ (١)

، لو $\text{ب} = \text{ص}$ $\Leftarrow \text{لو} \text{ب} = \text{ص} \Leftarrow \text{لو} \text{ب} = \text{ص}$ (٢)

من (١)، (٢) $\Leftarrow \text{لو} \frac{\text{أ}}{\text{ب}} = \text{لو} \text{أ} - \text{لو} \text{ب} = \text{س} - \text{ص}$

$\Leftarrow \text{لو} \frac{\text{أ}}{\text{ب}} = \text{س} - \text{ص}$ وبالتعويض عن س ، ص من (١)، (٢)

$\Leftarrow \text{لو} \frac{\text{أ}}{\text{ب}} = \text{لو} \text{أ} - \text{لو} \text{ب}$

مثال (٤ - ٦)

أوجد قيمة لو ١٢٥ .

الحل :

لو ١٢٥ = لو ٥^٣ = ٣ لو ٥ = ٣ لو ١ × ٣ = ٣ .

مثال (٤ - ٧)

اثبت أن : لو ٨ + لو ٤ = ٥

أ (الطرف الأيمن = لو ٨ + لو ٤

$$= \text{لو } ٢٢ + \text{لو } ٢٢ \iff \text{الطرف الأيمن} = ٣ + ٢ \iff \text{الطرف الأيمن} = ٥ .$$

مثال (٨ - ٤)

أوجد قيمة كل من: (أ) $\text{لو } \frac{\text{س}}{\text{ص}} + \text{لو } ٢\text{س} + \text{لو } \left(\frac{\text{ص}}{\text{س}}\right)^٣ - \text{لو } ٢\text{ص}$

$$\text{ب (لو } \frac{٢٥}{١٢٥} + \text{لو } ٢٥ \text{ ج) لو } \frac{٤}{٥} + \text{لو } \frac{١٠}{٢} + \text{لو } \frac{٣}{٨} \text{ د) لو } ٩ - \text{لو } ٨١ + \text{لو } ٢٧$$

الحل :

$$\begin{aligned} \text{أ (المقدار} &= \text{لو } \text{س} - \text{لو } \text{ص} + ٢\text{لو } \text{س} + ٣\text{لو } \frac{\text{ص}}{\text{س}} - ٢\text{لو } \text{ص} \\ &= \text{لو } \text{س} - \text{لو } \text{ص} + ٢\text{لو } \text{س} + ٣\left(\text{لو } \text{ص} - \text{لو } \text{س}\right) - ٢\text{لو } \text{ص} \\ &= ٠ . \end{aligned}$$

$$\text{ج) المقدار} = \text{لو } ٤ - \text{لو } ٥ + \text{لو } ٥ + \text{لو } ٣ - \text{لو } ٨$$

$$\begin{aligned} &= ٢\text{لو } ٢ + \text{لو } ٣ - \text{لو } ٣٢ \\ &= \text{لو } ٣ - \text{لو } ٢ \\ &= \text{لو } \frac{٣}{٢} \end{aligned}$$

$$\text{ب (المقدار} = \text{لو } ٢٥ - \text{لو } ١٢٥ + ٢\text{لو } ٥$$

$$\begin{aligned} &= \text{لو } ٥ - \text{لو } ٥ + ٢\text{لو } ٥ \\ &= ٢\text{لو } ٥ - \text{لو } ٥ + ٢ \\ &= ٣ - ٤ \\ &= ١ \end{aligned}$$

$$\text{د (المقدار} = \text{لو } ٣ - \text{لو } ٣٣ + \text{لو } ٣٣$$

$$\begin{aligned} &= ٣ + ٤ - ٢ \\ &= ١ . \end{aligned}$$

مثال (٩ - ٤)

أثبت أن : $\text{لو } (١ - ١) - \text{لو } (١ + ١) = \text{لو } (١ + ٢)$

الحل :

$$\begin{aligned} \text{الطرف الأيمن} &= \text{لو } \frac{(١ - ١)(١ + ١)}{(١ - ١)(١ + ١)} = \text{لو } \frac{(١ + ٢)(١ - ١)(١ + ١)}{(١ - ١)(١ + ١)} \\ &= \text{الطرف الأيسر} . \end{aligned}$$

مبرهنة هامة :

$$\text{لأي أساس } a, b \in \mathbb{R}^+ / \{1\}, a < b, \text{ فإن : } \frac{\log_a b}{\log_b a} = 1$$

البرهان :

$$\begin{aligned} \text{نضع } \log_a b = x &\iff a^x = b \iff a^{\frac{1}{x}} = \sqrt[x]{b} \iff \log_a \sqrt[x]{b} = 1 \\ &\iff \frac{\log_a b}{x} = 1 \iff \frac{\log_a b}{\log_a b} = 1 \iff 1 = 1 \end{aligned}$$

نتائج :

$$(1) \quad \log_a a = 1, \quad \frac{\log_a b}{\log_b a} = 1$$

$$(2) \quad \log_a b \times \log_b a = 1$$

مثال (٤ - ١٠)

$$\text{أثبت أن : } \log_{16} 256 \times \log_{\frac{1}{4}} 16 \times \log_4 2 = 256$$

الحل :

$$(\log_{16} 256 \times \log_{\frac{1}{4}} 16 \times \log_4 2) = \log_{\frac{1}{4}} 256 \times \log_4 2 = \log_{\frac{1}{4}} 2 = 2$$

تمارين ومسائل (٤-٢)

[١] اكتب ما يلي بالصيغة اللوغاريتمية :

$$\begin{array}{lll} \text{أ) } 27 = 49 & \text{ب) } 10^{-2} = 0,01 & \text{ج) } \sqrt[3]{6} = 6^{\frac{1}{3}} \\ \text{د) } (125)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{25} & \text{هـ) } 8 = \left(\frac{1}{4}\right)^{-3} & \text{و) } 1 = 10^0 \end{array}$$

[٢] اكتب ما يلي بالصيغة الأسية :

$$\begin{array}{lll} \text{أ) } 2 = 36^{\frac{1}{6}} & \text{ب) } 4 = 36^{\frac{1}{6}} & \text{ج) } \sqrt[5]{5} = 5^{\frac{1}{5}} \\ \text{د) } 2 = \frac{1}{9^{\frac{1}{3}}} & \text{هـ) } 10 = 10^1 & \text{و) } 1 = (3-3)^0 \end{array}$$

[٣] أوجد قيمة كل مما يأتي :

$$\begin{array}{lll} \text{أ) } 625^{\frac{1}{5}} & \text{ب) } \frac{1}{121^{\frac{1}{11}}} & \text{ج) } 1000^{\frac{1}{10}} \\ \text{د) } 100^{\frac{1}{2}} & \text{هـ) } 1000^{\frac{1}{10}} & \text{و) } 100^{\frac{1}{2}} \end{array}$$

[٤] أوجد قيمة س في كل مما يأتي :

$$\begin{array}{lll} \text{أ) } 2 = 10^{\frac{1}{2}} & \text{ب) } 2 = 10^{\frac{1}{2}} & \text{ج) } 3 = 27^{\frac{1}{3}} \\ \text{د) } 3 = 27^{\frac{1}{3}} & \text{هـ) } 3 = 27^{\frac{1}{3}} & \text{و) } 3 = 27^{\frac{1}{3}} \end{array}$$

[٥] حل المعادلات التالية :

$$\begin{array}{ll} \text{أ) } 10 = (8 - 5) & \text{ب) } 10 = (9 - 5) + 10(3 - 4) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{ج) } 10 = \frac{1}{25} & \text{د) } 2 = \frac{1}{25} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{هـ) } 10 = (5 - 3) & \text{و) } 10 = (3 - 7) + 10(3 + 1) \end{array}$$

[٦] ضع كلاً مما يأتي في أبسط صورة :

$$\begin{array}{lll} \text{أ) } 125^{\frac{1}{5}} & \text{ب) } \frac{1}{5} & \text{ج) } \sqrt[5]{5} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{د) } 25 = 5^2 & \text{هـ) } 3 = 9^{\frac{1}{3}} - 27^{\frac{1}{3}} + 18^{\frac{1}{3}} \end{array}$$

$$(و) - \log_{10} 3 - \log_{10} 3^{-1} \quad (ز) 3 \log_{10} 9^2 - \log_{10} 15^2 + \log_{10} 12^2$$

$$(ح) \log_{10} 6 + \log_{10} 5 - \log_{10} \frac{132}{121} + \log_{10} 12 \quad (ط) 3 \log_{10} 2 + 5 \log_{10} 3$$

$$(ع) \log_{10} \sqrt[4]{729} \sqrt[3]{9} \sqrt[4]{\left(\frac{1}{27}\right)^3} \quad (ل) \frac{\log_{10} 343 - \log_{10} 125 - \log_{10} 625 - 1}{\log_{10} 16807 - \log_{10} (125)^3 + \log_{10} 81 + 1}$$

[٧] إذا علمت أن $\log_{10} 2 = 0,301$ ، $\log_{10} 3 = 0,477$. احسب كلا من :

$$(أ) \log_{10} 32 \quad ، \quad (ب) \log_{10} 24 \quad ، \quad (ج) \log_{10} \frac{10}{27} \quad ، \quad (د) \log_{10} \sqrt[3]{2}$$

[٨] أوجد قيمة كل مما يأتي :

$$(أ) \log_{10} 1000 \quad ، \quad (ب) \log_{10} 8 \quad ، \quad (ج) \log_{10} \sqrt[3]{125} \quad ، \quad (د) \log_{10} \frac{1}{25}$$

الدالة اللوغاريتمية

٤ : ٣

تعريف (٤-٣)

تسمى الدالة $\log_p$ دالة لوغاريتمية إذا وفقط إذا كان $p = \log_p s$ حيث $s \in \mathbb{R}^+$ ، $p \neq 1$

نلاحظ مما سبق أن $\log_p s = \log_p s$ هي الدالة العكسية للدالة الأسية $s = \log_p s$ ، أي أنه إذا كانت $\log_p s = \log_p s$ ، فإن $\log_p s = \log_p s$ ، ويأخذ شكل الدالة اللوغاريتمية المقدار الجبري ، وليس بالضرورة أن يكون مكوناً من حدٍّ جبري واحد فقد يكون مكوناً من حدين أو أكثر . فنجد أن : $\log_p (3s + 1) = \log_p s$ ، $\log_p (s^2 - 8) = \log_p (s^2 + 9) = \log_p s$ جميعها دوال لوغاريتمية .

مثال (٤-١١)

أوجد مجموعة تعريف الدالة : $\log_p (3s + 1)$

الحل :

$$ص \text{ معرفة عندما } 3s + 1 > 0 \Leftrightarrow 3s > -1 \Leftrightarrow s > -\frac{1}{3}$$

$$\text{مجموعة التعريف } = \left[-\frac{1}{3}, \infty \right)$$

مثال (٤ - ١٢)

أوجد مجموعة تعريف الدالة : $v = \underset{p}{\text{لو}} (س - ٩)$

الحل :

ص معرفة عندما $س - ٩ < ٠ \iff س < ٩ \iff |س| < ٩ \iff س < ٣ \iff س < ٣ \text{ أو } س > -٣$
 $\iff$ مجموعة التعريف $= [-\infty, ٣[\cup]٣, \infty[$

يمكن إيجاد مجموعة تعريف الدالة اللوغاريتمية بوضع ما هو أمام لو (اللوغاريتم) أكبر من الصفر.

رسم بيان الدالة اللوغاريتمية $v = \underset{p}{\text{لو}} س$:

- (١) لرسم بيان الدالة اللوغاريتمية، نتبع خطوات رسم الدالة الأسية :
- (٢) نكون جدولاً لقيم اختيارية للمتغير $س$.
- (٣) نحسب قيم v الناتجة عن العلاقة : $v = \underset{p}{\text{لو}} س$.
- (٤) نحدد النقاط ($س$ ، v) الناتجة من الجدول في مستوى الإحداثيات .
- (٥) نصل بين النقاط بمنحنى لنحصل على بيان الدالة المعطاة .

مثال (٤ - ١٣)

ارسم بيان كل من الدالتين : $v = \underset{p}{\text{لو}} س$ ، $v = ٢^س$ ، ثم قارن بين بياني الدالتين . ماذا تلاحظ ؟

الحل :


$v = \underset{p}{\text{لو}} س \iff س = ٢^v$.

ص	٣	٢	١	٠	١-	٢-	٣-
س	٨	٤	٢	١	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

النقاط هي : (١ ، ٠) ، (٢ ، ١) ، (٤ ، ٢) ، (٨ ، ٣) ، ($\frac{1}{2}$ ، ١-) ، ($\frac{1}{4}$ ، ٢-) ، ($\frac{1}{8}$ ، ٣-)
 ، والدالة $v = ٢^س$.

س	٣	٢	١	٠	١-	٢-	٣-
ص	٨	٤	٢	١	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

النقاط هي : $(\frac{1}{8}, 3-), (\frac{1}{4}, 2-), (\frac{1}{2}, 1-), (8, 3), (4, 2), (2, 1), (1, 0)$




مثال (١٤ - ٤)

ارسم بيان الدالة : $ص = لو_{\frac{1}{2}} س$.

الحل :

$$ص = لو_{\frac{1}{2}} س \iff س = (\frac{1}{2})^ص$$



تدريب (٤ - ٢)

قارن بين بياني الدالتين $ص = لو س$ ، $ص = لو س_{\frac{1}{p}}$ من الشكلين (٤-٣) ، (٤-٤) ماذا تلاحظ ؟

مما سبق يمكن الحصول على جدول المقارنة التالي :

بيانات	الدالة	$ص = لو س$	$ص = لو س_{\frac{1}{p}}$
مجموعة التعريف	$س \in [0, \infty]$	$س \in [0, \infty]$	$س \in [0, \infty]$
المدى	$ص \in [0, \infty]$	$ص \in [0, \infty]$	$ص \in [0, \infty]$

كما نلاحظ أن :

* الشكل العام لمنحنى الدالة $ص = لو س$ يعتمد على قيمة p فيكون ممثلاً لدالة تزايدية إذا كانت $p < 1$ ويكون

ممثلاً لدالة تناقصية إذا كانت $p > 1$.

* بيان الدالة $ص = لو س$ يشكل انعكاساً لبيان الدالة $ص = لو س_{\frac{1}{p}}$ في محور السينات الموجب .

* يمر بيان الدالة $ص = لو س$ بالنقطة $(1, 0)$.

* الدالة اللوغاريتمية هي الدالة العكسية للدالة الأسية .

* إذا كانت $ص = لو س$ ، فإن :

$$س \leq 1 \iff لو س \leq 0$$

$$0 < س < 1 \iff لو س < 0$$

تمارين ومسائل (٤-٣)

[١] إذا كانت $(س) = ب^ص$ ، $ب$ ، $س$ ، $ب \in ح$ ، $ب < ١$ عبر عن $(س - د)$ بدلالة كل من $د(س)$ ، $د(د)$.

[٢] أوجد مجموعة تعريف كل من الدوال التالية :

$$أ) د(س) = لو٧س \quad ب) لو(٢س + ١) = ص \quad ج) لو(٣س - ١) = ص$$

$$[٣] \text{ أثبت أن } لو ب = لو ب = ... = لو ب = ٢$$

[٤] ما هو أساس الدالة اللوغاريتمية التي يمر بيانها بالنقطة (٣ ، ١٢٥) ،
[٥] ارسم كلاً من الدوال التالية :

$$\begin{aligned} أ) لو٣س = ص & \quad ب) لو٣س = ص \\ ج) ص = لو٣س & \quad د) ص = لو(س - ١) \\ هـ) ص = لو|س| & \end{aligned}$$

اللوغاريتم المعتاد

٤ : ٤

تعرف أنه من السهل إيجاد لوغاريتم عدد ما ، إذا كان هذا العدد من قوى الأساس . فمثلاً :

$$لو٥٢٥ = ٤ ، \quad لو \frac{١}{١٦} = -٤ ، \quad لو \frac{١}{٨} = -٣$$

أما إذا أردنا إيجاد قيمة لو٣ فسنجد صعوبة في ذلك ، لأن ٥ ليس من قوى ٣ ، ولتجاوز هذه الصعوبة وجد العدد (١٠) كأساس معتاد (عشري) للوغاريتم ، ومن خلال ذلك سنتمكن من إيجاد لوغاريتم أي عدد موجب للأساس عشرة (لأن نظام العد العشري قائم على قوى العدد عشرة والأجزاء العشرية للوحدة الصحيحة) .

تعريف (٤-٤)

اللوغاريتم المعتاد (العشري) هو لوغاريتم أي عدد موجب للأساس ١٠ .

ويكتب لوس ، س < ٠ ؛ ويقرأ لوغاريتم س للأساس ١٠ ، وقد تعارف على كتابته بالصورة لوس دون الإشارة إلى الأساس .

نتيجة :

$$\frac{لو س}{لو ص} = لو \frac{س}{ص}$$

تدريب (٤ - ٣)

حول كلا مما يأتي إلى الصيغة اللوغاريتمية :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ١-١٠ = ٠,١ ■ ٨ | ١ = ٠١٠ ■ ١ |
| ٢-١٠ = ٠,٠١ ■ ٩ | ١٠ = ٠١٠ ■ ٢ |
| ٣-١٠ = ٠,٠٠١ ■ ١٠ | ١٠٠ = ٠١٠ ■ ٣ |
| ٤-١٠ = ٠,٠٠٠١ ■ ١١ | ١٠٠٠ = ٠١٠ ■ ٤ |
| ٥-١٠ = ٠,٠٠٠٠١ ■ ١٢ | ١٠٠٠٠ = ٠١٠ ■ ٥ |
| ٦-١٠ = ٠,٠٠٠٠٠١ ■ ١٣ | ١٠٠٠٠٠ = ٠١٠ ■ ٦ |
| ٧-١٠ = ٠,٠٠٠٠٠٠١ ■ ١٤ | ٦١٠ = ١٠٠٠٠٠٠ ■ ٧ |

وبإمكاننا أن نعبر عن الأعداد الأخرى باستخدام القوى للعدد ١٠ كما يلي :

$$٣١٠ \times ٢,٠٣٥ = ٢٠٣٥$$

$$٢-١٠ \times ٣,٢٨ = ٠,٠٣٢٨$$

$$١٠ \times ١,٣٢٧ = ١٣,٢٧$$

إيجاد اللوغاريتم المعتاد باستخدام الآلة الحاسبة :

ونظراً للتقنيات المتطورة فقد أصبح من الممكن أن نوجد اللوغاريتم المعتاد لأي عدد موجب باستخدام الآلة الحاسبة، وذلك باستخدام المفتاح **Log** في لوحة المفاتيح .

مثال (٤ - ١٥)

احسب لو ٨٣,٧

الحل :

نضغط على **Log** ثم ندخل العدد ٨٣,٧ ونضغط على = فنحصل على لو ٨٣,٧ = ١,٩٢٢٧
[مع العلم أنه توجد آلات ندخل فيها العدد أولاً ، ثم نضغط على مفتاح **Log**] .

مثال (٤ - ١٦)

احسب لو ٠,٠٥٣٨ .

الحل :

من الآلة الحاسبة نجد أن : لو ٠,٠٥٣٨ = - ١,٢٦٩٢

مثال (٤ - ١٧)

احسب ما يلي :

$$\begin{array}{l} \text{أ) } \frac{1,538}{1,219} \text{ لو } 1,538 \\ \text{ب) } \frac{1,538}{1,219} \text{ لو } 1,538 \end{array}$$

الحل :

$$\text{أ) من الحاسب : المقدار} = \frac{1,187}{0,086} = 2,174$$

$$\begin{array}{l} \text{ب) } \frac{1,538}{1,219} = 1,538 \text{ لو } 1,219 \\ \text{(نتيجة)} \end{array}$$

$$2,174 =$$

العدد المقابل للوغاريتم المعتاد :

العدد المقابل للوغاريتم هو العدد الذي لوغاريتمه معلوم وعندما نقول أوجد العدد المقابل للوغاريتم المعتاد ٠,٧٣٨ فإننا نعني إيجاد س حيث تكون $\text{لوس} = ٠,٧٣٨$ ، فيكون $\text{س} = (١٠)^{٠,٧٣٨}$ نوجد ذلك باستخدام الآلة الحاسبة باتباع الخطوات التالية :

- ١) نضغط على المفتاح Shift .
- ٢) نضغط على 10^x .
- ٣) ندخل العدد المعطى .
- ٤) نضغط على = فنحصل على الناتج .
- مع ملاحظة أن بعض الآلات لا توجد بها كلمة Shift ، وتوجد مصطلحات أخرى بديلة لها .
- بعض الآلات تتطلب إدخال الأس أولاً ، ثم الضغط على Shift أو مصطلح آخر ، ثم نضغط 10^x .

مثال (٤ - ١٨)

أوجد س إذا كان $\text{لوس} = 2,1567$.

الحل :

$$\text{لوس} = 2,1567 \iff \text{س} = (10)^{2,1567}$$

ومن الآلة الحاسبة نجد أن $\text{س} = 143,45$

أما إيجاد العدد المقابل باستخدام الجدول :

هناك جداول خاصة بالأعداد المقابلة للوغاريتمات لإيجاد العدد المقابل باستخدام الجداول نتبع الخطوات التالية :

- ١) نفصل اللوغاريتم المعطى إلى كسر عشري موجب وعدد صحيح .
- ٢) نوجد العدد المقابل للكسر باستخدام الجدول .
- ٣) نستخدم العدد الصحيح كأس للعدد عشرة ، ونضرب قوى العشرة الناتجة في العدد المقابل للكسر العشري فينتج العدد المطلوب .

٤ ■ إذا كان العدد المعطى سالبا نضيف إليه عدداً صحيحاً يكبر عدده الصحيح بواحد، وبهذا نتمكن من تحويل العدد المعطى إلى كسر عشري موجب وعدد صحيح .

مثال (٤ - ١٩)

أوجد العدد المقابل للوغاريتم المعتاد (٢,٥٤٢١ -) باستخدام الجدول ثم قارن ذلك باستخدام الآلة الحاسبة :

الحل :

$$٢,٥٤٢١ - = ٣ - ٣ + ٢,٥٤٢١ = ٣,٤٥٧٩ \quad (١) \dots\dots\dots$$

نبحث في جدول العدد المقابل عن سطر ٠,٤٥ وعمود ٧ = ٢٨٦٤
وفرق ٩ = ٦

$$٢,٨٧٠ = ٠,٤٥٧٩ \quad \text{العدد المقابل للعدد} \quad (٢) \dots\dots\dots$$

ملاحظة : (نضع الإشارة بعد عدد صحيح واحد لأننا نعلم أن قيم اللوغاريتمات التي في الجدول هي لوغاريتمات معتادة لعدد موجب مُكوّن من كسر عشري + عدد صحيح مُكوّن من رقم واحد)
من (١) ، (٢) نجد أن :

$$\text{العدد المقابل للعدد } ٣,٤٥٧٩ = ٣ - ١٠ \times ٢,٨٧٠ = ٠,٠٠٢٨٧٠ .$$

قاعدة هامة :

$$\text{س} = \text{ص} \Leftrightarrow \text{لو س} = \text{لو ص} .$$

تمارين ومسائل (٤ - ٤)

[١] أوجد باستخدام الآلة الحاسبة قيمة كل مما يأتي :

$$\text{أ) لو } (٣,١٠٠٨) \quad , \quad \text{ب) لو } \sqrt[٦]{٧٨} \sqrt[٣]{٦٤٩} ,$$

$$\text{ج) } \frac{\text{لو } ١٢,٣ + \text{لو } ٥}{\text{لو } ٠,٠٤٣٢} \quad , \quad \text{د) لو } (٣,٢٨ \times ١٠^{-٢}) .$$

[٢] أوجد باستخدام الآلة الحاسبة الأعداد المقابلة لكل مما يأتي :

$$\text{أ) } ٢ - ٠,٧٣٠٨ \quad , \quad \text{ب) } ٢,٧٩٨٥ ,$$

$$\text{د) } ٦,٨٧٢٤ \quad , \quad \text{هـ) } - ٦,٧٢٥٤ ,$$

[٣] أوجد قيمة s في كل مما يأتي :

(أ) $\log 7,884 = s$ ، (ب) $\log 1,022 = s$.

[٤] أحسب كلا مما يأتي :

(أ) $\log_{25} 127$ ، (ب) $\log_{13} 39$ ،

(ج) $\log_{132} 327$.

اللوغاريتم الطبيعي

٤ : ٥

كما تعرّف على اللوغاريتم المعتاد فإن هناك لوغاريتم آخر يسمّى اللوغاريتم الطبيعي دعنا نتعرّف أولاً على الدالة الأسية الطبيعية .

تعريف (٤-٥)

نسمي الدالة الأسية التي أساسها العدد e دالة أُسيّة طبيعية حيث نسمّي e الأساس الطبيعي ، ($e \approx 2,72$) .

ف نجد أن :

$\log_e e = 1$ ، $\log_e 1 = 0$ ، $\log_e 1 = 0$ ، $\log_e 1 = 0$.

تدريب (٤-٤)

ارسم الدالة : $y = e^x$ وبين أن بيانها يمر بالنقطة $(0, 1)$ ، $(1, e)$ وهكذا نجد أن اللوغاريتم الطبيعي هو لوغاريتم أي عدد موجب للأساس e ويرمز له بالرمز $\log_e$.

1000000	100000	10000	1000	100	10	e
$2,71828$	$2,71827$	$2,71815$	$2,71692$	$2,70481$	$2,59374$	$\left(1 + \frac{1}{e}\right)^e$

من الجدول نلاحظ أن :

$\left(1 + \frac{1}{e}\right)^e \rightarrow e$ عندما $e \rightarrow \infty$

۱. لوھ = ۱
۲. لوھ = ۰
۳. لوھس = س
۴. لوھس = س
۵. س = لوھس

تدريب (٤ - ٥)

أوجد كلاً من : $\frac{1}{2}$ لو هـ ، لو هـ^٢ ، لو هـ^٤ ، لو هـ^{٧،٢} ، لو هـ^٣ ، $\frac{1}{5}$ لو هـ^٢

إيجاد اللوغاريتم الطبيعي باستخدام الآلة الحاسبة :

هناك جداول أيضاً للوغاريتمات الطبيعية والأعداد المقابلة لها إلا أننا نستخدم الآلات الحاسبة لإيجاد

اللوغاريتم الطبيعي وذلك باستخدام المفتاح **Ln** في لوحة المفاتيح .

مثال (٤ - ٢٠)

(أ) لو ٨٣,٧ ، (ب) لو ١٠,٠٧٦

الحل :

أ) نضغط على Ln ثم ندخل العدد ٨٣,٧ ثم نضغط على (=) فنحصل على ٤,٤٢٧٢٤.

(ب) بالطريقة نفسها في الفرع (١) نجد أن :

• $\overline{0,21} \cdot \varepsilon = 0 - 0 + \varepsilon,7896 = \varepsilon,8796 = 1,076$ لو

العدد المقابل للوغاريتم الطبيعي :

بنفس طريقة إيجاد العدد المقابل للوغاريتم المعتاد ، نجد أن :

$$\text{لوس} = ٧٣٨,٠ \iff \text{س} = ٧٣٨,٠$$

ولإيجاد العدد المقابل للعدد ٠,٧٣٨ من الآلة الحاسبة نضغط على مفتاح Shift ثم نضغط على e^x

(حيث e هي هـ) ثم ندخل العدد المعطى (٠,٧٣٨) ثم نضغط على = فنحصل على العدد المقابل للوغاريتم

الطبيعي (٧٣٨، ٠)

مثال (٤ - ٢١)

إذا كانت $لوس = ٧,١١٩$. أوجد قيمة $س$.

الحل :

$$٧,١١٩ = \text{لوس} \Leftrightarrow \text{س} = \text{هـ} ٧,١١٩$$

ومن الآلة الحاسبة $\text{هـ} ٧,١١٩ = ١٢٣٥,٢$.

تمارين ومسائل (٤-٥)

[١] ارسم بيان كل من الدوال : $\text{ص} = \text{هـ}^{\text{س}}$ ، $\text{ص} = \text{هـ}^{-\text{س}}$ ، ثم استخدم ذلك في رسم بيان الدوال التالية :

أ ($\text{ص} = \text{هـ}^{\text{س}}$) ، ب ($\text{ص} = \text{هـ}^{\text{س}+١}$) ، ج ($\text{ص} = ١ - \text{هـ}^{\text{س}}$) .

[٢] أوجد قيمة كل من :

أ ($\text{لو}^{\text{هـ}^3}$) ، ب ($\text{لو}^{\text{هـ}^{٠,٠٠٥}}$) ، ج ($\text{لو}^{\sqrt{\text{هـ}}}$)

د ($\text{لو}^{\text{هـ}^9} - \text{لو}^{\text{هـ}^3}$) ، هـ ($\frac{\text{لو}^{\text{هـ}^{١٢٥}}}{\text{لو}^{\text{هـ}^{٢٥}}}$) ، و ($\frac{\text{لو}^{\text{هـ}^9}}{\text{لو}^{\text{هـ}^3}}$)

[٣] استخدم الآلة الحاسبة في إيجاد قيمة كل مما يأتي :

أ (لو^8) ب ($\text{لو}^{١,٦٤}$) ج ($\text{لو}^{٣٢٠٠}$) د ($\text{لو}^{٠,٠٠٢٨}$)

[٤] أوجد قيمة س في كل مما يأتي :

أ ($\text{لوس} = ١,٤٣٢$) ، ب ($\text{لوس} = ٠,٠٠٢٧$) ،

ج ($\text{لوس} = \frac{١}{١٢٥}$) ، د ($\text{لوس} = ٢,٠٠٣$) .

[٥] حل المعادلات التالية :

أ ($\text{لوس} = ٩$) ، ب ($\text{لو}^{\frac{١}{٢}}(٢ - \text{س}) = ٨$) ، ج ($\text{لو}^{\frac{٩}{٨}} = \text{س}$) ،

د ($١٠ = (\text{هـ} + ١)^2$) ، هـ ($\text{لو}^{\frac{١}{١٠}} = ١٠$)

و ($(٤٩ - \text{س}) \times ٥ - ٧ = ٦$) ، ز ($\text{هـ}^{-١} = ٤$) ، ح ($(٢٢,١)^{\text{س}} = (٥,٣)^{\text{س}}$)

ط ($\text{س}^٣ \times \text{س}^٢ \times ٢٧ = (٢٧١)^{\text{س}+١}$) ، ي ($\text{لو}^{\frac{٢}{٢}} = ٢ -$)

الحل :

$$ب = ١ + (١ + م) = ١ + (١ + ١) = ٢ \Rightarrow ٢٥٠٠٠ = ٥٠٠٠ \Rightarrow ١ = \frac{١}{٥} = (١, ٩)$$

$$\Leftrightarrow \text{لو } \frac{١}{٥} = \text{لو } (١, ٩) \Rightarrow \text{لو } ٠,٢ = \text{لو } ٠,٩$$

$$\Leftrightarrow \frac{\text{لو } ٠,٢}{\text{لو } ٠,٩} = ٥ \Rightarrow \text{ومن الجداول}$$

$$\Leftrightarrow ٥ = \frac{٠,٦٩٩٠-}{٠,٠٤٥٨-} = ١٥,٢٩ \text{ سنة}$$

تمارين ومسائل (٤-٦)

[١] احسب قيمة كل مما يأتي باستخدام اللوغاريتمات :

$$أ) \frac{{}^2(١٢,٣) \times {}^3(٥٤٣)}{\sqrt[3]{\frac{{}^3(٣,٢٥)}{١,٤}}}, \quad ب) \sqrt[3]{٣٢٥} \sqrt[3]{٤٣٢}$$

$$ج) \frac{\sqrt[3]{٣٧} \sqrt[3]{(٢,٦١٥)(٢,٣٠٤)}}{{}^3(٠,٠٠٣٢)(١,٩٨٦)}, \quad د) \sqrt[3]{(٠,٣٥٧)}$$

[٢] مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه $\sqrt[3]{٨٨}$ سم . أوجد باستخدام اللوغاريتمات (مساحته $\times$ محيطه) .[٣] يعطى طول نصف قطر قبة مسجد (على شكل كرة) بالقاعدة : $\sqrt[3]{\frac{٢١}{٤٤}}$ ح حيث ح هو حجم قبة المسجد :

أ) أوجد حجم قبة المسجد بدلالة نق .

ب) أوجد حجم القبة إذا علمت أن طول نصف قطرها ٣,٥ متر .


[٤] إذا كان ثمن آلة يتناقص سنوياً بمعدل ٨٪ نتيجة الاستهلاك ، فأوجد بعد كم سنة (لأقرب منزلتين

عشريتين) يصبح ثمنها نصف ثمنها الأصلي . إذ أن تناقص الثمن معطى حسب العلاقة $١ + (١ + م) = ٢$ حيث $١ =$ الثمن الأصلي ، $ب =$ الثمن بعد ٥ سنة ، $م =$ المعدل السنوي للنقص في الثمن .


نهاية الدالة الحقيقية:

٥ : ١


تعرفت أنه لا يمكن دراسة أية دالة حقيقية، أو تمثيلها بيانياً عند عدد حقيقي معين - وليكن $a \in \mathbb{R}$ - ما لم تكن الدالة معرفة عند هذا العدد (a) في حين يتطلب دراسة نهاية الدالة بحسب نوع متغيراتها - متقطعة، أو مستمرة - أن تكون معرفة عند قيم قريبة من العدد (a)، عندئذٍ تسمى الفترة المفتوحة التي ينتمي إليها العدد (a) قيم جوار للعدد (a). فمثلاً:



نسمى الفترة المفتوحة $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ جواراً للعدد ٢، ونصف قطر الفترة $\frac{1}{2}$.
[انظر الشكل (٥ - ١)].




ونسمى الفترة المفتوحة $[2.3, 2.7]$ جواراً للعدد (٣)، ونصف قطر الفترة ٠,٤.
[انظر الشكل (٥ - ٢)].



ونسمى الفترة المفتوحة $[-0.4, 0.6]$ جواراً للعدد (٠,٦)، ونصف قطر الفترة ١.
[انظر الشكل (٥ - ٣)].

مما سبق وبصورة عامة إذا كان لدينا الفترة المفتوحة V_a مركزها a ، والعدد δ (يُقرأ دلتا)، حيث $\delta > 0$ ، أي عدد موجب اختياري من الأعداد الحقيقية، ويمثل نصف قطر الفترة F .
فإن: $F = (a - \delta, a + \delta)$ ، [انظر الشكل (٥ - ٤)]




عندئذٍ تسمى الفترة المفتوحة $f(\delta, \epsilon)$ جواراً للنقطة ϵ ، بنصف قطر δ ؛ ويمكن أن تُعبّر عنها رياضياً بالصورة التالية:

$$\begin{aligned} f(\delta, \epsilon) &= [\delta - \epsilon, \delta + \epsilon] \\ &= \{s : s \in \mathbb{R} \text{ يكون } \delta - \epsilon < s < \delta + \epsilon\} \\ &= \{s : \delta - \epsilon < s < \delta + \epsilon\} \\ &= \{s : |s - \delta| < \epsilon\}. \end{aligned}$$

وباستبعاد مركز الفترة ϵ من الجوار f نحصل على فترة مفتوحة، بالجوار المحذوف للنقطة ϵ مركز الفترة، ونعبر عنها بالصورة: $f(\delta, \epsilon) - \{\epsilon\} = \{s : \delta - \epsilon < s < \delta + \epsilon, s \neq \epsilon\}$

$$= [\delta - \epsilon, \epsilon) \cup (\epsilon, \delta + \epsilon].$$

[كما في الشكل (٥-٥)]:



الشكل (٥-٥)

ملاحظة:

- تسمى الفترة $[\delta - \epsilon, \delta + \epsilon]$ جواراً للعدد ϵ ، بينما تسمى الفترة $[\delta - \epsilon, \delta + \epsilon) - \{\epsilon\}$ جواراً محذوفاً للعدد ϵ .
- تسمى الفترة $[\delta - \epsilon, \epsilon)$ جواراً أيسر للعدد ϵ ، بينما تسمى الفترة $(\epsilon, \delta + \epsilon]$ جواراً أيسر محذوف للعدد ϵ .
- تسمى الفترة $(\epsilon, \delta + \epsilon]$ جواراً أيمن للعدد ϵ ، بينما تسمى الفترة $[\delta - \epsilon, \epsilon)$ جواراً أيمن محذوف للعدد ϵ .

مثال (٥-١)

إذا كانت الفترة المفتوحة $[2,9, 3,1]$ جواراً للعدد ٣، فأكتب بعض القيم القريبة جداً من العدد ٣ في هذا الجوار.

الحل:


بعض القيم القريبة جداً من العدد ٣ وفقاً للفترة $f(0,1,3) = (0,1,3)$ هي:

٢,٩٥ ، ٢,٩٩ ، ٢,٩٩٩ ، ٢,٩٩٩٩

٢,٩٩٩٩٩ ، ... ، وكذلك:

٣,٠١ ، ٣,٠٠١ ، ٣,٠٠٠١ ، ٣,٠٠٠٠١

٣,٠٠٠٠٠١ ، ...



الشكل (٥-٦)

[انظر الشكل (٥-٦)]:

ملاحظة: من المثال السابق نلاحظ أن :

- [٣ ، ٣ ، ٣] جواراً أيمن للعدد ٣ ، [٣ ، ٣ ، ٣] جواراً أيمن محذوف للعدد ٣ .
- [٣ ، ٢ ، ٩] جواراً أيسر للعدد ٣ ، [٣ ، ٢ ، ٩] جواراً أيسر محذوف للعدد ٣ .

تعريف (٥-١)

لتكن s كمية متغيرة ، $1 \in C$ ، نقول أن s تقترب من 1 باطراد إذا كان بالإمكان جعل الكمية $|s - 1|$ أصغر من أي عدد حقيقي موجب δ ($0 < \delta$) ، فيكون : $|s - 1| < \delta$

١- تشابه الدالة عند نقطة :

مفهوم نهاية الدالة عند نقطة من المفاهيم الأساسية التي قدمت إلى الرياضيات الشيء الكثير، بل ونهضت الحل بتطبيقاتها الأساسية في مجالاتها المختلفة وفي جميع مجالات العلوم الطبيعية الأخرى . وفي هذا البند ستدرس سلوك الدالة $D(s)$ عندما تقترب قيم المتغير s باطراد نحو قيمة معينة (1) دون أن تساويها على فترة مفتوحة بالجوار المحذوف للنقطة 1 مركز الفترة ($s \leftarrow 1$) . سنشرح هنا هذا المفهوم بتقديم التعريف التالي، ومن خلال بعض الأمثلة التوضيحية التالية :

تعريف (٥-٢)

لتكن الدالة $D(s)$ معرفة على فترة محذوف (أو غير محذوف) مركزها 1 ؛ فإنه يقال أن للدالة وتقترب من النهاية L $1 \in C$ عندما $s \leftarrow 1$. إذا وفقط إذا : $0 < \delta \exists 0 < \delta$ بحيث أن : $0 < |s - 1| < \delta \Rightarrow |D(s) - L| < \delta$.
وتكتب : نهاية $D(s)$ $s \leftarrow 1$ L

مثال (٥-٢)

لتكن الدالة $D(s) = \frac{s^2 - 4}{s - 2}$ ؛ حيث $s \in C / \{2\}$ ،

ادرس سلوك الدالة D في جوار العدد 2 (أي عندما $s \leftarrow 2$) .

الحل :

نلاحظ أن الدالة D غير معرفة عند $s = 2$

أي أن : $D(2)$ غير معرفة .

$$\text{فتكون } D(s) = \frac{s^2 - 4}{s - 2} = \frac{(s + 2)(s - 2)}{(s - 2)} = s + 2 \text{ ، حيث } s \neq 2$$

والآن ؛ ولكي نوجد قيم للدالة D عندما s تقترب من العدد 2 ؛ فإننا نأخذ قيماً قريبة جداً من العدد 2

من جهة اليمين (عندما $s < 2$) ، وقيماً أخرى قريبة من العدد 2 من جهة اليسار (عندما $s > 2$) ، كما هو موضح في الجدول (٥-١) التالي :

س	٠٠٠	٢,١	٢,٠١	٢,٠٠١	٢,٠٠٠١	٢	١,٩٩٩٩	١,٩٩٩	١,٩٩	١,٩	٠٠٠
د(س)	٠٠٠	٤,١	٤,٠١	٤,٠٠١	٤,٠٠٠١	غير معرفة	٣,٩٩٩٩	٣,٩٩٩	٣,٩٩	٣,٩	٠٠٠

جدول (٥-١)

واضح من الجدول (٥-١) أنه كلما س تقترب إلى العدد ٢ من جهة اليمين بالصورة (س ← ٢⁺) بقيمة أكبر منه، فإن قيم الدالة د(س) المناظرة تقترب باطراد من العدد ٤ من جهة اليمين بالصورة د(س) ← ٢⁺ بقيمة أكبر منه.

ويعبر عن ذلك رمزياً بالصورة: نهاية س ← ٢⁺ د(س) = ٤

وبالمثل كلما س تقترب إلى العدد ٢ من جهة اليسار بالصورة (س ← ٢⁻) بقيمة أصغر منه، فإن قيم الدالة د(س) المناظرة تقترب باطراد من العدد ٤ من جهة اليسار بالصورة د(س) ← ٢⁻ بقيمة أصغر منه.

ويعبر عن ذلك رمزياً بالصورة: نهاية س ← ٢⁻ د(س) = ٤


ومن التعريف (٥-٢) نحدد العلاقة بين δ ، ٣ فيما إذا وجد من أجل $0 < \delta$ ، بحيث يكون:

$$3 > |د(س) - ٤| \iff 3 > |س + ٢ - ٤| \iff 3 > |س - ٢| \iff ٢ \neq س$$

$$٠ < |س - ٢| < \delta \text{ يكفي أن نختار } \delta = 3$$

والجدول (٥-٢) يبين ذلك:

٠٠٠	٠,١	٠,٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠٠١		٠,٠٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠١	٠,١	٠٠٠	س - ٢
٠٠٠	٠,١	٠,٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠٠١		٠,٠٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠١	٠,١	٠٠٠	د(س) - ٤



الشكل (٥-٧)

جدول (٥-٢)

وللتأكد مما سبق:

$$\text{نضع د(س)} = \frac{(س + ٢)(س - ٢)}{(س - ٢)} = س + ٢ \text{ حيث } س \neq ٢$$

[انظر الشكل (٥-٧)].

تلاحظ أن النقطة (٢، ٤) لبيان الدالة د، وبالتالي

واضح أنه عندما تكون س قريبة جداً من العدد ٢ فإن د(س) تقترب باطراد من العدد ٤.

أي أن: عندما س ← ٢ فإن د(س) ← ٤، وسنعتبر

عن ذلك رياضياً بقولنا أن: نهاية الدالة د عندما توؤل س إلى

٢ تساوي ٤، ونعبر عن ذلك رمزياً كما يلي:

$$\text{نهاية س ← ٢ د(س) = ٤}$$

تعريف (٥-٣)

نهـا د(س) = ل يعني أنه عندما تقترب س من ١ باطراد ، س يح ١
فإن : د(س) تقترب باطراد من ل .

أي أنه عندما تأخذ س قيماً في جوار ١ ، س يح ١ ، فإن د(س) تأخذ قيماً في جوار ل .
نلاحظ من المثال السابق أن :

(١) نهاية الدالة د عندما تؤول س إلى ٢ من جهة اليمين تساوي ٤ .
ونعبر عن ذلك رمزياً كالتالي :

نهـا د(س) = ٤ ، وتسمى النهاية من اليمين .
س ← ٢⁺

(يقرأ الرمز س ← ٢⁺ كالتالي : س تؤول إلى ٢ من اليمين) .

(٢) نهاية الدالة د عندما تؤول س إلى ٢ من جهة اليسار تساوي ٤ .
ونعبر عن ذلك رمزياً كالتالي :

نهـا د(س) = ٤ ، وتسمى النهاية من اليسار .
س ← ٢⁻

(يقرأ الرمز س ← ٢⁻ كالتالي : س تؤول إلى ٢ من اليسار) .

(٣) ∴ نهـا د(س) = نهـا د(س) = ٤

∴ نهـا د(س) = ٤

(٤) نلاحظ في هذا المثال أن الدالة د(س) = $\frac{٤ - س^٢}{٢ - س}$ ، حيث س ∈ ح / {٢} غير معرفة عند س = ٢ .
لكن نهـا د(س) = موجودة .

وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن تكون الدالة معرفة عند النقطة س = ١ ، ولكن من الضروري أن تكون
معرفة في جوار النقطة س = ١ .

(٥) نهاية الدالة موجودة ووحيدة إذا كانت :

نهـا د(س) = نهـا د(س) = ل ، $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$.

فإن : نهـا د(س) = ل .

مبرهنة :

نهـا د(س) = ل إذا وفقط إذا نهـا د(س) = ل = نهـا د(س)

مثال (٥ - ٣)

لتكن الدالة هـ (س) = ٢ + س ، $\forall$ س $\in$ ح
ادرس نهاية الدالة عندما $s \rightarrow 1$

الحل :

سندرس قيم الدالة هـ عندما س تأخذ قيماً قريبة جداً من العدد الحقيقي ١ ، من الواضح أن س تقترب من العدد ١ بإحدى الحالتين:

١) عندما تقترب س من العدد ١ من جهة اليمين (س $\rightarrow 1^+$) ، كما هو موضح بالجدول (٥-٣) التالي:

س	...	١,٧٥	١,٥	١,٢٥	١,١	١,٠١	١,٠٠١	١,٠٠٠١	١,٠٠٠٠١	...	$\delta + 1$
د(س)	...	٥,٥	٥	٤,٥	٤,٢	٤,٠٢	٤,٠٠٢	٤,٠٠٠٢	٤,٠٠٠٠٢	...	$3 + \epsilon$
$ س - 1 $	...	٠,٧٥	٠,٥	٠,٢٥	٠,١	٠,٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠٠١	...	δ
$ د(س) - ٤ $	...	١,٥	٥	٠,٥	٠,٢	٠,٠٢	٠,٠٠٢	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٠٢	...	$\delta = \epsilon$

جدول (٥ - ٣)

واضح أن قيم هـ (س) تقترب من العدد الحقيقي ٤ باطراد، كلما اقتربت س من العدد ١ من جهة اليمين باطراد، أي أنه يمكن جعل الفروق بين هـ (س) ، ٤ صغيراً صغيراً كافياً بالقدر الذي نريد ، وذلك يجعل القيمة س - ١ صغيرة وموجبة.

أي أن: $\lim_{s \rightarrow 1^+} هـ(س) = ٤$ وهي النهاية من اليمين.

ب) عندما تقترب س من العدد الحقيقي ١ من جهة اليسار (س $\rightarrow 1^-$) ، كما هو موضح بالجدول (٥-٤). فيه تأخذ س القيم: ٠,٢٥ ، ٠,٥ ، ٠,٧٥ ، ٠,٩ ، ٠,٩٩ ، ٠,٩٩٩ ، ٠,٩٩٩٩ ، ... وتحسب القيم المناظرة لهـ (س) باستخدام قاعدة الدالة هـ (س) = ٢ + س

س	...	٠,٢٥	٠,٥	٠,٧٥	٠,٩٠	٠,٩٩	٠,٩٩٩	٠,٩٩٩٩	...	$\delta + 1$
د(س)	...	٢,٥	٣	٣,٥	٣,٨	٣,٩٨	٣,٩٩٨	٣,٩٩٩٨	...	$3 + \epsilon$
$ س - 1 $	...	٠,٧٥	٠,٥	٠,٢٥	٠,١	٠,٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠٠١	...	δ
$ د(س) - ٤ $	...	١,٥	١	٠,٥	٠,٢	٠,٠٢	٠,٠٠٢	٠,٠٠٠٢	...	$\delta = \epsilon$

جدول (٥ - ٤)

ومن الجدول (٤-٥) واضح أن قيم هـ (س) تقترب من العدد الحقيقي ٤ باطراد، كلما اقتربت س من العدد ١ من جهة اليسار باطراد، أي أنه يمكن جعل الفروق بين هـ (س)، ٤ صغيراً صُغراً كافياً بالقدر الذي نريد، وذلك يجعل القيمة س - ١ صغيرة وموجبة.

أي أن: $\text{نهـ} \leftarrow_{س} \text{هـ} (س) = ٤$ وهي النهاية من اليسار.

مما سبق يتضح أن:

$$(i) \quad \text{نهـ} \leftarrow_{س} \text{هـ} (س) = (٢ + س) = ٤$$

$$(ii) \quad \text{نهـ} \leftarrow_{س} \text{هـ} (س) = (٢ + س) = ٤$$


$$(iii) \quad \text{نهـ} \leftarrow_{س} \text{هـ} (س) = (٢ + س) = ٤$$

نتيجة لذلك نقول إن نهاية الدالة هـ (س) = ٢ + س ٢ عندما س تؤول إلى ١ موجودة، وتساوي ٤ ،

$$\text{أي أن: } \text{نهـ} \leftarrow_{س} \text{هـ} (س) = (٢ + س) = ٤$$

ثانياً : نهاية دالة عند اللانهاية :

عند دراسة أنظمة متطورة فغالباً ما يكون الاهتمام بدراسة سلوك النظام لقيم كبيرة ، خاصة إذا كان معقداً بدرجة كبيرة ، ويتوقع أن يستقر بعد فترة زمنية ليأخذ سمة أكثر بساطة .



الشكل (٥ - ٨)

فمثلاً :

في مزرعة بكتريا مهيأه لها الظروف لتنمو معملياً يكون حجم المزرعة (ح) في الزمن (د) ؛ وبالتالي فإن سلوك الدالة ح عند قيم د الكبيرة يتوقف على طريقة إمداد المزرعة بالغذاء ، مع العلم أنه في حالة من الحالات يكون نمو المزرعة غير مقيد (أي يستمر في الزيادة لانهائياً مع الزمن)، وفي حالة أخرى يأخذ معدل نمو المزرعة في البطء لقيم د الكبيرة بحيث تقترب ح من قيمة معينة ح م ، التي تمثل الحد

الأقصى لحجم المزرعة على النحو الموضح في الشكل (٥ - ٨) ،

عندئذٍ يقال أن سلوك الدالة التقريبي هو : أن ح تقترب من القيمة الثابتة ح م عندما س $\rightarrow \infty$ ،


$$\text{أي أن: } \text{نهـ} \leftarrow_{س} \text{هـ} (س) = ح م$$

وفيما يلي نتناول نهاية الدالة عندما يسعى متغيرها نحو اللانهاية في حالة أن تستمر s في التزايد بحيث تكون أكبر من أي عدد سبق تعيينه ، أو بالتناقص بحيث تكون أصغر من أي عدد سبق تعيينه ، عندئذٍ يقال في الحالة الأولى أن s تنتهي إلى مالانهاية ، وتكتب : $s \leftarrow \infty$ وفي الحالة الاخرى يقال أن s تنتهي إلى سالب مالانهاية ، وتكتب : $s \leftarrow -\infty$.

مثال (٥ - ٤)

لتكن $d(s)$ دالة معرفة بالقاعدة $d(s) = \frac{s^2}{1+s^2}$ ؛ ابحث نهاية الدالة عندما $s \leftarrow \infty$ ، $s \leftarrow -\infty$.

الحل :



الشكل (٥ - ٩)

مجال الدالة $d = ح$

عندما تأخذ s قيمة كبيرة موجبة ، فإن

$d(s)$ تقترب باطراد نحو العدد ١ على النحو

الموضح في الشكل (٥ - ٩) لبيان الدالة والجدول

رقم (٥ - ٥) لقيم s المختارة .

جدول (٥ - ٥)

$s \leftarrow \infty$	١٠٠٠	١٠٠	١٠	...	٣	٢	١	٠	s
$١ \leftarrow$	$\frac{٢٠٠٠٠٠٠}{١٠٠٠٠٠١}$	$\frac{٢٠٠٠٠}{١٠٠٠١}$	$\frac{٢٠٠}{١٠١}$	...	$\frac{١٨}{١٠}$	$\frac{٨}{٥}$	١	٠	$d(s)$
$3 \leftarrow$	$\frac{٢}{١٠٠٠٠٠١}$	$\frac{٢}{١٠٠٠١}$	$\frac{٢}{١٠١}$	...	$\frac{٢}{١٠}$	$\frac{٢}{٥}$	١	٠	$ d(s) - ١ $

يلاحظ من الجدول (٥ - ٥) أنه بالإمكان جعل الفرق المطلق $|d(s) - ١|$ صغيراً جداً بقدر ما نريد ،

باختيار s كبيرة كبراً كافياً . أي : $\lim_{s \rightarrow \infty} d(s) = ١$.

وفي حالة أن تأخذ s قيمة صغيرة متناقصة [انظر الجدول (٥ - ٦)] فإن قيمة $d(s)$ تقترب من

العدد ١ .

جدول (٥ - ٦)

$\infty \leftarrow$	$1000-$	$100-$	$10-$	$\dots$	$3-$	$2-$	$1-$	0	س
$2 \leftarrow$	$\frac{2000000}{1000001}$	$\frac{20000}{10001}$	$\frac{200}{101}$	$\dots$	$\frac{18}{10}$	$\frac{8}{5}$	1	0	د(س)
$3 \leftarrow$	$\frac{2}{1000001}$	$\frac{2}{10001}$	$\frac{2}{101}$	$\dots$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{5}$	1	2	د(س) - 2

أي أنه بالإمكان جعل الفرق المطلق $|د(س) - 2|$ صغيراً بقدر ما نريد باختيار س صغيره صغيراً كافياً ،

$$أي أن نهـا س \leftarrow \infty = د(س) = نهـا س \leftarrow \infty \quad 2 = \frac{2س}{1+س}$$

تعريف (٥ - ٤)

١ ■ إذا كانت الدالة د معرفة في الفترة $[1, \infty)$ ، فإن للدالة د النهاية ل، $\exists \text{ ح عندما } س \leftarrow \infty$ إذا كان من الممكن جعل $|د(س) - ل|$ صغيراً صغيراً كافياً بالقدر الذي نريده ، باختيار س كبيره كبيراً كافياً ، أي أن : نهـا س \leftarrow \infty = د(س) = ل .

٢ ■ إذا كانت الدالة د معرفة في الفترة $[-\infty, 1]$ ، فإن للدالة د النهاية ل، عندما $س \leftarrow -\infty$ ، إذا كان من الممكن جعل $|د(س) - ل|$ صغيراً صغيراً كافياً بالقدر الذي نريده ، باختيار س صغيره صغيراً كافياً ، أي أن : نهـا س \leftarrow -\infty = د(س) = ل .

تلاحظ :

- ١ ■ وجود نهاية دالة عند نقطة ، أو عند اللانهاية لايعتمد على تعريف الدالة .
- ٢ ■ القيمة المطلقة $|د(س) - ل| > 3$ تعني أن : د(س) $\exists$ ف (ل ، 3) / { ل } ، والقيمة المطلقة $0 < |س - 1| > \delta$ تعني أن : س $\exists$ ف (١ ، δ) / { ١ } .

خواص النهايات :

١ ■ إذا كانت د(س) = $\frac{1}{س}$ ، س $\neq$ صغيراً فإن :

$$نهـا س \leftarrow \infty = د(س) = صغيراً ، نهـا س \leftarrow \infty = د(س) = صغيراً$$

$$علماً بأن : $\frac{1}{\infty} \neq 0$ وإنما نهـا س \leftarrow \infty = $\frac{1}{س} = صغيراً$$$

مثال (۵ - ۵)

احسب النهايات التالية :

(أ) نهـا $\frac{1}{s-2}$ ، $s \neq 2$. (ب) نهـا $\frac{1}{s \leftarrow \infty \pm 5}$.

(ج) نہ $\frac{s-3}{s^2-9}$ ، $s \neq \pm 3$.

الحل :

أ) $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s-2} = \frac{1}{\infty-2} = \frac{1}{\infty} = 0$ (بقسمة بسط الكسر ومقامه على أكبر أس للمتغير s).

أي كلما زادت قيمة s فإن $\frac{1}{s}$ تقترب من الصفر ومقام الكسر يقترب من الواحد .

$$\cdot = \frac{\cdot}{1} = \frac{\cdot}{\cdot - 1} = \left(\frac{\frac{1}{s}}{\frac{2}{s} - 1} \right) \text{ نه } \frac{1}{\infty} \leftarrow s$$

(ب) نہ $\infty = {}^2(\infty -) 5 = ({}^2 5) \xrightarrow{\infty \leftarrow}$

$$\frac{1}{3+s} \frac{1}{\infty \leftarrow s} = \frac{3-s}{(3+s)(3-s)} \frac{1}{\infty \leftarrow s} = \frac{3-s}{9-s^2} \frac{1}{\infty \leftarrow s} \quad (\text{ج})$$

$$= \frac{\overset{۱}{\text{س}}}{\underset{\text{س}}{\frac{۳}{\text{س}}} + ۱} = \frac{\overset{۰}{\text{صفرًا}}}{۰ + ۱}$$

■ ٢. إذا كانت $d(s) = j$ ؛ حيث j ثابت لكل قيم s في المجال ، $1 \in \mathcal{H}$ (مجال الدالة) فإن :

نها $d(s) = j$.
 $s \leftarrow 1$

مثال (۵ - ۶)

احسب النهايات التالية :

(أ) نهـ ۸ ، (ب) نهـ ۱۹ ، (ج) نهـ ۳

(أ) نهـ ۸ = ۸ $\frac{۳}{۵}$ ← س ، (ب) نهـ ۱۹ = ۱۹ $\frac{۳}{۵}$ ← س ، (ج) نهـ ۳ = ۳ $\frac{۳}{۵}$ ← س

$$\text{ج) نهيا } \infty \leftarrow (س) = \left[\frac{(س)}{مر(س)} \right] = \frac{\text{نهيا } \infty \leftarrow (س)}{\text{نهيا } \infty \leftarrow مر(س)} = \frac{ل}{ك} ; مر(س) \neq 0, \forall س \in ح, ك \neq 0.$$

الخاصية (٣) صحيحة في حالة : $s \leftarrow +1$ ، $s \leftarrow -1$ ، $s \leftarrow \infty$ ، $s \leftarrow -\infty$.

مثال (۷-۵)

(أ) نهيا $\frac{1}{s-2}$ (ب) نهيا $\frac{\sqrt{s}}{s^2+2}$ ، (ج) نهيا $\frac{1}{s-1}\sqrt{1-s}$

الحل :

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2+4} = \frac{\sqrt{\text{نہا} \leftarrow 2 \text{س}}}{\text{نہا} \leftarrow 2 \text{س} + \text{نہا} \leftarrow 2 \text{س}} = \frac{\sqrt{\text{نہا} \leftarrow 2 \text{س}}}{(\text{نہا} \leftarrow 2 \text{س})} = \frac{\sqrt{\text{نہا}}}{2+2 \text{س}} \quad (\text{ب})$$

(ب) $\left. \begin{array}{l} \infty : \text{إذا كانت عددًا زوجياً} \\ \infty - : \text{إذا كانت عددًا فردياً} \end{array} \right\} = \text{نہیں } \infty \leftarrow \infty$

(ج) نہا س = م .

مثال (۵ - ۸)

أوجد : أ) $\sqrt[n]{\frac{n}{n-1}}$ ، ب) $\sqrt[n]{\frac{n}{n-1}}$ ، ج) $\sqrt[n]{\frac{n}{n-1}}$.

الحل :

(أ) نهـا س° = ° ۲ = ۳۲ ، (ب) نهـا س° = ° ۲ = ۳۲

$$(ج) \sqrt[n]{\frac{نہا}{س} + \frac{نہا}{س} - \frac{نہا}{س}} = \sqrt[n]{\frac{نہا}{س} - \frac{نہا}{س}} = \sqrt[n]{1-1} = \sqrt[n]{0} = 0 \text{ صفرًا} .$$

هـ. $\forall A \in \mathcal{A}^+$ فإن :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{نہ } \infty \leftarrow \text{اس}^{\circ}, [\ni \text{ا}, \cdot, \infty] \\ - \text{نہ } \infty \leftarrow \text{اس}^{\circ}, [\ni \text{ا}, \cdot, -\infty] \end{array} \right\} = \text{نہ } \infty \leftarrow \text{اس}^{\circ}$$

۶ ■ إذا كانت $\infty \pm = (س) \leftarrow$ وكان $\infty \pm = [د(س) \pm ب] \leftarrow$ ، فإن: $\infty \pm = [د(س) \pm ب] \leftarrow$ ،

مثال (۵ - ۹)

احسب نهاية الدالة التالية : $\lim_{s \rightarrow 4} \frac{|s^2 - 16|}{s - 4}$ عند النقاط التي يتغير حولها تعريف الدالة .

الحل :

س^٢ - ١٦ = ٠ $\Leftrightarrow$ س = ± ٤ ، ونعلم أن :

$$\left. \begin{array}{ll} \text{عندما } s < \epsilon & \epsilon + s = \frac{s^2 - 16}{s - \epsilon} \\ \text{عندما } s = \epsilon & \text{غير معرفة} \\ \text{عندما } \epsilon - s > s > \epsilon & \epsilon - s - \\ \text{عندما } s = \epsilon - & \text{صفرًا} \\ \text{عندما } s > \epsilon - & s + \epsilon \end{array} \right\} = d(s)$$

أي أن النقاط التي يتغير حولها تعريف الدالة إذا كانت هي : $s = \xi$ ، $s = -\xi$

۱. ■ عندما س ← ٤

د : معرفة حول س = ٤ بقاعدتين .

ولحساب كلٍّ من النهايتين اليمنى واليسرى للدالة عند $s = 4$ ، مع مراعاة شروط النهاية نجد أن .

$$\text{نهاية د(س)} = \text{نهاية } (s+4) = \text{نهاية } s + \text{نهاية } 4 = 4 + 4 = 8 ,$$

$$\text{نهاية د(س)} = \text{نهاية } (s-4) = \text{نهاية } s - \text{نهاية } 4 = 4 - 4 = 0 .$$

∴ نهاية د(س) ليس لها وجود ، ذلك لأن : نهاية د(س) ≠ نهاية د(س)

■ ٢ عندما $s \leftarrow 4$

$$\text{نهاية د(س)} = \text{نهاية } (s-4) = \text{نهاية } s - \text{نهاية } 4 = 4 - 4 = 0 \text{ صفراً} .$$

$$\text{ق نهاية د(س)} = \text{نهاية } (s+4) = \text{نهاية } s + \text{نهاية } 4 = 4 + 4 = 8 \text{ صفراً}$$

∴ نهاية د(س) = صفراً (موجودة) ذلك لأن :

$$\text{نهاية د(س)} = \text{نهاية د(س)}$$

حالات عدم التعيين :

في حالة عدم التعيين بالصورة : $\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ ، $\frac{\infty}{\infty}$ ، الناتجة عن التعويض المباشر في متغير

الدالة المعطاة على النحو الموضح في الأمثلة التالية .

مثال (٥ - ١٠)

$$\text{أوجد : نهاية } \frac{s^2 - 3s + 1}{s^2 + 2s - 3}$$

الحل :

في حالة التعويض المباشر عن متغير الدالة المعطاة نجد أن :

$$\frac{\infty}{\infty} = \frac{1 + (\infty)^2 - 3(\infty)}{3 - (\infty)^2 + 2(\infty)} = (\infty)$$

$$\text{ولكن د(س)} = \frac{(s-1)(s-2)}{(s+3)(s-1)} = \frac{s-2}{s+3} , \quad s \neq 1 , \quad s \neq -3$$

$$\text{نهاية } \frac{s-2}{s+3} = \text{نهاية } s - \text{نهاية } 2 = \infty - 2 = \infty$$

$$\text{و نهاية } \frac{s-2}{s+3} = \text{نهاية } s + \text{نهاية } 3 = \infty + 3 = \infty$$

نهـيا $\xrightarrow{s \rightarrow \infty} \frac{1-s}{3+s} = \frac{\infty}{\infty}$ (حالة عدم التعيين) - أيضاً - عندئذٍ يتطلب الأمر تقسيم بسط الكسر ومقامه

على أكبر أس ، لمتغير الدالة لتكون الدالة بالصورة :

$$\begin{aligned} \text{د(س)} &= \frac{\frac{1}{2s} + \left(\frac{1}{s}\right)^3 - 2}{\frac{3}{2s} - \left(\frac{1}{s}\right)^2 + 1} \\ \text{نهـيا } \xrightarrow{s \rightarrow \infty} \text{د(س)} &= \frac{0 + 0 \times 3 - 2}{0 - 0 \times 2 + 1} = \frac{-2}{1} = -2 \end{aligned}$$

مثال (٥ - ١١)

لتكن د(س) = $\frac{3 - \sqrt{3+s}}{3-s}$ ، أوجد نهـيا $\xrightarrow{s \rightarrow 3^-}$ د(س) .

الحل :

عندما $s = 3$ ؛ فإن الدالة الكسرية تصبح بالصورة د(3) = $\frac{3 - \sqrt{3+3}}{3-3}$

$$\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}} = \frac{3-3}{3-3} =$$

د : معرفة على $\{s : s \leq \frac{3-}{2}, s \neq 3\}$ لماذا ؟

الدالة معرفة في فترة حول $s = 3$ ، ويتطلب ضربها في مرافق البسط للتخلص من الجذور بالصورة :

$$\text{د(س)} = \frac{3 - \sqrt{3+s}}{3-s} \times \frac{3 + \sqrt{3+s}}{3 + \sqrt{3+s}} = \frac{9 - 3 + s}{(3 + \sqrt{3+s})(3-s)}$$

$$= \frac{2}{(3 + \sqrt{3+s})(3-s)} \quad \text{حيث } s \neq 3 \quad .$$

$$\text{نهـيا } \xrightarrow{s \rightarrow 3^-} \text{د(س)} = \frac{2}{3 + \sqrt{3+6}} = \frac{2}{3 + 3} = \frac{1}{3}$$

تمارين ومسائل (٥ - ١)

[١] أوجد ما يلي :

ب) نهـا $\frac{1}{(2s^2 + s - 1)^2}$ س $\leftarrow 1$

أ) نهـا $(s^2 - 2s + 3)$ س $\leftarrow 1$

د) نهـا $\sqrt{1-s}$ س $\leftarrow 1$

ج) نهـا $\frac{s^2 - 5s + 6}{s^2 + 2s + 1}$ س $\leftarrow 2$

[٢] أوجد ما يلي :

ب) نهـا $\frac{(2s - 5)^9 - 1}{s - 3}$ س $\leftarrow 3$

أ) نهـا $\sqrt{2-s}$ س $\leftarrow 4$

[٣] ابحث نهاية الدالة $\frac{|s|}{s}$ عندما س $\leftarrow 0$. موضحاً حالة وجودها بالرسم .

[٤] أثبت أن: نهـا $\frac{\sqrt{s+1} - \sqrt{s-1}}{s^2}$ س $\leftarrow 2$ $\frac{1}{2}$

[٥] الدالة د(س) معرفة على النحو التالي :

د(س) = $\left. \begin{array}{l} s^2 : s > 0 \\ s^2 + 1 : s \leq 0 \end{array} \right\}$

أوجد نهاية الدالة د(س) عندما س تقترب من الصفر .

[٦] أوجد نهاية الدوال التالية :

أ) د(س) = $\sqrt{s^2 + 1} - \sqrt{s^2 - 1}$ عندما س $\leftarrow \infty$.

ب) د(س) = $\frac{s^3 + 3}{s^2 - 9}$ عندما س $\leftarrow -\infty$.

ج) د(س) = $\frac{s^3 + 2s - 3}{s^2 + 3s - 2}$ عندما س $\leftarrow \pm \infty$.

د) د(س) = $\frac{7}{s^2(s-4)}$ عندما س $\leftarrow 4$.

[٧] ادرس نهاية الدالة د(س) = $\frac{1}{|1-s|}$ ، عندما س $\leftarrow 1$.

الاتصال

٥ : ٢

يرتبط مفهوم اتصال الدوال ارتباطاً وثيقاً بمفهوم النهايات .

فإذا نظرت لمفهوم الاتصال من وجهة نظر هندسية تجد أن الدالة d تكون متصلة في الفترة f ، إذا أمكنك

رسم المنحنى الممثل لها في هذه الفترة دون أن ترفع رأس القلم عن الورقة التي ترسم عليها .


وبالتالي يتم التعامل مع مفهوم الاتصال وفق حالتين هما :

أولاً - اتصال دالة عند نقطة :


تأمل الحالات الأربع المرسومة أدناه في الشكل (٥ - ١٠) ، ماذا تلاحظ على سلوك الدوال الأربع عند النقط

س = ١ ؟

(ب)




(أ)




$$د (س) = س + ١$$

$$مر (س) = \frac{س - ٢}{س - ١} ، س \neq ١$$

(د)



(جـ)



$$هـ (س) = \begin{cases} س + ١ ، س > ١ \\ س + ٢ ، س \leq ١ \end{cases}$$

$$و (س) = \frac{١}{س - ١} ، س \neq ١$$

الشكل (٥ - ١٠)

يلاحظ من الأشكال الأربعة الفرعية (١)، (ب)، (ج)، (د) للشكل (٥-١٠) لبيان الدوال $\mathcal{M}(S)$ ، $\mathcal{D}(S)$ ، $\mathcal{W}(S)$ ، $\mathcal{H}(S)$ عندما $S=1$ ؛ أن منحني الدالة $\mathcal{D}(S)$ متصل عند $S=1$ بينما بقية الدوال لا تتمتع بتلك الميزة؛ عندئذٍ يمكن إنشاء الجدول (٥-٧) لإيضاح شروط استكمال خاصية الاتصال وفقاً لتعريف الدالة عند نقطة معينة، ونهايتها، وقيمتها عند نفس النقطة لمقارنة الأشكال السابقة بحسب الترتيب.

جدول (٥-٧)

الدالة	ما قيمة الدالة عندما $S=1$ ؟	ما نهاية الدالة عند $S=1$ ؟	هل قيمة الدالة تساوي نهايتها عند النقطة $S=1$ ؟
$\mathcal{M}(S)$	غير معرفة	نهاية $\mathcal{M}(S)=2$ $S \leftarrow 1$	لا
$\mathcal{D}(S)$	$\mathcal{D}(1)=2$	نهاية $\mathcal{D}(S)=2$ $S \leftarrow 1$	نعم
$\mathcal{W}(S)$	غير معرفة	ليس لها نهاية	لا
$\mathcal{H}(S)$	$\mathcal{H}(1)=3$	نهاية $\mathcal{H}(S)=2$ $S \leftarrow 1$ نهاية $\mathcal{H}(S)=3$ $S \leftarrow 1$	لا

بهذه المقارنات الموضحة في الجدول (٥-٧) يلاحظ أن خاصية الاتصال عند نقطة معينة (١) بشكل عام تتحقق إذا توافرت الشروط التالية:

- ١ ■ أن تكون الدالة معرفة عند النقطة $S=1$.
- ٢ ■ أن تكون للدالة نهاية عند النقطة $S=1$.
- ٣ ■ أن تكون: نهاية $\mathcal{D}(S)=\mathcal{D}(1)$.

تعريف (٥-٥)

يقال أن الدالة متصلة من اليمين عند النقطة ١ إذا كانت الدالة معرفة على الفترة المغلقة $[1, b]$ ، $\exists f$ بحيث $b \geq 1 > j$.

وكانت: نهاية $\mathcal{D}(S)=\mathcal{D}(1)$.

تعريف (٥-٦)

يقال أن الدالة $\mathcal{D}$ متصلة من اليسار عند النقطة ١ إذا كانت الدالة معرفة على الفترة المغلقة $[j, 1]$ ، $\exists f$ ، بحيث $b > 1 \geq j$ ، وكانت: نهاية $\mathcal{D}(S)=\mathcal{D}(1)$.

وبصورة عامة يُعرّف اتصال دالة عند نقطة كما يلي :

تعريف (٥-٧)

يقال أن الدالة d متصلة عند a إذا كانت الدالة معرفة على الفترة المغلقة $[a, b]$ ، وكانت : $\lim_{x \rightarrow a^+} d(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} d(x) = d(a)$.

مثال (٥-١٢)

ادرس اتصال الدالة $d(x) = |x|$ عندما $x = 0$ صفراً

الحل :

$$\left. \begin{array}{l} x \leq 0 : \\ x > 0 : \end{array} \right\} = |x|$$

١. الدالة $d(x)$ معرفة عند الصفر حيث $d(0) = 0$ صفراً .

٢. $\lim_{x \rightarrow 0^+} d(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$ صفراً .

$\lim_{x \rightarrow 0^-} d(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$ صفراً .

∴ $\lim_{x \rightarrow 0} d(x) = 0$ صفراً .

٣. $\lim_{x \rightarrow 0} d(x) = d(0) = 0$.

∴ الدالة متصلة عند $x = 0$ صفراً .

مثال (٥-١٣)

ناقش اتصال الدالة $d(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$ عند $x = 2$

الحل :

∴ مجموعة التعريف (م.ت) للدالة $= \mathbb{R} \setminus \{2\}$. أي أن الدالة غير معرفة عند $x = 2$.

∴ الدالة غير متصلة عند $x = 2$ لانتهاء أحد الشروط الأساسية لتحقيق خاصية الاتصال عند نقطة ،

ويمكن إعادة تعريف الدالة لتكون متصلة عند $x = 2$ باستخدام التحليل بالصورة :

$$d(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)} = x^2 + 2x + 4$$

$$\left. \begin{array}{l} x \neq 2 , \\ x = 2 , \end{array} \right\} = d(x)$$

$$\therefore \text{نهـيا} \leftarrow_{\text{س}} \text{د} (س) = \text{نهـيا} \leftarrow_{\text{س}} (س + ٢ + ٢ + ٤ = ١٢) ، \text{د} (٢) = ١٢ .$$

$$\text{نهـيا} \leftarrow_{\text{س}} \text{د} (س) = \text{نهـيا} \leftarrow_{\text{س}} \text{د} (س) = \text{نهـيا} \leftarrow_{\text{س}} \text{د} (٢) = ١٢$$

وهذا يعني أنه بالتعريف الجديد يمكن أن تكون الدالة متصلة عند النقطة $س = ٢$.

ثانياً : اتصال دالة على فترة :

تعرف أن المعنى الهندسي لاتصال دالة يعني أن منحنى الدالة لا ينقطع عند أية نقطة من بيان الدالة ؛ ولهذا يقال أن الدالة متصلة على فترة مفتوحة $ف \subset ح$ إذا كانت متصلة عند جميع نقاط تلك الفترة .

تعريف (٥-٨)

يقال إن الدالة $د$ متصلة على الفترة المفتوحة $ف = [ب ، ج]$ إذا كانت متصلة عند كل نقطة تنتمي إلى هذه الفترة .

وبصورة رمزية يعبر عن شروط اتصال دالة $د$ في فترة مغلقة $ف = [ب ، ج]$ على النحو التالي :

$$أ) \quad \text{د} \in [ب ، ج] ، \text{فإن} : \text{نهـيا} \leftarrow_{\text{س}} \text{د} (س) = \text{د} (أ) ،$$

$$ب) \quad \text{نهـيا} \leftarrow_{\text{س}} \text{د} (س) = \text{د} (ب) ،$$

$$ج) \quad \text{نهـيا} \leftarrow_{\text{س}} \text{د} (س) = \text{د} (ج) .$$

مثال (٥-١٤)

$$\text{ابحث اتصال الدالة } \text{د} (س) = \frac{١}{١-س} \text{ على الفترة } [٢ ، ٣] .$$

الحل :

$$م. ت = ح / \{١\} ، \text{وبفرض أن } س = ١ \text{ نجد أن : } \text{د} (١) = \frac{١}{١-١} ، \text{د} \in ح / \{١\} .$$

$$\therefore \text{د} (١) = \frac{١}{١-١} ، \text{د} \in [٢ ، ٣] \subset ح / \{١\} . \text{ ————— (١)}$$

$$\text{نهـيا} \leftarrow_{\text{س}} \text{د} (س) = \text{نهـيا} \leftarrow_{\text{س}} \frac{١}{١-س} ، \text{د} \in ح / \{١\} .$$

$$= \frac{١}{١-١} ، \text{د} \in [٢ ، ٣] \text{ ————— (٢)}$$

من (١) ، (٢) ينتج أن الدالة $د(س)$ متصلة على الفترة $[٢ ، ٣]$ ، ومتصلة على جميع نقاط $ح$ ، $س \neq ١$.

خواص الدوال المتصلة :

■ ١ لتكن $(د)$ ، $(س)$ ، $(م)$ دالتين متصلتين على الفترة $[ب، ج]$ عند النقطة $ا$ $\ni$ ف ؛ فإن كلاً من الدوال التالية تكون متصلة عند $ا$ على الفترة نفسها :

$$١) (د) \pm (س) \text{ (س)} ، (ب) \cdot (د) \text{ (س)} ، \vee ك \ni ح ،$$

$$ج) (د) \cdot (س) \text{ (س)} ، (د) \frac{(س)}{(م)} ، (م) \neq ٠ .$$

■ ٢ إذا كانت $(د) \leq ٠$ معرفة على الفترة $ف$ ، فإن الدالة $\sqrt{د(س)}$ متصلة على نفس الفترة .

■ ٣ الدالة الثابتة والحدودية متصلة على أية فترة مغلقة في مجموعة تعريفها ذلك لأن الدالة الثابتة $(د) = ا$ ، $ا$ ثابت لجميع قيم $س$ (مجموعة التعريف) ودالة المطابقة $(س) = س$ هما دالتان متصلتان ، $\vee س \ni ح$ ، وفقاً للفقرة (ج) الخاصة (١) نستنتج أن الدالة $ا س^٢$ ، $م \ni ط$ متصلة ، $\vee س \ni ح$ ، ومن الفقرة (أ) للخاصية (١) ينتج أن دالة كثيرة الحدود على الصورة :

$$(د) = (س) = ا_٣ س^٣ + ا_٢ س^٢ + ا_١ س + ا_٠ \text{ دالة متصلة } \vee س \ni ح .$$

مثال (٥ - ١٥)

ابحث اتصال الدالة $(د) = \sqrt{٩ - س^٢}$ على مجموعة تعريفها .

الحل :

د : معرفة بشرط أن $٩ - س^٢ \geq ٠ \Leftrightarrow س^٢ \leq ٩ \Leftrightarrow |س| \leq ٣ \Leftrightarrow -٣ \leq س \leq ٣$.
ولكي نبحت اتصال الدالة في $[-٣، ٣]$.

■ ١ نبحت اتصال الدالة في $[-٣، ٣]$ بفرض أن $ا \ni [-٣، ٣]$.

$$\text{نهـ} \frac{ا}{س \leftarrow ا} (د) = \sqrt{٩ - س^٢} = \sqrt{٩ - \text{نهـ} \frac{ا}{س \leftarrow ا} (٩ - س^٢)} = \sqrt{٩ - ٩} = ٠ (ا) .$$

$$\therefore \text{نهـ} \frac{ا}{س \leftarrow ا} (د) = (س) = (ا) \Leftrightarrow د \text{ متصلة في } [-٣، ٣] .$$

■ ٢ نبحت اتصال د من اليمين عند $س = -٣$.

$$\text{نهـ} \frac{ا}{س \leftarrow -٣} (د) = \sqrt{٩ - \text{نهـ} \frac{ا}{س \leftarrow -٣} (٩ - س^٢)} = \sqrt{٩ - ٩} = \text{صفر} .$$

$$(د) = (-٣) = \sqrt{٩ - (-٣)^٢} = \text{صفر} .$$

$$\therefore \text{نهـ} \frac{ا}{س \leftarrow -٣} (د) = (-٣) \text{ أي أن الدالة متصلة على يمين } س = -٣ .$$

٣ ■ نبحت اتصال د من اليسار عند $s = ٣$.

$$\text{نہا} \leftarrow_{-3} \text{د(س)} = \text{نہا} \leftarrow_{-3} \sqrt{9 - \text{س}^2} = \text{صفرًا}.$$

$$. \text{ صفراً} = \sqrt{9-9} = (3) \text{ د}$$

نہا $\leftarrow 3$ د (س) = د (۳) $\Leftarrow$ د متّصلة على يسار س = ۳ ،

ومن (١) ، (٢) ، (٣) نستنتج أن : د متصلة في $[-٣ ، ٣]$.

تمارين ومسائل (٥-٢)

[١] ابحث اتصال الدالة $D(s) = |s - 1|$ عند $s = 1$.

[٢] إذا كانت الدالة $\mathcal{M}(s)$ $\left. \begin{matrix} s^2 : s > 1 \\ s : s \leq 1 \end{matrix} \right\}$ هل الدالة متصلة عند $s = 1$.

[٣] لتكن الدالة $(s) = \frac{s^2 - s - 12}{s - 4}$ ، $s \neq 4$ عرف الدالة عند $s = 4$ بحيث تكون متصلة

عند هذه النقطة .

[٤] حدّد مجال الدالة $h(s) = \sqrt{s^2 - 4}$ ، ثم ادرس اتصال الدالة على هذا المجال .

[٥] ناقش اتصال الدالة على مجالها موضحاً إجابتك بالرسم لكل من الدوال التالية :

$$\left. \begin{array}{l} ٢ \geq \text{س} : ١ + \text{س} \\ ٢ \leq \text{س} : ٢ + \text{س} \end{array} \right\} = (\text{س}) \text{ } \text{ } (١)$$

$$\frac{\text{س}^2 - 3\text{س} - 4}{\text{س}^2 + 4\text{س} - 5} = (\text{ب}) \text{ د} (\text{س})$$

$$\frac{|s^2 - 4s + 3|}{s - 1} = [6] \text{ لتكن د (س) } = \text{ناقش اتصال الدالة في ح كما يلي :}$$

أولاً - ابحث الاتصال في الفترات الجزئية من المجال .

ثانياً – ابحث الاتصال عند النقاط التي يتغير عندها تعريف الدالة .

[٧] إذا كانت $d(s) = \frac{s^3 - 1}{s - 1}$ ، $s \neq 1$ ، أعد تعريف الدالة عند $s = 1$ لتكون متصلة

عند هذه النقطة .

[٨] إذا كانت $\sqrt{s+1}$ ابحت اتصال د عند $s=1$.


معدل تغير الدالة

٥ : ٣

أدرس المثال التالي :

نفرض أن سيارة كانت تتحرك بسرعة ٢٠ كم/ساعة ، ثم أخذت تسير بسرعة متزايدة لتصل إلى ١٠٠ كم/ساعة في الساعة الأولى ، ثم تناقصت سرعتها لتصل عند نهاية الساعة الثانية إلى ٧٠ كم/ساعة . عندئذ تكون السرعة (ع) دالة في الزمن (د) . الأمر الذي يوضح ان سلوك الدالة من حيث تزايدها أو تناقصها عند قيم (د) يتوقف على المسافة التي تقطعها السيارة على النحو الموضح في الشكل (٥ - ١١) .

لاحظ أن :



الشكل (٥ - ١١)

ع. = ٢٠ ، عندما د. = صفر .

ع. = ١٠٠ ، عندما د. = ١ ساعة

ع. = ٧٠ ، عندما د. = ٢ ساعة .

وبالتالي فإن التغير في السرعة بالساعة الأولى هو :

$$\Delta ع = ع_١ - ع_٢$$

حيث يرمز لمقدار التغير بالرمز Δ (ويقرأ دلتا)

$$\Delta ع = ٢٠ - ١٠٠ = ٨٠ \text{ كم / ساعة}$$

أما في الساعة الثانية فإن مقدار التغير في السرعة هو :

$$\Delta ع = ع_٢ - ع_١ = ٧٠ - ١٠٠ = -٣٠ \text{ كم / ساعة}$$

من (١) ، (٢) نجد أن $\Delta ع$ قد أخذت قيمتين احدهما موجبة والأخرى سالبة تبعاً لسلوك الدالة .

مثال (٥ - ١٦)

لتكن $ص = س_٣ - س_٢$ أوجد مقدار التغير بالنسبة للمتغير س عند $س_٢ = ٢$ ، $س_٣ = ٣$ ، ثم أوجد مقدار التغير في الدالة عند هاتين القيمتين .

الحل :

$$\Delta س = س_٣ - س_٢ = ٣ - ٢ = ١$$

$$\Delta v = 1 - 6 = (3 - 4) - (3 - 9) = (3 - s_1^2) - (3 - s_2^2) = (s_1) - (s_2) = \Delta s$$

من تعريف الدالة $v = v(s)$ ، $\Delta v = v(s_1) - v(s_2)$ ، $\Delta s = s_1 - s_2$ ،

وإذا كانت $s_1, s_2 \in [a, b]$ فإن $\Delta v = v(s_1) - v(s_2)$

تمثل مقدار التغير في قيمة v ، أي أن

$$\Delta v = v(s_1) - v(s_2) = v(s_1) - v(s_2)$$

ولأن v دالة حقيقية متصلة في المتغير s فإنه عندما

تتغير s ، من s_2 إلى $s_1 + h$ فإن v تتغير

من $v(s_2)$ إلى $v(s_1 + h)$ ، أي أن التغير h في s

يقابله التغير $v(s_1 + h) - v(s_2)$ في v .

[انظر الشكل (١٢-٥)].

لذلك فإن ميل المستقيم الواصل بين النقطتين بدلالة

ظل الزاوية θ هو :

$$m = \tan \theta = \frac{\Delta v}{\Delta s} = \frac{v(s_1) - v(s_2)}{s_1 - s_2} = \frac{v(s_1 + h) - v(s_2)}{h} \quad (3)$$

وهذا ما نطلق عليه متوسط التغير.

فإذا رمزنا للتغير في قيمة s بالرمز Δs ، أو h ، وللتغير في قيمة v بالرمز Δv فإن :

$$\Delta s = s_1 - s_2 = h \iff s_1 = s_2 + h \quad \text{وكذلك}$$

$$\Delta v = v(s_1) - v(s_2) \iff v(s_1) = v(s_2 + h) \iff \Delta v = v(s_2 + h) - v(s_2)$$

عند $s = s_2$.

مثال (١٧-٥)

لتكن $v = s^2 + 5s - 1$. أوجد متوسط التغير في الدالة v في الفترة $[0, 2]$.

الحل :

$$\text{متوسط التغير} = \frac{v(s_1) - v(s_2)}{s_1 - s_2} = \frac{(s_1^2 + 5s_1 - 1) - (s_2^2 + 5s_2 - 1)}{s_1 - s_2}$$

$$= \frac{14}{2} = \frac{1+13}{0-2} = -7$$

مثال (١٨-٥)

احسب متوسط تغير الدالة $v(s) = s^2 + 3s$ عندما تتغير s من ١ إلى ٣.

الحل :

$$\begin{aligned} \text{متوسط التغير} &= \frac{د(س_1) - (هـ + س_1)}{هـ} ، \text{ وحيث إن } هـ = س_2 - س_1 = 3 - 1 = 2 \\ \text{فإن } \frac{\Delta \text{ص}}{هـ} &= \frac{(س_1 + هـ) + 3 - (س_1 + هـ) - (س_1 + هـ)}{هـ} \\ &= \frac{س_1 + 2 + هـ + س_1 + هـ + 3 - س_1 - هـ - س_1 - هـ}{هـ} = \frac{3 + هـ + س_1}{هـ} \\ &= 2 = س_1 + هـ + 3 = 7 \end{aligned}$$

مثال (٥ - ١٩)

أوجد متوسط التغير في الدالة $ص = س_2 - 1$ ، عندما تتغير $س$ من $س_1$ إلى $س_1 + هـ$.

الحل :

$$\begin{aligned} \text{متوسط التغير} &= \frac{د(س_1) - (س_2)}{س_1 - س_2} = \frac{د(س_1) - (هـ + س_1)}{س_1 - هـ + س_1} \\ &= \frac{(س_1 + هـ) - 1 - (س_1 + هـ) + 1}{هـ} = \frac{1 - س_1 - هـ}{هـ} \\ &= \frac{2 = س_1 + هـ + 2}{هـ} = س_1 + هـ + 2 \end{aligned}$$

وبأخذ نهاية طرفي المعادلة السابقة نجد أن :

$$\begin{aligned} \frac{د(س_1) - (س_2)}{س_1 - س_2} &= \frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{س}} \quad \text{نها } س_2 \leftarrow س_1 \quad \text{نها } س_1 \leftarrow س_2 \\ \frac{د(س_1) - (هـ + س_1)}{هـ} &= \frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{هـ}} \quad \text{نها } هـ \leftarrow هـ \quad \text{نها } هـ \leftarrow هـ \end{aligned}$$

وهي تمثل معدل تغير الدالة (أو نهاية متوسط التغير) .

مثال (٥ - ٢٠)

أوجد معدل تغير الدالة $ص = س_2$.

الحل :

$$\frac{د(س_1) - (س_2)}{هـ} = \frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{هـ}} = \frac{د(س_1) - (هـ + س_1)}{هـ} = \frac{س_1 + هـ - س_1 - هـ}{هـ} = 0$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{نهاية} \left(\frac{\text{س}^2 + 2\text{س} + 1 - \text{ه}^2}{\text{ه}} \right)}{\text{ه}} \\ &= \frac{\text{نهاية} \left(\frac{\text{ه}(\text{س}^2 + 2\text{س} + 1)}{\text{ه}} \right)}{\text{ه}} = \frac{\text{نهاية} (\text{س}^2 + 2\text{س} + 1)}{\text{ه}} \end{aligned}$$

مثال (٥-٢١)

أوجد متوسط تغير الدالة $د(س) = س^2 + 3س + 1$ عند $س = س_1$ ؛ ثم احسب متوسط التغير عندما تتغير $س$ من ٢ إلى ٢,٢ ، ومعدل التغير عندما $س = ٣$.

الحل :

$$\begin{aligned} \text{متوسط التغير} &= \frac{د(س_2) - د(س_1)}{س_2 - س_1} = \frac{د(٢) - د(١)}{٢ - ١} \\ &= \frac{س^2 + ٢س + ١ - (١ + ٣س + ١)}{٢ - ١} = \frac{س^2 + ٢س - ٣س}{١} = س - ١ \end{aligned}$$

$$\therefore س_1 = ٢ ، س_2 = ٢,٢ \therefore \text{ه} = ٢,٢ - ٢ = ٠,٢$$

$\therefore$ متوسط التغير عندما تتغير $س$ من ٢ إلى ٢,٢ $= ٢,٢ - ١ = ١,٢$.

$$\text{معدل التغير} = \frac{\Delta \text{ص}}{\Delta \text{س}} = \frac{\text{نهاية} - \text{بداية}}{\text{س}_2 - \text{س}_1} = \frac{٣ + ٢س_2 - (٣ + ٢س_1)}{س_2 - س_1}$$

$$\text{معدل التغير عند } (س = ٣) = (٣ + ٢ \times ٢) - (٣ + ٢ \times ١) = ٩$$

مثال (٥-٢٢)


لتكن $د(س) = س^2 + ١$ ، ونفترض أن لدينا جسيماً يسير على خط مستقيم حسب قاعدة الدالة $د$ ، وأنه قد تحرك من النقطة $س_1 = ١$ إلى النقطة $س_2 = ٣$ ، أوجد ما يلي :

(أ) $\Delta س$

(ب) $\Delta \text{ص}$

(ج) معدل التغير

(د) ميل المماس عندما $س = ٢$.



الشكل (٥-١٣)

الحل :

$$(أ) \Delta s = s_2 - s_1 = 3 - 1 = 2$$

$$(ب) \Delta v = v_2 - v_1 = (د(س_2)) - (د(س_1)) = (1 + 2س_2) - (1 + 2س_1)$$

$$= (1 + 10) - (1 + 9) = 8$$

$$(ج) \text{ معدل التغير } = \frac{\Delta v}{\Delta s} = \frac{8}{2} = 4$$

(د) بما أن ميل المماس للدالة هو ميل الخط المستقيم في نقطة تماسه مع الدالة ، يتحقق عندما يقترب معدل التغير الأفقي من الصفر ، فإن :

$$\Delta s \leftarrow 0 \quad \frac{\Delta v}{\Delta s} = \frac{د(س_2) - د(س_1)}{س_2 - س_1} \quad \text{نهـ} \quad \Delta s \leftarrow 0$$

وبالتعويض عن قيمة $s_2 = \Delta s + s_1$ نجد أن :

$$\Delta s \leftarrow 0 \quad \frac{\Delta v}{\Delta s} = \frac{د(س_1 + \Delta s) - د(س_1)}{\Delta s}$$

وبالتالي يكون ميل المماس عندما $s = 2$ هو :

$$\Delta s \leftarrow 0 \quad \frac{د(2 + \Delta s) - د(2)}{\Delta s} = \frac{د(2) - د(1)}{\Delta s} \quad \text{نهـ} \quad \Delta s \leftarrow 0$$

$$\Delta s \leftarrow 0 \quad \frac{د(2 + \Delta s) - د(2)}{\Delta s} = \frac{5 - 1 + 2(س_1 + \Delta s) + 4\Delta s + 4}{\Delta s} \quad \text{نهـ} \quad \Delta s \leftarrow 0$$

$$\Delta s \leftarrow 0 \quad \frac{د(2 + \Delta s) - د(2)}{\Delta s} = 4$$

مثال (٢٣ - ٥)

تحرك جسيم حسب الدالة $د(ت) = ٥ + ٤ت + ٢ت^2$ ، حيث $ت$ هي الزمن بالثواني ، احسب السرعة المتوسطة في الفترة $[٢ ، ١٠]$.

الحل :

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{\text{المسافة عند النقطة النهائية} - \text{المسافة عند النقطة الابتدائية}}{\text{مقدار التغير}}$$

$$= \frac{د(١٠) - د(٢)}{١٠ - ٢} = \frac{(٥ + ١٠٤ + ٢٠٠) - (٥ + ٨ + ٨)}{٨} = ٢٥$$

$$\therefore ١٠ = ٢٠ ، ٢ = ٢٥$$

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{(5 + 2 \times 4 + 2) - (5 + 10 \times 4 + 2)}{2 - 10} = \frac{17 - 145}{8} = \frac{128}{8} = 16 \text{ م/ث}.$$

مثال (٥ - ٢٤)

يتحرك جسم على خط مستقيم بحيث كان بعده عن نقطة الأصل بالأمتار بعد $\varnothing$ من الثواني يساوي $9\varnothing^2 + 2\varnothing$. احسب معدل تغير سرعة الجسم عند $\varnothing = 10$ ثانية.

الحل :

$$\begin{aligned} \frac{\Delta \text{نها}}{\Delta \text{هـ}} &= \frac{9(9\varnothing^2 + 2\varnothing) - 9(9\varnothing^2 + 2\varnothing)}{9 - 10} \\ &= \frac{9(9\varnothing^2 + 2\varnothing) - 9(9\varnothing^2 + 2\varnothing)}{9 - 10} \\ &= \frac{9(9\varnothing^2 + 2\varnothing) - 9(9\varnothing^2 + 2\varnothing)}{9 - 10} \\ &= \frac{9(9\varnothing^2 + 2\varnothing) - 9(9\varnothing^2 + 2\varnothing)}{9 - 10} \\ &= \frac{9(9\varnothing^2 + 2\varnothing) - 9(9\varnothing^2 + 2\varnothing)}{9 - 10} \\ &= \frac{9(9\varnothing^2 + 2\varnothing) - 9(9\varnothing^2 + 2\varnothing)}{9 - 10} \end{aligned}$$

∴ معدل التغير عند $(\varnothing = 10) = 9 + 40 = 9 + 10 \times 4 = 49 \text{ م/ث}.$

تمارين ومسائل (٥ - ٣)

[١] إذا كانت $ص = ٥س + ٢س - ١$. أوجد متوسط التغير في الدالة $ص$ في الفترة $[٠, ٢]$.

[٢] إذا كان $د(س) = ٣س + ٥$. أوجد متوسط التغير في الدالة عندما تتغير $س$ كما يلي :

أ (من ٢ إلى ٤ ، ب (من ٣ إلى ٦ .

[٣] أوجد متوسط التغير فيما يلي :

أ ($ص = ٢س - ١ + س$ عندما $س = ٢$ ، $هـ = ٢$.

ب ($ص = \frac{١}{س}$ عندما $س = ١,٥$ ، $هـ = ١$ ،

ج ($ص = \sqrt{٣ + س}$ عندما تتغير $س$ من ١ إلى ١ - ،

د ($هـ(د) = ٢ + د$ عندما تتغير $د$ من ٥ إلى ٣ .

[٤] أوجد معدل تغير الدالة عند النقاط المذكورة لكل منها :

١ ■ $ص = ٢س + ٤$ عندما $س = ١$ ، ٢ ■ $ص = ٢س^٢ - ٣س$ عندما $س = \frac{١}{٢}$ ،

٣ ■ $ص = \sqrt{١ + ٢س}$ عندما $س = ٢$ ، ٤ ■ $د(د) = ٢ + د - ١$ عندما $د = ١,٤$ ،

٥ ■ $ص = (١ + س)^٢$ عندما $س = -١$.

[٥] إذا تحرك جسيم على خط الأعداد ، وكان موقعه في اللحظة s معرفاً بالدالة $v = 8s - s^2$ ؛ حيث s بالثواني ، $d(s)$ بالأمتار ؛ فأوجد السرعة المتوسطة في الفترة الزمنية [١ ، ٣] .

[٦] احسب متوسط تغير الدالة $d(s) = \sqrt{2 - s}$ على الفترة [٣ ، ٥ ، ٤] .

[٧] تتمدد صفيحة مربعة الشكل بحيث تظل محتفظة بشكلها ، احسب متوسط التغير في مساحتها عندما يتغير طول ضلعها من ١٠ إلى ١٠,١ سم ، ثم احسب معدل التغير عندما يكون طول ضلعها ٢٠ سم .

[٨] تتمدد صفيحة دائرية بالتسخين ، احسب متوسط التغير في مساحتها عندما يتغير طول نصف قطرها من ٨ سم إلى ٨,٢ سم .

[٩] تتحرك دراجة نارية في خط مستقيم ، بحيث تكون سرعتها عند اللحظة d معطاة بالعلاقة $e = 5 + 2d$ متر / ث . احسب معدل تغير السرعة عند $d = 4$ ثواني .

[١٠] وعاء إسطواني الشكل طول نصف قطر قاعدته ١٢ سم فيه ماء . فإذا تم تبريد الماء ، بحيث تغير ارتفاعه في الوعاء من ١٦ سم إلى ١٤ سم . أوجد متوسط التغير في حجم الإناء ؟ ومعدل التغير في حجم الإناء عند الارتفاع ١٥ سم ؟ (حجم الاسطوانة $\pi r^2 h$ ، $\pi = 3,14$) .

المشتقة

٥ : ٤

بعد أن تعرّف على نهاية الدالة ومتوسط تغيرها ومعدلها يمكننا أن نتطرق إلى مفهوم المشتقة ، وتعتبر النهايات هي الأساس في دراسة الاشتقاق ؛ فالمشتقة هي عبارة عن نهاية متوسط تغير (أي معدل تغير) الدالة $d(s)$ عند نقطة معينة s_1 في مجموعة تعريفها .

تعريف (٥-٩)

إذا كانت الدالة $d(s)$ معرفة في الفترة المفتوحة $[a, b]$ ، فإن معدل التغير اللحظي للدالة $d(s)$ عند النقطة $s_1 \in [a, b]$ ، تسمى مشتقة الدالة $d(s)$ عند هذه النقطة ، ويرمز له بالرمز $d'(s_1)$ ويقرأ دال شرطة s_1 ويكتب رمزياً :

$$d'(s_1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{d(s_1 + h) - d(s_1)}{h} .$$

يرمز أيضاً للمشتقة $d'(s)$ بالرمز $\frac{dv}{ds}$ (ويقرأ دال ص على دال س) .

أي أنه إذا كانت النهاية موجودة ؛ فإنه يمكن القول أنّ الدالة d لها مشتقة عند النقطة s_1 ، والعكس صحيح . أي أنه إذا كانت قابلة للاشتقاق عند النقطة s_1 ، فإن $d'(s_1)$ موجودة .
وتمثل المشتقة الأولى ميل المماس للمنحنى عند نقطة محددة ، كما تمثل السرعة لجسم يتحرك عند لحظة معينة .

مثال (٥ - ٢٥)

باستخدام تعريف المشتقة . أوجد مشتقة الدالة $d(s) = 1 + s^4$.

الحل :

المشتقة هي :

$$d'(s) = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta d}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{d(s_1 + \Delta s) - d(s_1)}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{(1 + (s_1 + \Delta s)^4) - (1 + s_1^4)}{\Delta s}$$

$$= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{1 + s_1^4 + 4s_1^3\Delta s + 6s_1^2(\Delta s)^2 + 4s_1(\Delta s)^3 + (\Delta s)^4 - 1 - s_1^4}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{4s_1^3\Delta s + 6s_1^2(\Delta s)^2 + 4s_1(\Delta s)^3 + (\Delta s)^4}{\Delta s}$$

$$= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} (4s_1^3 + 6s_1^2\Delta s + 4s_1(\Delta s)^2 + (\Delta s)^3) = 4s_1^3$$

ملاحظة :

نلاحظ أن $d'(s) = 4s^3$ ، حيث إن $d(s) = 1 + s^4$ ، يمثل مستقيماً وبالتالي فإن ميله هو

$$m = \frac{\Delta d}{\Delta s} \text{ يساوي مقداراً ثابتاً . (لاحظ أن } \frac{\Delta d}{\Delta s} \text{ هي نفسها } d'(s) \text{ أو } \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta d}{\Delta s} \text{) .}$$

مثال (٥ - ٢٦)

سيارة تتحرك بخط مستقيم ، فإذا كانت المسافة التي قطعتها تُعطى بالقاعدة :

$f = d(3) = 12(3)^2 + 15(3)$ ، وباعتبار أن f هي المسافة بالكيلومترات ، d تمثل قيمة الزمن

بالساعة ، فأوجد :

١ ■ المسافة المقطوعة بعد ثلاث ساعات .

٢ ■ $\left. \frac{df}{ds} \right|_{s=3}$ (السرعة اللحظية عند الزمن $d = 3$ ساعات ، باستخدام تعريف المشتقة) .

الحل :

١ ■ المسافة المقطوعة بعد ثلاث ساعات هي : $d(3) = 12(3)^2 + 15(3)$.

$$d(3) = 12(3)^2 + 15(3) = 108 + 45 = 153 \text{ كم .}$$

٢ ■ $f' = \frac{df}{ds} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{d(s_1 + \Delta s) - d(s_1)}{\Delta s}$

$$= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{12(s_1 + \Delta s)^2 + 15(s_1 + \Delta s) - (12s_1^2 + 15s_1)}{\Delta s}$$

$$\text{ف} = \frac{12\text{هـ} + 24\text{هـ} + 12\text{هـ} + 10\text{هـ} - 12\text{هـ} - 10\text{هـ}}{\text{هـ}}$$

$$\frac{12\text{هـ} + 24\text{هـ} + 12\text{هـ} + 10\text{هـ}}{\text{هـ}} = \frac{12\text{هـ} + 24\text{هـ} + 12\text{هـ} + 10\text{هـ}}{\text{هـ}}$$

$$\text{ف} = \frac{12\text{هـ} + 24\text{هـ} + 12\text{هـ} + 10\text{هـ}}{\text{هـ}}$$

$$\therefore \text{د}(\text{ف}) = \frac{\text{ف}}{\text{د}} = \frac{12\text{هـ} + 24\text{هـ} + 12\text{هـ} + 10\text{هـ}}{10\text{هـ}}$$

ثم نحسب قيمة المشتقة عندما $\text{د} = 3$ ، فيكون: $\frac{\text{ف}}{\text{د}} = \frac{12\text{هـ} + 24\text{هـ} + 12\text{هـ} + 10\text{هـ}}{3\text{هـ}} = 87$.
وهي السرعة اللحظية عند الساعة الثالثة من بدء الحركة.
∴ السرعة اللحظية عندما $(\text{د} = 3 \text{ ساعات})$ هي 87 كم / ساعة .

تدريب (٥ - ١)

ادرس قابلية اشتقاق الدالة $\text{د}(\text{س}) = \begin{cases} 2\text{س} + 1, & \text{س} \leq 2 \\ 2\text{س} + 2, & \text{س} > 2 \end{cases}$

نجد المشتقة لكل جزء على حدة أي للفترة 2 ، $2 + \infty$ ، وللفترة $2 - \infty$ ، 2 .
ثم نبحث في المشتقة $\text{د}(\text{س})$ عند نقطة الشعب $\text{س} = 2$.
نلاحظ: $\text{د}^+(\text{س}) = 2$ (قيمة المشتقة من اليمين).
 $\text{د}^-(\text{س}) = 2$ (قيمة المشتقة من اليسار).
أي أن $\text{د}^+(\text{س}) \neq \text{د}^-(\text{س})$ ، ومنها تستنتج أن $\text{د}(\text{س})$ غير موجودة.
من ذلك نلاحظ أن:

١ ■ إذا وجدت مشتقة للدالة عند النقطة س_0 ، فإننا نقول أن د قابلة للاشتقاق عند النقطة س_0 ، وإذا وجدت مشتقة للدالة د عند كل نقطة من نقاط الفترة المفتوحة 2 ، $2 + \infty$ ، فإننا نقول أن الدالة قابلة للاشتقاق في هذه الفترة، وكذلك إذا كانت الدالة قابلة للاشتقاق في الفترة $2 - \infty$ ، 2 ، فإننا نقول أن الدالة قابلة للاشتقاق عند كل $\text{س} \in \mathbb{R}$.

٢ ■ إذا كانت النهاية غير موجودة عند النقطة س_0 ، فإننا نقول أن الدالة ليس لها مشتقة عند النقطة س_0 .

٣ ■ غالباً ما نكتب مشتقة الدالة كدالة أخرى في المتغير المستقل س .

التفسير الهندسي للمشتقة:

إن فكرة المشتقة ظهرت من أجل حساب ميل المماس لمنحنى دالة عند نقطة معينة، ومن تعريف الدالة $\text{ص} = \text{د}(\text{س})$ فبإمكاننا تمثيل هذه الدالة هندسياً كما في الشكل (٥ - ١٣)، وإذا أخذنا النقطتين م ، ل حيث م هي: $(\text{س}_1, \text{د}(\text{س}_1))$ ، ل هي $(\text{س}_2, \text{د}(\text{س}_2) + \text{هـ})$ ؛ حيث $\text{هـ} \neq 0$.

ولكن كلما تقترب هـ تدريجياً من الصفر، أي هـ $\rightarrow 0$ ، فإن ل تأخذ أوضاعاً جديدة هي ل_١، ل_٢، ...، وتنطبق في النهاية على م، وتأخذ القطعة المستقيمة أوضاعاً جديدة هي م_١، م_٢، ...، وتأخذ في النهاية وضع المماس المرسوم للمنحنى عند النقطة م.


$$\frac{د(س_١) - د(س_١ + هـ)}{هـ} = \text{ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين}$$

فإذا اقتربت هـ من الصفر، فإننا نحصل على ميل المماس للمنحنى عند النقطة م من خلال النهاية

$$\frac{د(س_١) - د(س_١ + هـ)}{هـ} \text{ نهياً } \rightarrow 0$$

ومما سبق فقد تعرفنا أن هذه النهاية هي مشتقة الدالة عند س_١، أي أن د'(س_١) هي قيمة مشتقة الدالة عند النقطة (س_١، د(س_١)) تساوي ميل المماس المرسوم للمنحنى عند تلك النقطة، وتستنتج من ذلك أن معادلة المستقيم ك الذي يمر بالنقطة (س_١، د(س_١))، والذي ميله د'(س_١) هي:

$$د'(س_١) = \frac{ص - ص_١}{س - س_١}$$



الشكل (٥-١٤)

وهي معادلة المماس ك في النقطة (س_١، ص_١). $\Leftarrow$ $ص - ص_١ = د'(س_١) (س - س_١)$

مثال (٥-٢٧)

أوجد ميل المماس لمنحنى الدالة د(س) = س^٢ + س^٣، عندما س = -٢.

الحل:


ميل المماس لمنحنى الدالة عندما س = -٢ هو:

$$د'(-٢) = \frac{د(-٢ + هـ) - د(-٢)}{هـ} \text{ نهياً } \rightarrow 0 = \frac{(-٢ + هـ)^٢ + (-٢ + هـ)^٣ - (-٢)^٢ - (-٢)^٣}{هـ}$$

$$= \frac{٤ - ٤هـ + هـ^٢ + ٨ - ٦هـ + ٣هـ^٢ - ٨ + ٨هـ - ٨هـ^٢ + ٨هـ^٣ - (-٨ + ٨هـ - ٨هـ^٢ + ٨هـ^٣)}{هـ} \text{ نهياً } \rightarrow 0$$

$$= \text{نهاية} (8 - 5 + 2) = 8$$

أما إذا كان المستقيم $\mathcal{C}$ عمودياً على المماس $\mathcal{K}$ ، ويمر بنقطة التماس $(س_1, د_1)$ ، [انظر الشكل (٥-١٥)] ،



فإن ميل المستقيم $\mathcal{C}$ هو : $\frac{1-}{\overline{d(s_1)}}$
بحيث أن $\overline{d(s_1)} \neq 0$.

فتصبح معادلة العمودي هي :

$$\frac{1-}{\overline{d(s_1)}} = \frac{ص_1 - ص}{س_1 - س} = \mathcal{C}$$

$$\therefore ص - ص_1 = \frac{1-}{\overline{d(s_1)}} (س - س_1)$$

والسؤال هنا ، ماذا لو كانت قيمة المشتقة :


$$\overline{d(s_1)} = 0 ?$$

وللإجابة عنه : يكون المماس $\mathcal{K}$ موازياً للمحور

السيني [انظر الشكل (٥-١٦)] ، وتصبح معادلته

هي $ص = ص_1$ ، أما العمودي $\mathcal{C}$ فيكون موازياً

لمحور الصادات ، ومعادلته هي : $س = س_1$.



تدريب (٥-٢)

أوجد معادلتى المماس والعمودي لمنحنى الدالة $د(س) = س^2 - ٢س + ٧$ عند النقطة $(١, ٦)$.
وماذا تلاحظ ؟

مثال (٥-٢٨)

أوجد معادلة كل من المماس والعمودي لمنحنى الدالة $ص = \frac{1}{س+1}$ عند $س = ٢$.

الحل :

$$\frac{1}{(س+1)} = د(س) ، \quad \frac{1}{(س+1)+1} = د(س+1) ،$$

$$\therefore د(س) - د(س+1) = \frac{1}{س+1} - \frac{1}{(س+1)+1} = \frac{(س+1) - 1 - (س+1)}{(س+1)[(س+1)+1]} = \frac{1}{س+1} - \frac{1}{(س+1)+1}$$

$$\bar{د(س)} = \frac{1-}{س+1} = \frac{1-}{(س+1)(س+1)} = \frac{1-}{(س+1)[(س+1)+1]} = \frac{1-}{س+1}$$

وهو ميل المماس لمنحنى الدالة $د(س) = \frac{1}{س+1}$ عند النقطة التي إحداثيها السيني $س$ ، وبالتالي ميل المماس عند النقطة $س = 2$ هو :

$$\bar{د(2)} = \frac{1-}{2(2+1)} = \frac{1-}{9}$$

$$\therefore \text{معادلة المماس} = \frac{ص-ص_1}{س-س_1} = \bar{د(س_1)} ، \text{ وحيث إن } س_1 = 2 ، ص_1 = \frac{1}{3}$$

$$\therefore ص - ص_1 = \bar{د(س_1)} (س - س_1)$$

$$ص - \frac{1}{3} = \frac{1-}{9} (س - 2)$$

$$ص = \frac{1-}{9} س + \frac{2}{9} + \frac{1}{3}$$

$$ص = \frac{1-}{9} س + \frac{5}{9}$$

$$ص = \frac{1-}{9} (س - 5) ، \text{ وهي معادلة المماس.}$$

ولإيجاد معادلة العمودي :

$$ص - ص_1 = \frac{1-}{(س_1)\bar{د}} = \frac{1-}{(س_1)\bar{د}}$$

$$ص - \frac{1}{3} = \frac{1-}{(\frac{1-}{9})} (س - 2)$$

$$ص = 9س - \frac{53}{3} \text{ أو } 9س - 17\frac{1}{3}$$

$$ص = \frac{1}{3} (س - 27) ، \text{ وهي معادلة العمودي.}$$

أوجد النقطة الواقعة على المنحنى $ص = س^2$ ، والتي يوازي عندها المماس المستقيم الذي معادلته $ص = ٦س - ١$.

الحل :

$$\therefore ص = س^2 .$$

$$\therefore ص = ٢س \quad (\text{باستخدام تعريف المشتقة}) \quad \text{— (١)}$$

$\therefore$ ميل المماس عند أي نقطة هو $٢س$ ، وحيث إن ميل المماس يساوي ميل المستقيم $ص = ٦س - ١$

$$\therefore ص = ٦ \quad \text{— (٢)}$$

وبتساوي المعادلتين (١) ، (٢) ينتج أن :

$$٢س = ٦$$

$$\therefore س = ٣$$

وبالتعويض في معادلة المنحنى عند $س = ٣$ ، نحصل على $ص = ٩$

$\therefore$ توجد نقطة واحدة تقع على المنحنى ، يكون المماس عندها يوازي المستقيم $ص = ٦س - ١$ ، وهي

النقطة (٣ ، ٩) .

تمارين ومسائل (٥ - ٤)

[١] إذا كانت $ص = ٣س - ١$ ، $س = ١$ ، $س = ٣$ ، فأوجد :

أ ($\Delta س$) ، ب ($\Delta ص$) ، ج ($\frac{\Delta ص}{\Delta س}$) (متوسط المتغير)

د (نهـ) $\frac{\Delta ص}{\Delta س}$ عندما $س = ١$ (معدل التغير)

[٢] لتكن $د(س) = س^2 + ٣$ ، فأوجد ما يلي :

١ ■ رسم هذه الدالة ،

٢ ■ متوسط تغير الدالة عندما تتغير $س$ من ١ إلى ٣ ،

٣ ■ ميل القطعة $أ ب$ حيث $أ(١ ، ٤)$ ، $ب(٣ ، ١٢)$.

٤ ■ ميل المماس عند النقطة $أ(١ ، ٤)$.

[٣] باستخدام تعريف المشتقة ، أوجد مشتقة الدوال التالية فيما يأتي :

أ (د(س) = $\frac{١}{س+١}$ ، ب (د(س) = $س^2 + ٢$)

ج (د(س) = $\sqrt{١+٢س}$ ، د (د(س) = $\frac{١}{\sqrt{س}}$ ، هـ (د(س) = $٢(١-س)$)

$$(و) \quad \left. \begin{array}{l} \text{د(س)} = \left\{ \begin{array}{l} \text{س}^2 \\ \text{س} > 2 \end{array} \right\} , \\ \text{س} \leq 2 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \text{س}^2 \\ \text{س} > 2 \end{array} \right\} , \quad \text{س} \leq 2$$

$$(ز) \quad \text{د(س)} = |س| , \quad \sqrt{2} = س$$

$$(ح) \quad \text{د(س)} = 2س^2 - 3س + 5$$

[٤] اثبت باستخدام تعريف المشتقة ، أن المشتقة لأي دالة خطية على الصورة د(س) = ١س + ب ، تكون :
د(س) = ١ .

[٥] أوجد باستخدام تعريف المشتقة ، د(٢) للدالة د(س) = ٦س + |٢ - س| .

[٦] تحرك جسم على خط مستقيم وفق القاعدة ف = ٢ - ٢٥ - ٥ ، حيث ف المسافة المقطوعة بالتر ،
الزمن بالدقائق ، فأوجد :

أ (المسافة التي يقطعها الجسم بعد دقيقتين ، ب) متوسط السرعة خلال دقيقتين ،
ج) سرعة الجسم عندما ٥ = ٢ دقيقة (استخدم تعريف المشتقة) .

[٧] أوجد ميل المماس لمنحنى الدالة د(س) = $\frac{1}{س}$ عند س = ١ .

[٨] أوجد معادلة المماس ومعادلة العمودي على المماس لمنحنى الدالة د(س) = ٢س - ١ + س عندما س = ٠ .

[٩] أوجد معادلتى المماس والعمودي لمنحنيات الدوال المعطاة عند النقطة المذكورة :

أ (د(س) = ٤س - ٢س + ١ ، عند (١، ١) ،

ب (د(س) = ٢س - $\frac{4}{\sqrt{س}}$ ، عند (٤، ٦) ،

ج (د(س) = ١ - (١ + س)² ، عند س = ١ - .

[١٠] أوجد ميل المماس لمنحنى الدالة د(س) = ٤س - ٢ ، عند النقطة (٢، صفر) .

[١١] أوجد معادلة المماس للمنحنى ص = ٢س + ٤س - ١ ، إذا كان المماس عمودياً على المستقيم :
٢ص + س - ١ = ٠ .

[١٢] أوجد نقاط المنحنى ص = ٣س - ٦س + ٥ التي يكون المماس عندها موازياً للمحور السيني .

[١٣] ما هي نقاط المنحنى ص = ٣س التي يكون عندها المماس موازياً للمستقيم ص = س .

المشتقة عند نقطة والمشتقة على فترة

٥ - ٥

أولاً : المشتقة عند نقطة :

تكون الدالة ص = د(س) قابلة للاشتقاق عند النقطة س = ١ . إذا كانت : $\lim_{هـ \rightarrow ١} \frac{د(١+هـ) - د(١)}{هـ}$

لها وجود .

مبرهنة (٥-١)

إذا كانت الدالة $v = d(s)$ قابلة للاشتقاق عند النقطة $s = 1$ ، فإنها تكون متصلة عند نفس النقطة.

البرهان :

إذا كانت s نقطة في مجموعة تعريف الدالة d ؛ حيث $s \neq 1$ ، فإنه من الممكن كتابة $d(s)$ على النحو الآتي :

$$d(s) = (1) + (s-1) \left[\frac{d(s) - d(1)}{s-1} \right]$$

وباستخدام خواص النهايات ، نجد أن :

$$\lim_{s \rightarrow 1} d(s) = \lim_{s \rightarrow 1} 1 + \lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \lim_{s \rightarrow 1} \frac{d(s) - d(1)}{s-1} = 1 + 0 \cdot \lim_{s \rightarrow 1} \frac{d(s) - d(1)}{s-1} = 1$$

أي أن : $\lim_{s \rightarrow 1} d(s) = d(1)$ ، وبناءً على تعريف اتصال الدالة ، فإن d تكون متصلة عند النقطة 1 .


تدريب (٥-٣)

إذا كان $d(s) = |s|$ $\forall s \in \mathbb{R}$

ادرس قابلية الدالة $d(s)$ للاشتقاق عند $s = 0$.

تلاحظ أن :

$$d(s) = |s| = \begin{cases} s & \text{if } s \geq 0 \\ -s & \text{if } s < 0 \end{cases}$$



الشكل (٥-١٧)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{d(0+h) - d(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{d(h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{d(0-h) - d(0)}{-h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{d(-h) - 0}{-h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{-h} = 1$$

ومن ذلك فإن $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{d(0+h) - d(0)}{h} \neq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{d(0-h) - d(0)}{-h}$ ،

انظر شكل (٥-١٧) ، وتعرف أن الدالة $d(s) = |s|$ متصلة عند النقطة $s = 0$ ، ولكن ليس لها نهاية وبالتالي ليس لها مشتقة عند هذه النقطة .

ومن ذلك نستنتج أن الدالة قد تكون متصلة ولكن غير قابلة للاشتقاق .

مثال (٣٠ - ٥)

ابحث مشتقة الدالة $\sqrt[3]{s}$ (د(س) عند $s = 0$.

الحل :

للبحث عن مشتقة الدالة عند $s = 0$ ، فإننا نستخدم تعريف المشتقة ، بحيث تكون :

$$\bar{D}(s) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{s+h} - \sqrt[3]{s}}{h}$$

وعندما $s = 0$ ، فإن المقدار في الطرف الايسر هو :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h} - \sqrt[3]{0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h}}{h} , \quad h \neq 0$$

$$\therefore \bar{D}(s) = \bar{D}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h^2} \right) .$$

ونجد أنه عندما $h \rightarrow 0$ ، فإن المقدار يؤول إلى $\pm \infty$.

ومن ذلك نستنتج أن النهاية غير موجودة ، وأن الدالة ليس لها مشتقة عند النقطة $s = 0$.

مما سبق يتضح أنه لايجاد المشتقة عند نقطة ، يُشترط ان تكون النهاية موجودة .

مثال (٣١ - ٥)

$$\left. \begin{array}{l} s \geq 2 , \quad 4 - s \\ s < 2 , \quad s^2 + 3 \end{array} \right\} = D(s)$$

ادرس قابلية اشتقاق الدالة $D(s)$ عند النقطة $s = 2$.

الحل :

∴ الدالة $D(s)$ معرفة على ح .

$$\therefore \bar{D}(s) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[4 - (s+h)] - [4 - s]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 - s - h) - [1 - (s+h)]}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{7 - 1 - h + 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 - h}{h} = \frac{4}{h} \quad (1) \text{ —————}$$

$$\text{كذلك } \bar{D}(s) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(s+h)^2 + 3 - (s^2 + 3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(s^2 + 2sh + h^2) + 3 - s^2 - 3}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2s + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2s + h) = 2s \quad (2) \text{ —————}$$

من (١) ، (٢) ينتج أن :


$$\overline{d}(s) = \overline{d}(s^+) \iff \overline{d}(s) = \overline{d}(s^-) = 4$$

∴ الدالة لها مشتقة عند النقطة $s = 2$ ، وهي : $\overline{d}(2) = 4$.

ثانياً- المشتقة على فترة :

لإيجاد مشتقة الدالة على فترة ، فإننا نوجد المشتقة عند أية نقطة s ، حيث إن s تنتمي إلى مجموعة التعريف ، وهي الفترة المعينة ، وبالتالي فإن الدالة $\overline{d}(s)$ قابلة للاشتقاق في الفترة (t) إذا كانت لها مشتقة عند كل نقطة من نقاط الفترة (t) .

أما إذا كانت الفترة (t) مغلقة $[a, b]$ ، حيث إن $a > b$ يمكن أن نقول بأن الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة (t) ، وأن مشتقتها من إحدى الجهتين موجودة ، وبالطبع فإن الدالة $\overline{d}$ قابلة للاشتقاق عند a أو b ، وعندئذ تمثل إحدى النهايات الموجودة . بينما قد توجد بعض الدوال تكون فيها إحدى جهتيها غير قابلة للاشتقاق عند a أو b .



مثال (٥-٣٢)

لتكن الدالة $\overline{d}(s) = \sqrt{s}$ بيّن أن الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة $[0, \infty)$ ، ولكنها ليست كذلك على الفترة $[0, \infty]$ ، شكل (٥-١٨) .

الحل :

$\overline{d}(s) = \sqrt{s}$ نهياً $\overline{d}(s) = \sqrt{s}$ ، وبالضرب في مرافق البسط نحصل على :

$$\overline{d}(s) = \sqrt{s} \text{ نهياً} = \frac{s - h + \sqrt{s} + \sqrt{h}}{s - h + \sqrt{s} + \sqrt{h}} = \frac{1}{\sqrt{s} + \sqrt{h}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{s} + \sqrt{h}} = \frac{1}{\sqrt{s} + \sqrt{s}} = \frac{1}{2\sqrt{s}} < 0$$

وبالتالي فإن الدالة قابلة للاشتقاق في الفترة $[0, \infty)$.

وعندما $s = 0$ تكون :

$$\overline{d}(0) = \frac{1}{\sqrt{0} + \sqrt{0}} = \infty$$

وبالتالي ، فإن المشتقة من جهة اليمين غير موجودة .

ونستنتج من ذلك أن الدالة $\overline{d}$ ليس لها مشتقة في الفترة $[0, \infty]$.

مثال (٥ - ٣٣)

$$\left. \begin{array}{l} \text{س} \leq 1, \\ \frac{1}{\text{س}} - \frac{1}{\text{س}^2} + \frac{3}{\text{س}^3} \end{array} \right\} = \text{د(س)} \quad \text{ابحث قابلية الدالة د(س)}$$

للاشتقاق عند $\text{س} = 1$ في الفترة $[1, \infty)$ والفترة $[-\infty, 1]$.

الحل :

$$\overline{\text{د(س)}} = \text{نهـ} = \frac{\text{د(س)} - \text{د(هـ)}}{\text{هـ}} = \frac{\text{د(س)} - \text{د(هـ)}}{\text{هـ}}$$

وهنا تنشأ حالتان هما :

$$\blacksquare 1. \quad \text{هـ} < 0, \quad \text{وعندها يكون د(س)} = \frac{1}{\text{س}}, \quad \text{ومنها د(س)} = \frac{1}{\text{س} + \text{هـ}}$$

$$\therefore \overline{\text{د(س)}} = \overline{\text{د(1)}} = \text{نهـ} = \frac{\text{د(1)} - \text{د(هـ)}}{\text{هـ}}$$

$$\text{نهـ} = \frac{\frac{1}{1} - \frac{1}{\text{هـ} + 1}}{\text{هـ}} = \frac{1 - 1 - \text{هـ}}{\text{هـ}(\text{هـ} + 1)}$$

$$\therefore \text{نهـ} = \frac{1 - 1}{\text{هـ} + 1} = 0 \quad \text{د(1)} = \text{هـ}$$

$$\blacksquare 2. \quad \text{هـ} > 0, \quad \text{وعندها يكون د(س)} = \frac{1}{\text{س}} - \frac{1}{\text{س}^2} + \frac{3}{\text{س}^3}, \quad \text{ومنها}$$

$$\text{د(هـ} + 1) = \frac{1}{\text{هـ} + 1} - \frac{1}{(\text{هـ} + 1)^2} + \frac{3}{(\text{هـ} + 1)^3} = \frac{3}{\text{هـ} + 1} - \frac{1}{\text{هـ} + 1} + \frac{1}{\text{هـ} + 1} = \frac{3}{\text{هـ} + 1}$$

$$1 - \frac{1}{\text{هـ} + 1} = \frac{\text{هـ}}{\text{هـ} + 1}, \quad \text{وعليه فإن :}$$

$$\overline{\text{د(1)}} = \text{نهـ} = \frac{\text{د(1)} - \text{د(هـ)}}{\text{هـ}} = \frac{\left(\frac{3}{\text{هـ} + 1} - 1\right) - \left[\frac{1}{\text{هـ} + 1} - \frac{1}{(\text{هـ} + 1)^2} + \frac{3}{(\text{هـ} + 1)^3}\right]}{\text{هـ}}$$

$$\text{نهـ} = \frac{\left(\frac{\text{هـ}}{\text{هـ} + 1} - 1\right) - \left[\frac{1}{\text{هـ} + 1} - \frac{1}{(\text{هـ} + 1)^2} + \frac{3}{(\text{هـ} + 1)^3}\right]}{\text{هـ}} \quad \text{د(2)}$$

من (1)، (2) نجد أن النهايتين متساويتان .

$$\text{نهـ} = \frac{\text{د(1)} - \text{د(هـ)}}{\text{هـ}} \quad \text{موجودة ، أي أن د(1) موجودة .}$$

وبالتالي ، فإن د قابلة للاشتقاق عند كل نقطة من نقاط فتراتهما .

تمارين ومسائل (٥-٥)

[١] ابحث قابلية اشتقاق الدالة فيما يأتي :

$$\blacksquare ١ \quad د(س) = \frac{س^٢ + ٢س - ٣}{س^٢ + ٢س + ٣} \quad , \quad \blacksquare ٢ \quad د(س) = (س + ١)(س + ١) \quad ,$$

$$\blacksquare ٣ \quad د(س) = \sqrt{س + ٥} .$$

[٢] إذا كان $د(س) = ٤ - س^٢$ ، فأوجد المشتقة عند النقطة $س = ١$.[٣] ابحث قابلية اشتقاق الدالة $د(س) = \frac{٢}{١ + س}$ ، عند النقطة $س = ١$.

[٤] ابحث قابلية اشتقاق الدالة :

$$\left. \begin{array}{l} ١ - س^٢ \\ س^٢ \end{array} \right\} = د(س) \quad , \quad \begin{array}{l} س \geq ١ \text{ عند } س = ١ \\ س < ١ \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} س + ٢ \\ ١ - س^٣ \end{array} \right\} = د(س) \quad , \quad \begin{array}{l} ٠ \leq س \leq ٢ \\ ٢ < س \leq ٥ \end{array}$$

عند النقاط الآتية :

أولاً - عند $س = ٢$ ، ثانياً - عند $س = ٠$ ، ثالثاً - عند $س = ٥$.[٦] بيّن أن الدالة $د$ قابلة للاشتقاق على الفترة المقابلة للدالة ، وكما يلي :

$$\blacksquare ١ \quad د(س) = س^٢ + س \quad \text{على الفترة} \quad] \infty , \infty - [$$

$$\blacksquare ٢ \quad د(س) = س^٢ - ٣س - \sqrt{س} \quad \text{على الفترة} \quad] \infty , ٥ [$$

$$\blacksquare ٣ \quad د(س) = \frac{١}{س - ٤} \quad \text{على الفترة} \quad] \infty , ٤ [$$

$$\blacksquare ٤ \quad د(س) = \frac{١}{س^٢ - ٤} \quad \text{على الفترة} \quad] ٢ - , \infty - [$$

$$\blacksquare ٥ \quad د(س) = |س - ١| \quad \text{على الفترة} \quad] \infty , ١ [$$

$$\blacksquare ٦ \quad د(س) = |س + ٢ + ٣س| \quad \text{على الفترة} \quad] \frac{٢}{٣} - , \infty - [$$

قواعد الدوال القابلة للاشتقاق

٥ : ٦

انطلاقاً من تعريف المشتقة ، فإنه يمكن استنتاج مجموعة من قواعد اشتقاق الدوال ، وفي هذا البند سيتم عرض أهمها .

١ ■ الدالة الثابتة .

مبرهنة (٥-٢) : إذا كان $D(s) = ج$ ، ج عدد ثابت ، فإن $D(s) = \text{صفر}$.

البرهان :

∴ $D(s) = ج$

$$\text{فإن } D(s) = \text{نهيا} \cdot \frac{D(s) + (هـ) - (س)}{هـ} = \frac{ج - ج}{هـ} = \text{نهيا} \cdot \frac{٠}{هـ}$$

$$D(s) = \text{نهيا} \cdot (٠) = \text{صفر}$$

مثال (٥-٣٤)

إذا كانت $D(s) = ٤$ ، فأوجد :

$D(٢)$ ، $D(٣)$ ؟

الحل :

∴ $D(s) = ٤$

∴ $D(s) = \text{صفر}$ (من المبرهنة)

$D(٢) = \text{صفر}$ ، كذلك $D(٣) = \text{صفر}$

والشكل (٥-١٩) يمثل الدالة الثابتة ، وهو خط مستقيم يوازي محور السينات وميله يساوي صفراً .

٢ ■ دالة الدرجة الأولى : (الدالة الخطية) .

مبرهنة (٥-٣) :

لتكن $D(s) = اس + ب$ ، $س \in ح$ ، $ا$ ، $ب \in ح$ ، $ا \neq ٠$ ، فإن مشتقتها هي $D(s) = ا$.

البرهان :

$D(s) = اس + ب$

$$D(s) = \text{نهيا} \cdot \frac{[ا(س + هـ) + ب] - [ا(س) + ب]}{هـ}$$

$$= \text{نهيا} \cdot \frac{اس + اهـ + ب - اس - ب}{هـ} = \text{نهيا} \cdot \frac{اهـ}{هـ}$$

$$\therefore D(s) = \text{نهيا} (ا) = ا$$

مثال (٥ - ٣٥)

إذا كانت د (س) = ٦ س + ٧ ، فأوجد $\overline{د}$ (س) ؟

الحل :

$$د (س) = ٦ س + ٧$$

$$\overline{د} (س) = (٦ س + ٧) + ٦ = \text{صفر} + ٦ = ٦$$

٣ ■ الدالة س^٣ .

مبرهنة (٥ - ٤)

إذا كانت د (س) = س^٣ ، حيث $\mathbb{Q} \ni \mathbb{N}$ (مجموعة الأعداد النسبية) ،
فإن $\overline{د} (س) = د س^{-٣}$.

مثال (٥ - ٣٦)

أوجد مشتقة لكل مما يأتي :

$$١ \blacksquare د (س) = س^٣ ، \quad ٢ \blacksquare د (س) = \sqrt{س} ، \quad ٣ \blacksquare د (س) = \frac{١}{\sqrt[٣]{س}}$$

الحل :

١ ■ لإيجاد المشتقة للدالة د (س) = س^٣ نطبق المبرهنة (٥ - ٤) .

$$\therefore \overline{د} (س) = د س^{-٣} = ٣ س^٢$$

٢ ■ لإيجاد المشتقة للدالة د (س) = $\sqrt{س}$ $\Leftrightarrow د (س) = س^{\frac{١}{٢}}$

$$\therefore \overline{د} (س) = \frac{١}{٢} س^{-\frac{١}{٢}} = \frac{١}{٢} س^{-\frac{١}{٢}} = \frac{١}{٢ \sqrt{س}}$$

٣ ■ لإيجاد المشتقة للدالة د (س) = $\frac{١}{\sqrt[٣]{س}}$ $= س^{-\frac{١}{٣}}$

$$\therefore \overline{د} (س) = -\frac{١}{٣} س^{-\frac{١}{٣}-١} = -\frac{١}{٣} س^{-\frac{٤}{٣}} = -\frac{١}{٣ \sqrt[٣]{س^٤}}$$

$$\therefore \overline{د} (س) = -\frac{١}{٣ \sqrt[٣]{س^٤}}$$

نتائج (٥ - ١) :

- ١ ■ إذا كانت الدالة d قابلة للاشتقاق عند النقطة s ، 1 عدد ثابت ، فإن $(1 \cdot d)'(s) = d'(s) \cdot 1 = d'(s)$.
- ٢ ■ إذا كان الدالة d قابلة للاشتقاق عند النقطة s ، فإن الدالة d^2 ، أيضاً قابلة للاشتقاق عند s ؛
 $([d(s)]^2)' = 2d(s) \cdot d'(s)$ (برهن هذه النتيجة) .

٤ ■ مشتقة مجموع دالتين :

مبرهنة (٥ - ٥) :

إذا كانت كل من الدالتين d ، m قابلة للاشتقاق عند s ، فإن دالة المجموع $(d + m)$ قابلة للاشتقاق عند s ؛ أي أن : $(d + m)'(s) = d'(s) + m'(s)$.

البرهان :

$$[d + m]'(s) = d'(s) + m'(s) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{d(s+h) + m(s+h) - d(s) - m(s)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[d(s+h) - d(s)] + [m(s+h) - m(s)]}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{d(s+h) - d(s)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{m(s+h) - m(s)}{h} = d'(s) + m'(s)$$

وبالتالي ، فإنَّ مشتقة مجموع دالتين يساوي مجموع مشتقتي هاتين الدالتين ، ويمكن تعميم ما سبق على النحو التالي :

مشتقة مجموع دوال يساوي مجموع مشتقات هذه الدوال ، أي أنه : إذا كانت كل من الدوال $d_1, d_2, d_3, \dots, d_{n-1}, d_n$ قابلة للاشتقاق عند s ، فإن :

$$(d_1 + d_2 + d_3 + \dots + d_{n-1} + d_n)'(s) = d_1'(s) + d_2'(s) + d_3'(s) + \dots + d_{n-1}'(s) + d_n'(s)$$

مثال (٥ - ٣٧)

إذا كانت $v = d(s) = 3s^2 + 2s^3$ ، فأوجد $d'(s)$

الحل :

إذا كانت $d(s) = (3s^2) + (2s^3)$ ، فإن : $d'(s) = \frac{d}{ds}(3s^2) + \frac{d}{ds}(2s^3)$.

$$d'(s) = 2 \times 3s^2 + 3 \times 2s^2 = 6s^2 + 6s^2 = 12s^2$$

مثال (٣٨ - ٥)

إذا كانت $(س) = س^٣ + س^٢ - ٤س$ ، فأوجد $د(س)$

الحل :

$$\begin{aligned} د(س) &= س^٣ + س^٢ - (س^٢ - ٤س) \\ \therefore د(س) &= س^٣ + س^٢ - (س^٢ - ٤س) = س^٣ + س^٢ - س^٢ + ٤س = س^٣ + ٤س \end{aligned}$$

٥ ■ مشتقة حاصل ضرب دالتين .

مبرهنة (٥ - ٦)

إذا كانت كل من الدالتين $د$ ، $مر$ قابلة للاشتقاق عند $س$ ، فإن دالة حاصل الضرب $د \cdot مر$ قابلة للاشتقاق عند $س$ ، ويكون : $(د \cdot مر)'(س) = د'(س) \cdot مر(س) + د(س) \cdot مر'(س)$.

البرهان :

$$\begin{aligned} \text{من تعريف المشتقة : } (د \cdot مر)'(س) &= \lim_{ه \rightarrow س} \frac{د(س+ه) \cdot مر(س+ه) - د(س) \cdot مر(س)}{ه} \\ &= \lim_{ه \rightarrow س} \frac{د(س+ه) \cdot مر(س+ه) - د(س+ه) \cdot مر(س) + د(س+ه) \cdot مر(س) - د(س) \cdot مر(س)}{ه} \end{aligned}$$

وبإضافة وطرح المقدار $د(س) \cdot مر(س+ه)$ إلى البسط يكون :

$$\begin{aligned} (د \cdot مر)'(س) &= \lim_{ه \rightarrow س} \frac{د(س+ه) \cdot مر(س+ه) - د(س+ه) \cdot مر(س) + د(س+ه) \cdot مر(س) - د(س) \cdot مر(س)}{ه} \\ &= \lim_{ه \rightarrow س} \left[مر(س+ه) \cdot \frac{د(س+ه) - د(س)}{ه} + د(س) \cdot \frac{مر(س+ه) - مر(س)}{ه} \right] \\ &= د'(س) \cdot مر(س) + د(س) \cdot مر'(س) . \end{aligned}$$

حيث إن $\lim_{ه \rightarrow س} \frac{د(س+ه) - د(س)}{ه} = د'(س)$ ، لأن $مر$ قابلة للاشتقاق ، وبالتالي فهي متصلة .

مثال (٣٩ - ٥)

أوجد مشتقة الدالة $د(س) = (س^٣ - س^٢)(س^٢ + ١)$

الحل :

ينطبق المبرهنة (٤ - ٦) نجد أن :

$$\begin{aligned} د'(س) &= (س^٣ - س^٢)'(س^٢ + ١) + (س^٣ - س^٢)(س^٢ + ١)' \\ &= ٣س^٢ - ٢س + ٣س^٢ - س^٢ + ٢س(س^٢ + ١) + (س^٣ - س^٢) \cdot ٢س \\ &= ٣س^٢ - ٢س + ٣س^٢ - س^٢ + ٢س^٣ + ٢س + ٢س^٣ - ٢س^٢ = ٤س^٣ + ٢س^٢ + ٢س \end{aligned}$$

٦ ■ مشتقة خارج قسمة دالتين :

مبرهنة (٥ - ٧) :

إذا كانت الدالة $\frac{د(س)}{مر(س)}$ قابلة للاشتقاق عند س ، وكانت مر(س) $\neq$ صفر ،

$$\left(\frac{د(س)}{مر(س)} \right)' = \frac{مر(س) د'(س) - د(س) مر'(س)}{[مر(س)]^2}$$

البرهان :

نفرض أن ل(س) = $\frac{د(س)}{مر(س)}$ ، بالتالي فإن : $\bar{ل}(س) = \frac{د(س) - ل(س) مر(س)}{مر(س)}$.

$$\therefore \bar{ل}(س) = \frac{د(س) - ل(س) مر(س)}{مر(س)} .$$

$$= \frac{د(س) - ل(س) مر(س)}{مر(س)} .$$

$$= \frac{د(س) - ل(س) مر(س)}{مر(س)} .$$

وبإضافة وطرح د(س) • مر(س) إلى البسط نجد أن :

$$\therefore \bar{ل}(س) = \frac{د(س) - ل(س) مر(س) + د(س) • مر(س) - [د(س) • مر(س)]}{[مر(س)]^2}$$

$$= \frac{د(س) - ل(س) مر(س) + د(س) • مر(س) - [د(س) • مر(س)]}{[مر(س)]^2}$$

$$= \frac{1}{[مر(س)]^2}$$

$$= \frac{مر(س) د'(س) - د(س) مر'(س)}{[مر(س)]^2}$$

مثال (٥ - ٤٠)

أوجد مشتقة الدالة $d(s) = \frac{s+1}{s^2-2}$ عند النقطة $s=2$.

الحل :

$$\begin{aligned} d'(s) &= \frac{(s+1)(2-s^2) - (s^2-2)s}{(s^2-2)^2} \\ &= \frac{2-s^2-s^3+s}{(s^2-2)^2} = \frac{-s^3-s^2+s+2}{(s^2-2)^2} \\ \therefore d'(2) &= \frac{-8-4+2+2}{(4-2)^2} = \frac{-8}{4} = -2 \end{aligned}$$

مثال (٥ - ٤١)

أوجد مشتقة الدالة $d(s) = \frac{2}{s^2-4}$ عند $s=3$.

الحل :

ينطبق المبرهنة (٥ - ٧) ، وحيث إن الدالة $d(s) = \frac{2}{s^2-4}$ ، قابلة للاشتقاق عند أي نقطة ،

وكذلك : $s^2-4 = (s-2)(s+2) \neq 0$.

$$\therefore d'(s) = \frac{(s^2-4)' \cdot 2 - (2) \cdot (2s)}{(s^2-4)^2} = \frac{(2s-4) \cdot 2 - 4s}{(s^2-4)^2}$$

وعندما تكون $s=3$

$$\therefore d'(3) = \frac{(2 \cdot 3 - 4) \cdot 2 - 4 \cdot 3}{(3^2 - 4)^2} = \frac{(6-4) \cdot 2 - 12}{(9-4)^2} = \frac{2-12}{25} = -\frac{10}{25} = -\frac{2}{5}$$

٧ ■ مشتقة الجذر التربيعي للدالة .

مبرهنة (٥ - ٨)

إذا كانت الدالة $d(s)$ قابلة للاشتقاق عند s ، $s > 0$ ، وإذا كان $v = \sqrt{d(s)}$ ،

$$\text{فإن } \frac{v'}{v} = \frac{d'(s)}{2\sqrt{d(s)}} \quad .$$

البرهان :

يلاحظ أن $s \in$ للفترة المفتوحة $[1, 2]$ ، ولجميع الأعداد الحقيقية الموجبة ، ومن تعريف المشتقة ، يكون :

$$\frac{v}{s} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{s} - \sqrt{s+h}}{h}$$

وبضرب البسط والمقام في المرافق لهذا المقدار الموجود في البسط وهو : $\sqrt{s} + \sqrt{s+h}$ ،

$$\therefore \frac{v}{s} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s - (s+h)}{h(\sqrt{s} + \sqrt{s+h})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h(\sqrt{s} + \sqrt{s+h})}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{s} + \sqrt{s+h}}$$

$$\therefore \frac{v}{s} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{s} + \sqrt{s+h}} = \frac{-1}{\sqrt{s} + \sqrt{s}}$$

$$\text{وحيث إن } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s - (s+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h} = -1$$

$$\therefore \frac{v}{s} = \frac{-1}{\sqrt{s} + \sqrt{s}} = \frac{-1}{2\sqrt{s}}$$

مثال (٥ - ٤٢)

أوجد المشتقة لكل من :

$$1. \sqrt{s} \quad 2. \sqrt{s^2 - 1} \quad 3. \sqrt[3]{s} - \sqrt{s^2}$$

الحل :

بتطبيق المبرهنة (٥ - ٨) يكون :

$$1. \sqrt{s} = (s)^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore \frac{1}{2} (s)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{s}}$$

$$\text{■ ٢} \quad \sqrt{1 - 2s} = \text{د (س)}$$

$$\therefore \text{د (س)} = \frac{s^2}{1 - 2s\sqrt{2}}$$

$$\text{■ ٣} \quad \sqrt{5 - 3s} = \text{د (س)}$$

$$\therefore \text{د (س)} = \frac{5(3 - 2s)(2 - 3s)}{2\sqrt{5 - 3s}} = \frac{15s^2 - 10s}{2\sqrt{5 - 3s}}$$

تمارين ومسائل (٥-٦)

[١] أوجد المشتقة لكل من الدوال الآتية :

$$\text{■ ١} \quad \text{د (س)} = 2 .$$

$$\text{■ ٢} \quad \text{ص} = 2s + 4 .$$

$$\text{■ ٣} \quad \text{د (س)} = 2^\circ + s .$$

$$\text{■ ٤} \quad 4\sqrt[3]{s} + 2\sqrt{s} - 2 .$$

$$\text{■ ٥} \quad \text{م (س)} = s^2(1 + s) .$$

$$\text{■ ٦} \quad \frac{2m^2 + 4m}{m} .$$

$$\text{■ ٧} \quad \sqrt[3]{s} = \text{د (س)} .$$

$$\text{■ ٨} \quad \text{ص} = 3\sqrt[2]{s} .$$

$$\text{■ ٩} \quad \text{د (س)} = \frac{2s^2 - 3s^3 + 8s - 6}{\sqrt{s}} .$$

[٢] أوجد قيمة المشتقة للدوال عند النقطة س :

■١ د(س) = $2 - 2س$ عند س = ٢ ، ■٢ د(س) = $س^٤ + ٢س$ عند س = ١
 ■٣ د(س) = $٢س^٣$ عند س = -٢ ، ■٤ د(س) = $٢س^٧$ عند س = ٢
 ■٥ د(س) = $٣س^٥ + ٧س^٤ - ٢س^٣ - ٢س^٢ + ٩س - ٥$ عند س = ١-

■٦ د(س) = $\frac{٥ - ٢س}{١ + ٢س}$ عند س = ٣ .

[٣] لتكن د(س) = $\frac{٢}{١ + س}$ ، س $\neq -\frac{١}{٢}$. أوجد قيمة د'(٢) .

[٤] أوجد المشتقة د(س) = $\frac{١}{س - ١}$ ، س $\neq ١$.

[٥] أوجد مشتقة الدالة د(س) = $\sqrt{\frac{س - ١}{س + ١}}$ ، س $\neq ١$.

[٦] أوجد مشتقة الدالة د(س) = $\sqrt{١ + ٢س}$.

[٧] أوجد مشتقة ص = $٤س^٦ - ٣س^٥ + ٤س^٢ + س + ١٠$ عندما س = ١ .

[٨] أوجد مشتقة الدالة د(س) = $ل س^٥ + ع س^٢$ ، ل ، ع ثابتان ، م ، ن عددان طبيعان .

[٩] أوجد مشتقة كل من الدوال الآتية :

أ) $\frac{س}{٢} + \frac{٤}{٢س} + \frac{٣س}{٢}$ ، ب) د(س) = $\frac{١}{س^٤}$ ،

ج) ع = $(١ - ٣س)(٣ + ٢س)(٢ - ٣س)$.

[١٠] إذا كانت و(س) = $\frac{١}{م(س)}$ ، م(س) $\neq ٠$ ، فبرهن أن : م(س) موجودة ، فإن :

و(س) = $\frac{م(س) - م(س)}{٢(م(س))}$.

[١١] أوجد مشتقة كل من الدوال الآتية :

أ) $\frac{٤ - س^٢}{٤ + س^٢}$ ، ب) $\frac{٢ + ٣س}{١ - ٢س}$ ،

ج) ص = $(١ + س^٣ - ٢س^٢)(١ - ٤س^٤ + ٣س^٢ - ٥س^٢)$.



استبانة تقويم الكتاب

بيانات المستجيب:

الاسم /	المؤهل وتاريخه /	التخصص /
العمل الحالي /		المحافظة /

بيانات الكتاب:

المادة /	الصف /	اسم الكتاب /
الجزء /	الطبعة /	السنة الدراسية /
تاريخ تعبئة الاستبانة /		

نهدف من هذه الاستبانة تقويم الكتاب بغرض تحسينه في الطبقات القادمة،
نرجو التكرم بوضع علامة (✓) تحت الوصف الذي تراه مناسباً لإجابتك أمام كل بند.

بند	جداً	جيد	مقبول	ضعيف
أولاً - الأهداف: - وضوح الصياغة. - تقيس فكرة محددة. - يمكن قياسها. - شاملة (معرفة - مهارة - وجدانية).				
ثانياً - المادة العلمية وأسلوب عرضها: - ملائمة لغة الكتاب لمستوى المتعلم. - سلامة ووضوح لغة الكتاب. - ترسيخ المحتوى للقيم الدينية والوطنية. - مادة الكتاب تكسب المتعلم خبرات جديدة. - ملائمة المادة لمشكلات المتعلم واهتماماته. - مادة الكتاب تساعد المتعلم على فهم المشكلات. - مادة الكتاب تراعي الفروق الفردية. - خلو الكتاب من التكرار في الموضوعات. - يراعي أسلوب عرض المادة الترابط والتسلسل المنطقي. - مراعاة مادة الكتاب للحدثة والدقة العلمية. - عرض المادة تحفز على القراءة والبحث والتفكير. - تحقيق المحتوى لأهداف المادة.				
ثالثاً - الوسائل التعليمية: - وضوحها ودقتها. - ارتباطها بموضوعات الدرس. - مدى ارتباطها بالأهداف.				
رابعاً - التقويم: - الأنشطة والتمارين تكسب المتعلم مهارات متنوعة. - بطاقات التفكير تثير دافعية البحث والإطلاع. - الأسئلة والتمارين تقيس مدى تحقيق الأهداف. - مناسبة لمستوى المتعلم. - دقة ووضوح الصياغة. - تراعي الفروق الفردية. - متنوعة وشاملة للجوانب المعرفية. - تساعد المتعلم في تطبيق ما تعلمه في مواقف الحياة المختلفة. - كفاية الأسئلة في مساعدة المتعلم على استيعاب مادة الكتاب.				
خامساً - الشكل والإخراج الفني: - ارتباط الغلاف بمحتوى الكتاب. - متانة تجليد الكتاب. - وضوح الألوان ومناسبتها. - وضوح ودقة الطباعة. - نوعية ورق الكتاب.				

أسئلة عامة، أجب بـ (نعم) أو (لا):

البند	نعم	لا
- ينسجم محتوى الكتاب مع نظام الفصلين الدراسيين .		
- عدد الحصص المقررة تكفي لا استيعاب مادة الكتاب .		
- هل الوسائل التعليمية متنوعة وكافية ؟		
- هل هناك ضرورة لوجود قائمة بالمراجع ومصادر المعلومات ؟		
- هل هناك موضوعات ترى ضرورة حذفها (اذكرها) ؟		
- هل هناك موضوعات ترى ضرورة إضافتها (اذكرها) ؟		

✍ إذا كان لديك ملاحظات أخرى اكتبها

.....

.....

.....

.....

قائمة الأخطاء العلمية واللغوية والمطبعية:

[illegible]

الإدارة العامة للسياحة
تليفكس: ٥٤٠٣١٠ - ٥٤٥٧٩٩
أو إدارة المناهج
مكتب التربية بالمحافظة

نرجو التكرم بإرسال الاستبانة إلى